

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

АГРОХИМИЯ И СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
по образованию в области сельского хозяйства в качестве учебно-
методического пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия
и почвоведение, 1-74 02 03 Защита растений и карантин,
1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия,
1-74 02 02 Селекция и семеноводство*

Горки
БГСХА
2016

УДК 378.147.85.:631.8(075.8)

ББК 40.3я73

A26

*Рекомендовано Научно-методическим советом БГСХА
24.06.2015 (протокол № 9)
и методической комиссией агрономического факультета
11.06.2015 (протокол № 10)*

Авторы:

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент *С. Ф. Шекунова*;
доктора сельскохозяйственных наук, профессора *И. Р. Вильдфлуш*,
В. В. Лапа;

кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты *О. И. Мишура*,
Э. М. Батыршаев;
старшие преподаватели *К. А. Гурбан*, *М. Л. Радкевич*, *Ю. В. Коготько*

Под редакцией доктора сельскохозяйственных наук,
профессора *И. Р. Вильдфлуша*

Рецензенты:

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заместитель
директора по научной работе РУП «Институт почвоведения
агрохимии *А. Ф. Черныш*;

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры
биологии УО «Мозырский государственный университет
им. Шамякина» *С. М. Мижу*

Агрохимия и система применения удобрений : учебно-
A26 методическое пособие / *С. Ф. Шекунова* [и др.]; под ред.
И. Р. Вильдфлуша. – Горки : БГСХА, 2016. – 258 с.
ISBN 978-985-467-581-7.

Рассматривается методика разработки курсовой и дипломной работы по системе применения удобрений сельскохозяйственных культур.

Для студентов агроэкологического, агрономического и агробиологического факультетов специальностей 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство.

УДК 378.147.85.:631.8(075.8)

ББК 40.3я73

ISBN 978-985-467-581-7

© УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия», 2016

ВВЕДЕНИЕ

Научно обоснованная система применения удобрений является одним из основных факторов увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения качества продукции и сохранения (или увеличения) почвенного плодородия. Прирост урожая от использования оптимальных доз удобрений и средств химизации составляет 50 % и более. На орошаемых землях долевое участие орошения в формировании урожая составляет 40–50 %, удобрений – 30–40 %, причем общая урожайность повышается почти в три раза.

Наиболее высокая эффективность от применения удобрений достигается при внесении их в соответствии с биологическими требованиями растений с учетом обеспеченности почв элементами питания и охраны окружающей среды.

Основной особенностью и принципиальной сущностью нынешнего этапа сельскохозяйственного производства является необходимость наращивания сельскохозяйственного производства в условиях снижения потребления энергоресурсов. Необходимо более широкое использование биологического азота за счет расширения посевов бобовых культур, а для зерновых и других небобовых культур – бактериальных удобрений на основе ассоциативных азотфиксаторов. Снизить потребность в фосфорных удобрениях позволяет применение фосфатмобилизирующих биопрепаратов, под влиянием которых труднорастворимые соединения фосфора переходят в доступные для растений формы. Учитывая экологическую ситуацию и мировой опыт, развитие отрасли земледелия и растениеводства в республике должно базироваться на стратегии адаптивной интенсификации, характеризующейся биологизацией и экологизацией интенсификационных процессов.

Энергосбережение при повышении плодородия почв предусмотрено концепцией регулирования баланса питательных элементов в земледелии. Предполагается расширенный возврат органического вещества, макро- и микроэлементов только на тех полях, где содержание соответствующих веществ ниже оптимального уровня и вероятно высокая окупаемость затрат прибавкой урожая с минимальным риском загрязнения окружающей среды. На всей остальной площади сельскохозяйственных угодий предусматривается бездефицитный баланс гумуса и питательных элементов. Применение 12 т органических удобрений на 1 га пашни и минеральных удобрений на уровне около

300 кг д. в. NPK является одним из условий продовольственной безопасности в Беларуси и производства конкурентоспособной продукции на внешнем рынке.

Практика и передовой опыт показали, что эффективность внесения удобрений в севообороте возрастает на 15–20 %. Известкование кислых почв уже в первый год повышает отдачу от удобрений.

Система применения удобрений в севообороте чаще всего рассматривается как план применения органических и минеральных удобрений, в котором предусматриваются их виды, формы, дозы, сроки внесения и способы заделки под отдельные культуры в зависимости от почвенно-климатических и других условий. План применения удобрений составляется с учетом биологических особенностей культур, величины планируемого урожая, почвенно-климатических условий, последствия удобрения, агрохимических свойств каждого поля или отдельно удобряемого участка, баланса питательных веществ за севооборот, влияния удобрений на качество урожая и повышение (или сохранение) плодородия почв.

Агроэкологическая эффективность удобрений определяется главным образом культурой земледелия. В хозяйствах, где уровень агротехники низок, наиболее высока вероятность проявления негативных экологических последствий химизации, а окупаемость удобрений урожаем резко снижается.

В системе подготовки в вузах специалистов агрономических специальностей большое внимание уделяется изучению систем удобрения. Для этого широко используется выполнение курсовых и дипломных работ по теме «Система применения удобрений».

1. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Цели и задачи. Целью курсовой работы является овладение методикой разработки системы применения удобрений в хозяйствах. Для этого нужно знать почвенные условия, особенности питания сельскохозяйственных культур (сортов), свойства удобрений, содержание в них действующего вещества, их превращение в почве, приемы и способы внесения удобрений при прогрессивных технологиях возделывания культур, основные машины и орудия по подготовке и внесению удобрений в почву [5].

Правильно разработанная система применения удобрений должна обеспечить решение следующих задач:

1) получение плановых урожаев всех сельскохозяйственных культур при хорошем качестве продукции;

2) улучшение и постепенное выравнивание эффективного плодородия почв;

3) повышение эффективности использования удобрений и производительности труда в земледелии;

4) предотвращение загрязнения средствами химизации окружающей среды.

Порядок разработки. Разработку курсовой работы по системе применения удобрений целесообразно производить в такой последовательности:

1. Получить в хозяйстве или взять из выдаваемого задания на выполнение курсовой работы необходимую исходную информацию, а именно:

- размеры площадей пашни в севооборотах (полевых, кормовых, овощных), под культурами вне севооборота (кукуруза, люцерна, сады), под лугопастбищными угодьями (культурные и естественные сенокосы и пастбища), под торфяниками, пригодными для заготовки торфа на удобрение;

- чередование культур в севооборотах;

- название почв по полям севооборотов на пашне и других угодьях, их агрохимическую характеристику – содержание в почве гумуса (%), подвижных форм фосфора, калия, микроэлементов (мг/кг почвы), значение pH_{KCl} ;

- балльную оценку почв пашни и лугопастбищных угодий;

- поголовье скота в хозяйстве по видам скота и возрастным группам;

- планируемые уровни урожая сельскохозяйственных культур на перспективу (при их отсутствии разрабатывает сам студент).

2. Разработать планы потребности хозяйства в органических удобрениях, их накопление и размещение между объектами использования.

3. Разработать многолетние планы применения удобрений в севооборотах на пашне и для других угодий, где определить дозы, сроки и способы внесения органических и минеральных удобрений, включая и микроудобрения.

4. Рассчитать баланс азота, фосфора, калия и гумуса в почве в севообороте (по хозяйству) и по их показателям оценить разработанную систему применения удобрений. При необходимости внести коррективы в систему удобрения.

5. Составить многолетний план известкования почвы в севооборотах на пашне и других угодьях с обоснованием доз внесения, выбора формы известкового удобрения, сроков внесения и способов заделки в почву.

6. Рассчитать баланс кальция, магния и серы в севообороте и дать ему оценку.

7. Для культур севооборота на пашне и других угодий обосновать и дать описание приемам, срокам и способам внесения удобрений с указанием вида, формы, физической массы удобрения, а также марки машины и орудия.

8. Произвести расчет биоэнергетической и плановой экономической эффективности применения удобрений в севообороте по каждой культуре и в целом по севообороту.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО СИСТЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

В настоящее время при подготовке агрохимиков и агрономов большое внимание уделяется изучению систем удобрения. Для этого наряду с выполнением курсовых работ широко используется написание дипломных работ.

Дипломная работа является завершающим этапом в подготовке специалистов сельского хозяйства. К ее выполнению следует относиться очень серьезно, вдумчиво, так как при работе над ней от студента требуется значительная осведомленность по исследуемому узкому вопросу, способность и умение самостоятельно ставить и экспериментально решать задачи, необходимые науке и сельскохозяйственному производству.

Автор дипломной работы должен глубоко изучить литературу и полученные результаты по разрабатываемой теме.

Исследования по системе удобрения сельскохозяйственных культур необходимо проводить на почвах, которые являются типичными для того или иного района по гранулометрическому составу, уровню плодородия с сортами сельскохозяйственных культур, включенными в Государственный реестр, или перспективными.

Дипломная работа должна быть актуальной, отвечающей запросам сельскохозяйственного производства, чтобы результаты исследований могли быть в той или иной степени рекомендованы хозяйствам для внедрения. Результаты дипломной работы должны быть достоверными, поэтому опыты необходимо проводить с повторениями, они

должны быть проведены в строгом соответствии с методикой опытного дела, полученные экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке.

В дипломной работе наряду со специальными вопросами должны разрабатываться вопросы по охране труда и соблюдению техники безопасности при работе с удобрениями, а также меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Для этого в дипломной работе должны быть соответствующие разделы.

Тематика дипломных работ может быть разнообразной. При выборе тем дипломных работ надо стремиться, чтобы они были актуальными и соответствовали современному состоянию науки и техники, способствовали закреплению и расширению знаний по специальности, помогали применению знаний изученных дисциплин для решения конкретных производственных задач и определяли подготовленность студентов для самостоятельной работы. Желательно, чтобы тематика дипломных работ вытекала из тех научных проблем, над которыми работает кафедра.

Все разнообразие тематики работ по системе удобрения можно разделить на несколько групп.

2.1. Действие различных доз удобрений на урожайность и качество сельскохозяйственных культур

При исследовании доз различных видов удобрений очень важным является выбор фона, позволяющего поставить элемент, дозы которого изучаются, в положении лимитирующего фактора. Интервалы в дозах должны быть такими, чтобы разница в урожаях значительно превосходила ошибку опыта. Схема опыта должна дать возможность выбрать оптимальную для конкретных условий дозу удобрений. Дозы удобрений для сельскохозяйственных культур должны быть экономически обоснованными. Поэтому необходимо рассчитать экономическую эффективность применения удобрений по вариантам опыта.

2.2. Действие различных форм удобрений на урожайность и качество сельскохозяйственных культур

Очень важным разделом в разработке системы удобрения является изучение действия различных форм удобрений на урожайность и его качество. Прежде всего, необходимо уделить внимание изучению новых форм удобрений. В настоящее время разрабатываются новые

формы азотных удобрений пролонгированного действия, интерес представляет также изучение новых форм фосфорсодержащих, калийных, микроудобрений.

Перед химической промышленностью поставлена задача – увеличить в структуре производимых минеральных удобрений долю комплексных. Разработаны и разрабатываются комплексные удобрения для различных сельскохозяйственных культур (яровых зерновых, льна, сахарной свеклы и др.). Планируется, что наряду с главными элементами питания такие удобрения будут наполняться микроэлементами, а также и другими элементами питания, необходимыми для тех или иных культур.

При испытании новых форм удобрений очень часто наряду с фоном требуется иметь в качестве контрольного вариант со стандартным, хорошо изученным удобрением.

В последнее время разработаны микроудобрения на основе комплексонов, в которых микроэлементы находятся в более активной, доступной для растений форме. Созданы также комплексные микроудобрения, содержащие 3–4 и более микроэлементов. Следует разработать рациональные способы применения новых форм микроудобрений под сельскохозяйственные культуры (некорневая подкормка, обработка семян и т. д.).

2.3. Оценка различных видов органических удобрений

Интерес представляет сравнительное изучение влияния подстилочного и бесподстилочного навоза на урожайность и качество сельскохозяйственных культур. В связи с уменьшением поголовья скота и использования торфа для приготовления торфонавозных компостов шире должна использоваться солома.

В республике можно ежегодно применять до 9,7 млн. т условного навоза за счет запашки соломы. Ее можно использовать на подстилку, вносить с жидким навозом, использовать в чистом виде, готовить компосты. Необходимо разработать рациональные приемы использования соломы на удобрение. В чистом виде в первую очередь должна быть использована солома рапса и других крестоцветных культур, гречихи, кукурузы, люпина, кормовых бобовых, сои, которые не используются на корм скоту и на подстилку.

Большой интерес представляет также изучение эффективности птичьего помета, компостов на его основе, способов использования самого дешевого – зеленого удобрения.

При изучении видов органических удобрений в схеме следует иметь для сравнения варианты со стандартным, хорошо изученным органическим удобрением, – подстилочным навозом.

2.4. Исследования эффективности diaзотрофных, фосфат- и калиймобилизующих биопрепаратов

В последнее время в Беларуси в связи с увеличением цен на минеральные удобрения применение удобрений по сравнению с 2011 годом существенно снизилось. Уменьшить потребность в дорогостоящих минеральных удобрениях позволяет использование дешевых биопрепаратов.

Поэтому большой интерес представляет изучение эффективности новых биопрепаратов при возделывании сельскохозяйственных культур.

2.5. Комплексное применение удобрений и средств защиты растений

Совместное применение удобрений и средств защиты растений позволяет существенно снизить затраты на внесение средств химизации. Большие возможности в этом направлении представляет использование жидкого азотного удобрения – КАС (карбамидо-аммиачной селитры). При использовании баковых смесей КАС с гербицидами может наблюдаться усиление действия гербицидов и представляется возможность снижать дозы последних без снижения их эффективности при возделывании зерновых культур. Поэтому большой интерес представляет исследование совместного применения КАС с другими средствами защиты растений при возделывании зерновых культур: фунгицидов, регуляторов роста, инсектицидов.

Интерес также представляет совмещение операций при применении инсектицидов с микроудобрениями при возделывании рапса и других сельскохозяйственных культур.

2.6. Исследование различных систем применения удобрений в севооборотах

Изучение особенностей действия удобрений в севообороте, позволяет выяснить, как размещать удобрения в севообороте сравнительное действие органических и минеральных удобрений, их сочетание, вы-

явить действие и последствие таких удобрений, как навоз, известь, фосфорные удобрения, какова периодичность внесения фосфорных и калийных удобрений, дать оценку различным способам внесения удобрений, установить, как влияет длительное применение удобрений на изменение агрохимических свойств почвы.

Опыты по изучению систем удобрения, направленных на определение закономерностей действия, систематически вносимых удобрений, на урожайность, качество сельскохозяйственных культур и плодородие почвы, следует готовить тщательно, так как они продолжают одну или более ротаций севооборота.

Темы дипломных работ здесь могут быть самые разнообразные, поэтому студент с преподавателем выбирают реальные для работы вопросы.

2.7. Разработка системы удобрения в хозяйстве

Наряду с вышеперечисленной тематикой дипломных работ студент, находясь на производственной практике, может собрать данные для детальной разработки системы удобрения для целого хозяйства или крупного отделения. Если в хозяйстве уже разработана и применяется система удобрения, студент может дать ей глубокий и всесторонний, с освещением положительных и отрицательных сторон, анализ и предложить пути к совершенствованию и улучшению.

Для разработки системы удобрения в хозяйстве студент во время прохождения производственной практики должен собрать следующие данные:

1. Агрохимическая характеристика почв за последние два тура агрохимобследования: типы почв, гранулометрический состав, содержание гумуса, P_2O_5 и K_2O , микроэлементов, обменная кислотность ($pH_{КС1}$) – по полям севооборотов, другим угодьям и средневзвешенные значения по хозяйству.

2. Севообороты в хозяйстве – чередование культур.

3. Посевные площади и урожайность по культурам за последние 3 года.

4. План развития животноводства, его выполнение – поголовье по видам скота на 1/01 года предшествующего разработке системы удобрений.

5. Фактический выход навоза и других органических удобрений в хозяйстве за последние три года. Насыщенность органических удобре-

ний в расчете на 1 га пашни, 1 га земель сельскохозяйственного пользования.

6. Уровень применения минеральных удобрений за последние три года: азотные, калийные и фосфорные в д. в. всего и в расчете на 1 га пашни, 1 га земель сельскохозяйственного пользования. Общее количество применяемых минеральных удобрений в физической массе по видам.

7. Фактическое состояние применения органических удобрений под возделываемые культуры в хозяйстве за последний год, перед разработкой системы удобрений.

8. Задания по производству растениеводческой продукции, плановые показатели по уровню урожаев сельскохозяйственных культур.

9. Наличие машин, их марки и качество для внесения удобрений.

10. Объемы работ по агрохимическому обслуживанию, выполняемые районным объединением «Агросервис» и силами хозяйства – перечислить виды работ.

При разработке системы удобрения в хозяйстве необходимо отразить в дипломной работе следующие разделы. В обзоре литературы следует остановиться на факторах эффективности удобрений. В дипломной работе должно быть описано экономическое состояние хозяйства, дан анализ его местонахождения, направление, приведена урожайность сельскохозяйственных культур за 3 года, данные по рентабельности, даны схемы принятых севооборотов, сведения о наличии складов удобрений.

Необходимо дать характеристику метеорологических условий хозяйства, его почвенного покрова, состояния окультуренности, привести агрохимические показатели почвы по полям севооборотов. Нужно подробно проанализировать данные по обеспеченности почвы гумусом, подвижными формами фосфора и калия, микроэлементами, наличию кислых почв, нуждающихся в известковании.

Следует рассчитать дозы органических и минеральных удобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур с учетом агрохимических показателей почв, используя рекомендации. Для расчета доз удобрений можно воспользоваться программами, разработанными для персональных компьютеров. Систему удобрения разрабатывают по каждому конкретному полю для всех выращиваемых в хозяйстве сельскохозяйственных культур.

Все данные по дозам органических и минеральных удобрений нужно сгруппировать в таблицы и определить насыщенность 1 га пашни или других угодий.

Очень важным моментом при разработке системы удобрения является составление плана применения удобрений для севооборотов, сенокосов и пастбищ, а также других угодий, имеющих в хозяйстве. Необходимо дать описание и обоснование приемов удобрения под сельскохозяйственные культуры с указанием доз макро- и микроудобрений в физической массе конкретных туков, машин для их внесения, способ заделки удобрений.

Для обеспечения высокой эффективности минеральных и органических удобрений необходимо составить план известкования кислых почв для севооборотов, сенокосов и пастбищ, а также других угодий.

Для оценки разработанной системы удобрения для севооборотов рассчитывается баланс питательных элементов и гумуса. В случае необходимости при неудовлетворительном балансе проводится корректировка доз удобрений в сторону увеличения или снижения, а при недостатке органических удобрений разрабатываются мероприятия по их увеличению. Завершается дипломная работа расчетом экономической и энергетической эффективности разработанной системы удобрения сельскохозяйственных культур. Система удобрения должна быть экономически оправданной.

Необходимо рассчитать общую потребность хозяйства в минеральных удобрениях по видам, формам, а также срокам их поступления в хозяйство.

Если есть возможность, то перед защитой работы надо познакомиться со своими предложениями руководство хозяйства и специалистов.

В настоящее время большое внимание уделяется комплексному применению средств химизации. Поэтому студенты могут выполнять дипломную работу по следующей теме «Система применения удобрений при возделывании озимой пшеницы по интенсивной технологии». Аналогичная тема может быть и при возделывании других культур.

2.8. Система применения удобрений при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур

Такая система удобрения рассчитывается для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. При этом ведущую роль отводят комплексному применению удобрений, гербицидов, фунгицидов, регуляторов роста стимулирующего действия, микроудобрений. Ведущая роль при этом отводится дробному применению азотных удобрений при возделывании зерновых и других сельскохозяйствен-

ных культур на основе почвенно-растительной диагностики, интегрированной защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. При этом должное внимание должно быть уделено совмещению операций по внекорневым подкормкам зерновых культур жидким азотным удобрением КАС с внесением гербицидов, фунгицидов, микроудобрений, регуляторов роста стимулирующего действия, а также использованию баковых смесей фунгицидов с регуляторами роста, микроудобрениями, другими изученными и допустимыми комбинациями по совместному применению средств химизации. Совмещение операций по внесению удобрений и средств защиты растений зерновых и других сельскохозяйственных культур позволяет снизить затраты на их внесение, а в отдельных случаях снизить дозы средств защиты растений в результате усиления их действия при совместном внесении с жидким азотным удобрением КАС.

Выполнение дипломных работ по такой тематике можно осуществлять по экспериментальному пути, т. е. при постановке полевых опытов, либо путем анализа комплексного применения средств химизации в хозяйстве.

Главной задачей при выполнении дипломной работы по такой тематике будет выявление действия комплексного применения удобрений и средств защиты растений в повышении урожайности, улучшении качества продукции в сравнении с аналогичными показателями, полученными при возделывании культур по обычной технологии.

Примерный план при выполнении дипломной работы по данным экспериментальных исследований состоит из следующих разделов:

Введение.

Глава I. Обзор литературы по теме дипломной работы.

Глава II. Условия и методика проведения исследований.

Глава III. Результаты исследований и их обсуждение.

Глава IV. Экономическое обоснование результатов исследований.

Глава V. Охрана труда при работе с удобрениями.

Глава VI. Охрана природы при применении удобрений.

Выводы и предложения производству.

Литература (список).

Приложения.

Во введении необходимо показать значимость изучаемого вопроса для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, состояние его изученности и использования в сельском хозяйстве, определить основные цели и задачи дипломной работы.

В главе «Обзор литературы» необходимо показать изученность исследуемого вопроса; какие его стороны к настоящему времени уже известны, где они выполнены, когда и кем. Надо критически осмыслить имеющиеся результаты исследований, указать, что еще недостаточно изучено и требует дальнейшего уточнения. При анализе литературы следует выделить основные моменты и по ним сделать соответствующие заключения, высказать личную точку зрения автора по всем основным вопросам литературного обзора.

В тексте должны быть ссылки на источники литературы, которые использовал дипломник при написании дипломной работы в соответствии со списком литературы. Желательно, чтобы студент проработал не только отечественную, но и зарубежную научную литературу. Литературными источниками могут быть монографии, статьи в научных и научно-практических журналах, учебники, учебные пособия, рекомендации, методические пособия, научные труды вузов и научно-исследовательских институтов, тезисы докладов, материалы научных конференций и т. д.

В главе «Условия и методика проведения исследований» необходимо указать полное название почвы, на которой проводились опыты. Привести агрохимические свойства почвы (гумус, реакция почвы, содержание подвижных форм фосфора, калия и другие показатели), метеорологические условия по годам исследований. Учитывая, что действие удобрений существенно зависит от метеорологических условий выполнять дипломные работы можно лишь в том случае, если имеются как минимум двухлетние урожайные данные с исследуемыми в опытах культурами.

Необходимо проанализировать метеорологические условия по декадам месяцев вегетационного периода, сопоставить их со среднемесячными данными и сделать заключение, каким был тот или иной месяц, вегетационный период (засушливым, холодным и т. д.). Приведенные агрохимические показатели следует сопоставить с группировкой по агрохимическим показателям, принятой в республике, и указать, каково было содержание в почве гумуса, подвижных форм питательных элементов (низким, средним и т. д.), реакция почвы (среднекислая, слабокислая и т. д.).

В этой главе следует привести схему опыта, дозы вносимых удобрений, норму посева семян, повторность в опыте, общую и учетную площадь делянки, способ размещения делянок внутри повторений, нарисовать схему размещения вариантов опыта в натуре, описать и

сослаться на методику всех наблюдений и анализов; отметить, какие наблюдения и оценки проводились в течение вегетационного периода (метеорологические и фенологические наблюдения, наблюдения за изменением роста, динамика нарастания сухого вещества и поступления питательных элементов в растения по фазам развития, определение полевой всхожести и выживаемости растений после перезимовки, элементов структуры урожая, оценка устойчивости зерновых, льна и других культур к полеганию и т. д.).

Глава «Результаты исследования и их обсуждение» является главной частью работы. Результаты исследований необходимо представить в виде таблиц, графиков, рисунков и фотографий, урожайные данные, показатели качества урожая (белок, крахмал, жир и др.), данные, полученные при наблюдениях, необходимо статистически обработать. Отдельные вопросы, рассматриваемые в дипломной работе, желательно выделять в виде разделов, например, «Действие новых форм азотных удобрений на урожайность ячменя», «Действие систем удобрения на качество клубней картофеля» и т. д.

Каждый показатель должен быть подробно проанализирован. Следует показать отклонения урожайности от контроля без удобрений или контрольного фоновго варианта, произвести расчет окупаемости 1 кг NPK кг продукции (зерна, клубней и т. д.). Следует показать изменчивость того или иного показателя (урожайность, белок, крахмал, содержание витамина С и т. д.) в зависимости от доз, форм и способов внесения удобрений, метеорологических условий, сортовых особенностей, влажности почвы, обеспеченности питательными элементами на протяжении вегетационного периода, реакции среды и т. д.

Данные опыта по урожайности указывают по повторностям и приводят в приложении, где показывают и математическую обработку результатов опыта.

В главе «Экономическое обоснование результатов исследований» студент должен привести данные прибавки урожайности, полученной от изучаемого приема, стоимость основной и побочной продукции, прибавки, затраты, связанные с применением удобрений, и затраты на уборку и доработку, рассчитать чистый доход и рентабельность.

В главе «Охрана труда при работе с удобрениями» следует изложить организационные мероприятия, указать ответственных за охрану труда, кого допускают к работе с удобрениями и пестицидами, а также порядок проведения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем

месте, правила техники безопасности при работе с удобрениями и другими средствами химизации. Данный раздел консультирует преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности.

В главе «Охрана природы при работе с удобрениями» необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по предотвращению поверхностного и грунтового стока агрохимикатов в водоемы, провести мероприятия по контролю за накоплением тяжелых металлов в почвах и растениеводческой продукции.

Выводы должны быть конкретными и вытекать из полученных результатов исследований «Предложения производству» представляются в дипломной работе только после двух-, трехлетних исследований дипломника.

Литературу, используемую при выполнении дипломной работы, оформляют согласно ГОСТу.

В разделе «Приложения» приводятся данные по влажности, динамике подвижных соединений элементов питания в почве, математической обработке основных результатов и другую информацию, дополняющую основные результаты исследований.

Ориентировочный план дипломной работы по теме «Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур в хозяйстве, отделениях». В этом плане особое внимание уделено двум важнейшим разделам: анализу производственной деятельности хозяйства и разработке системы удобрения.

Ниже приведен примерный перечень глав и разделов по данной теме.

Введение.

Глава 1. Обзор литературы.

1.1. Факторы эффективности удобрений (тип почвы, гранулометрический состав, кислотность почвы, биологические особенности сельскохозяйственных культур, агрохимические показатели почвы, обеспеченность влагой, агротехнические условия, способы внесения удобрений, эродированность почв).

1.2. Методы расчета доз удобрений на планируемый урожай.

Глава 2. Агроэкономическая характеристика хозяйства.

2.1. Местоположение хозяйства, история образования, развития.

2.2. Анализ растениеводческой отрасли хозяйства, отделения (специализация, севообороты, урожайность за 3 последних года, себестоимость основных видов растениеводческой продукции, возделываемые в хозяйстве сорта сельскохозяйственных культур).

2.3. Анализ использования удобрений за 3 последних года, их окупаемость.

Глава 3. Агроклиматические и почвенно-агрохимические условия хозяйства.

3.1. Агроклиматические условия хозяйства (среднемесячная температура воздуха, сумма атмосферных осадков, сумма активных температур воздуха и т. д.).

3.2. Характеристика почвенного покрова (основные типы, подтипы, виды и разновидности почв, физико-химические свойства почв; особенности формирования водного режима).

3.3. Агрохимическая характеристика почв хозяйства (по полям севооборотов, других угодий, приводятся данные по содержанию гумуса, обменной кислотности (рН КСІ), гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований, степень насыщенности почв основаниями, содержание подвижных соединений фосфора, калия, микроэлементов, магния и кальция).

Глава 4. Система удобрения сельскохозяйственных культур.

4.1. План накопления и распределения органических удобрений.

4.2. Разработка плана применения удобрений для севооборотов, сенокосов и пастбищ, садов и ягодников, внесевооборотных участков (кукуруза и т. д.). В этом подразделе в виде таблиц приводятся дозы органических и минеральных удобрений, микроэлементов по срокам внесения (основное, припосевное и подкормки).

Дается также описание и обоснование приемов удобрения с указанием используемых форм удобрений в физической массе.

4.3. Баланс питательных элементов и гумуса в севооборотах.

После расчета баланса питательных элементов и гумуса дается оценка разработанной системы удобрения. Если баланс питательных элементов и гумуса не укладывается в рекомендуемые рамки, корректируются дозы минеральных удобрений в сторону увеличения или снижения. При отрицательном балансе гумуса разрабатываются мероприятия по увеличению выхода органических удобрений или делаются предложения по изменению структуры посевных площадей (увеличению площадей, занятыми под посевами многолетних трав, промежуточных культур (яровой рапс, редька масличная и др.).

4.4. План известкования в севооборотах и в других угодьях.

4.5. Составление годового и календарного плана применения удобрений.

Глава 5. Экономическое обоснование системы удобрения сельскохозяйственных культур в хозяйстве.

Глава 6. Охрана труда при работе с удобрениями.

Глава 7. Охрана природы при работе с удобрениями.

Выводы.

Литература.

Приложения.

Разъяснения для выполнения отдельных разделов работы можно найти в предыдущем разделе.

Защита дипломной работы должна определить подготовленность специалиста, выявить его научно-производственную зрелость, умение на производстве применять знания, полученные в вузе.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЯХ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

С учетом основных факторов, определяющих баланс гумуса в почве (структуры посевных площадей, гранулометрический состав почв, уровень применения органических и минеральных удобрений, погодные и другие условия), для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве на 1 га пашни в республике необходимо вносить не менее 12 т/га органических удобрений в пересчете на 75%-ную влажность (табл. 1).

Институтом почвоведения и агрохимии НАН РБ разработаны нормативы потребности в органических удобрениях [9] для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах республики (табл. 1, 2).

Таблица 1. Потребность в органических удобрениях для бездефицитного баланса гумуса по областям Республики Беларусь

| Область | Требуется для бездефицитного баланса гумуса | | Возможное накопление, млн. т условного навоза | | | |
|---------------------|---|------|---|--------------------------|--------|------|
| | млн. т | т/га | за счет навоза и компостов | за счет заправки соломой | Всего | |
| | млн. т | т/га | | | млн. т | т/га |
| Брестская | 9,8 | 14,6 | 8,4 | 1,7 | 10,1 | 15,0 |
| Витебская | 6,6 | 8,5 | 7,4 | 1,0 | 8,4 | 10,8 |
| Гомельская | 10,5 | 15,3 | 6,7 | 1,9 | 8,6 | 12,5 |
| Гродненская | 8,7 | 12,3 | 7,9 | 1,6 | 9,5 | 13,4 |
| Минская | 12,9 | 11,9 | 11,8 | 2,1 | 13,9 | 12,9 |
| Могилевская | 7,5 | 10,4 | 5,9 | 1,4 | 7,3 | 10,2 |
| Республика Беларусь | 55,8 | 12,0 | 46,8 | 9,7 | 56,5 | 12,1 |

Таблица 2. Нормативы потребности в органических удобрениях для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах, т/га

| Почвы | % пропашных культур | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 10 | | | | 20 | | | | 30 | | | |
| | % многолетних трав | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Дерново-подзолистые: | | | | | | | | | | | | |
| суглинистые | 10 | 9 | 7 | 6 | 14 | 13 | 11 | 10 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| супесчаные | 12 | 11 | 9 | 8 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| песчаные | 14 | 13 | 11 | 10 | 19 | 18 | 16 | 15 | | | | |

Если в почвах хозяйства не достигнуто оптимальное содержание гумуса, то, воспользовавшись табл. 3, можно установить дополнительную потребность в органических удобрениях для достижения положительного баланса гумуса.

Таблица 3. Нормативы дополнительной потребности в органических удобрениях для достижения положительного баланса гумуса, т/га

| Содержание гумуса, % | Гранулометрический состав почвы | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| | Суглинистые | Супесчаные, подстилаемые мореной | Супесчаные, подстилаемые песком | Песчаные |
| До 1,50 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,3 |
| 1,51–2,00 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
| 2,01–2,50 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Более 2,50 | 0,5 | 0,6 | – | – |

Пример. В полевом севообороте на площади 1000 га на долю пропашных культур приходится 10 %, многолетних трав – 20 %. Почва суглинистая. Содержание гумуса – 1,81 %.

Для бездефицитного баланса гумуса в почве насыщенность органическими удобрениями равна 9 т/га, для положительного – необходимо на 2 т больше, а в сумме – 11 т/га. На 1000 га севооборотной площади потребность в органических удобрениях составит 11000 т.

Аналогичным образом определяют потребность в органических удобрениях для всех севооборотов в хозяйстве.

Потребность в органических удобрениях для перезалужения культурных сенокосов и пастбищ определяют, умножая дозы их внесения (40–50 т/га) на площадь, подлежащую перезалужению (15–20 % от всех площадей ежегодно подлежат перезалужению). Например, при

ежегодном перезалужении на площади 100 га потребуется 4000 т органических удобрений (40×100).

Если планируется коренное улучшение естественных сенокосов и пастбищ дозы внесения органических удобрений на минеральных почвах рассчитываются так же, как и при перезалужении культурных сенокосов и пастбищ.

При возделывании кукурузы на постоянных участках (в монокультуре) насыщенность органическими удобрениями можно принять на уровне 20–30 т/га при внесении один раз в 2 года. Зная площадь посева кукурузы, легко вычислить потребность в органических удобрениях для этой культуры.

При подготовке почвы под посев люцерны рекомендуется вносить по 40–50 т/га органических удобрений.

Насыщенность органическими удобрениями в садах рекомендуется в дозах 15–20 т/га. Следует применять их раз в 2–3 года в дозе 30–60 т/га для плодовых культур (прил. 36, 37), для ягодников – (прил. 38–40).

Общая потребность в органических удобрениях для хозяйства в целом будет равна сумме расчетных величин потребностей в них для севооборотов, перезалужения культурных сенокосов и пастбищ, кукурузы в монокультуре, люцерны, садов и ягодников.

4. РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ НАВОЗА В ХОЗЯЙСТВЕ

Объем накопления и использования навоза в хозяйстве берут по фактическому его производству в среднем за последние три года. При отсутствии таких данных можно рассчитать возможное накопление навоза с учетом имеющегося в хозяйстве поголовья скота. Расчет рекомендуется производить в такой последовательности.

1. Имеющееся в хозяйстве поголовье скота переводят в условные головы, применяя следующие коэффициенты: коровы, быки, лошади – 1,0, прочий крупный рогатый скот – 0,6, свиньи – 0,3, овцы и козы – 0,1, птица – 0,02.

2. Определяют количество скота, содержащегося зимой на подстилке, летом – на пастбище, на подстилке при стойловом содержании круглый год и без подстилки в комплексах. Принимают, что от общего поголовья скота в условных головах 40 % содержится на подстилке зимой и летом на пастбище, 40 % – на подстилке в стойлах круглый год, 20 % – в комплексах без подстилки.

3. Определяют подстилочный материал и выход навоза от одной условной головы. В зависимости от способа содержания скота, вида и количества подстилки выход подстилочного навоза на условную голову (с учетом неизбежных потерь – 15 %) в год будет равен:

- при стойловом содержании зимой и пастбищном – летом на соломенной подстилке 6 кг в сутки на голову – 11,5 т, 8 кг – 12,5 т, на торфяной подстилке – 4 кг верхового торфа на голову в сутки – 11,0 т, 10 кг низинного торфа в сутки – 14 т;

- при круглогодичном стойловом содержании на соломенной подстилке при 6 кг в сутки на голову – 16 т, при 8 кг соломы – 17 т, на торфяной подстилке при 4 кг верхового торфа в сутки на голову – 15,5 т, при 10 кг низинного торфа – 17,5 т;

- выход бесподстилочного навоза на условную голову в год составляет 20 т.

Результаты расчетов по накоплению навоза в хозяйстве записывают в таблицу рабочей тетради и определяют накопление навоза в целом по хозяйству. При этом жидкий бесподстилочный навоз необходимо перевести в стандартный, используя формулу для расчета переводного коэффициента:

$$K = \frac{100 - \text{влажность исходная}}{100 - \text{влажность стандартная}}.$$

Например, исходная влажность жидкого навоза – 93 %. Пересчетный коэффициент

$$K = \frac{(100 - 93)}{(100 - 75)} = \frac{7}{25} = 0,28.$$

В тех случаях, когда влажность органических удобрений не определяется, можно использовать усредненные переводные коэффициенты на базисную форму органических удобрений: для всех видов подстилочного навоза и компостов на его основе – 1,0, для полужидкого навоза при внесении без разбавления – 0,5, для жидкого навоза комплексов – 0,2, для навозных стоков – 0,06.

При расчете выхода органических удобрений в хозяйстве следует учитывать такой важный источник поступления органического вещества в почву, как расширение посева многолетних бобовых трав и их смесей со злаковыми травами, а также промежуточных культур. Расширение посевов многолетних трав на 1 га сверх норматива для достижения бездефицитного баланса гумуса на почвах с баллом 30–40 эквивалентно в среднем 15 т навоза, а с баллом 40–50 и выше – 20 т.

Каждый гектар посева промежуточных и пожнивных культур при использовании зеленой массы на удобрение дает увеличение запаса органического вещества в почве при балле пашни от 30 до 50 на 8–10 т, а при использовании зеленой массы на корм и запашке корневых и пожнивных остатков 4–5 т/га [5].

Сопоставив потребность в навозе с выходом его, в хозяйстве разрабатывают мероприятия по увеличению выхода органических удобрений (увеличение нормы подстилки, приготовление компостов, использование зеленого удобрения и др.) и определяют площади возделывания многолетних трав и промежуточных культур в производственных подразделениях хозяйства.

При необходимости приготовления компостов планируют объем их приготовления и отражают в таблице рабочей тетради. Затем распределяют органические удобрения по объектам использования (севообороты, перезалужение, кукуруза и люцерна вне севооборота, сады), по видам удобрений. При этом учитывают насыщенность, принятую при определении потребности хозяйства в органических удобрениях.

Следует запланировать и изложить мероприятия по увеличению количества органических удобрений и упорядочению их хранения, если выход навоза в хозяйстве не покрывает его потребность. Необходимо отразить соотношение компостируемых реагентов (навоз подстилочный, полужидкий, жидкий, торф, солома, лигнин, птичий помет и др.) и показать технологию приготовления компостов.

5. РАЗРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ПЛАНОВ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТАХ НА ПАШНЕ И ДРУГИХ УГОДЬЯХ

В бланк курсовой работы следует вписать принятое чередование культур в севообороте, агрохимическую характеристику почвы, площади полей и угодий, уровни запланированных урожаев.

Разработку плана применения удобрений необходимо начать с органических удобрений в севообороте с учетом принятой насыщенности определяют дозы и культуры, под какие будут вноситься органические удобрения. Желательно планировать внесение органических удобрений в севообороте с учетом продолжительности их действия (в условиях Беларуси через 4–5 лет).

Дозы внесения определяются наличием органических удобрений и биологическими особенностями культур. Хорошо отзываются на внесение органических удобрений и высоко оплачивают их урожаем та-

кие культуры, как картофель, сахарная и кормовая свекла, капуста, огурцы, кукуруза, озимые зерновые, люцерна и другие многолетние травы [2].

С учетом сказанного следует принять правильное решение о дозах и месте внесения органических удобрений в севообороте. Например, в 8-польном севообороте при насыщенности органическими удобрениями 12,5 т/га можно при равновеликих полях внести под пропашные культуры (первое поле) 70 т/га, а под озимые (второе поле) – 30 т/га, так как масса их на 8 полей равна 100 т/га. Примерные дозы внесения органических удобрений под культуры приведены в прил. 2.

Для определения доз минеральных удобрений в агрохимической практике используют следующие методы:

- **балансовые** – на основе данных выноса урожаем питательных элементов и коэффициентов их использования из почвы и удобрений;
- **по результатам полевых опытов** с применением поправочных коэффициентов на агрохимические свойства почв, а также с учетом действия других факторов, определяющих эффективность удобрений;
- **нормативные** – по нормативам затрат минеральных удобрений на единицу урожая или на прибавку урожая;
- **математические** – на основе производственных функций в системе «почва–растение–удобрение»;
- **целенаправленного регулирования плодородия почв.**

Все методы расчета доз удобрений можно разделить на две группы:

- а) на получение планируемых урожаев сельскохозяйственных культур;
- б) для проведения комплексного агрохимического окультуривания полей.

В первом случае в методиках расчетов применяются коэффициенты использования питательных элементов из почвы и удобрений, коэффициенты возмещения выноса, нормативы затрат удобрений, производственные функции.

При расчете доз удобрений для агрохимического окультуривания полей преследуется цель довести содержание питательных элементов в почве до оптимальных или заданных параметров. При этом используются нормативы изменения их содержания на 10 мг на 1 кг для различных типов почв, установленные на основании длительных полевых опытов с удобрениями [8].

Дозы минеральных удобрений D (кг/га) с применением коэффициентов использования питательных элементов из удобрений и почвы рассчитываются по формуле

$$Д = \frac{100УВ - ПКП}{Ку},$$

где У – планируемая урожайность, т/га;

В – нормативный вынос элементов с 1 т основной и соответствующим количеством побочной продукции, кг;

П – содержание питательных элементов в пахотном слое почвы, кг/га;

Кп и Ку – коэффициенты использования питательных элементов соответственно из почвы и удобрений, %.

При использовании нормативов затрат удобрений на единицу урожая применяют формулу

$$Д = УН_1К,$$

где Д – доза удобрений, кг/га;

Н₁ – нормативы затрат удобрений на единицу урожая, кг/ц;

К – поправочный коэффициент на содержание подвижного фосфора и калия в почвах (при расчете доз азотных удобрений К = 1).

Формула для расчетов доз удобрений по нормативам затрат на единицу прибавки урожая имеет следующий вид:

$$Д = У_пН_2К,$$

где У_п – планируемый прирост урожайности за счет удобрений, ц/га;

Н₂ – нормативы затрат удобрений на единицу прибавки урожая, кг/ц.

Нормативы затрат питательных элементов для формирования 1 ц урожая приведены в прил. 63.

Общую дозу фосфорных и калийных удобрений при агрохимическом окультуривании полей за ротацию севооборота или другой период времени рассчитывают по формуле

$$Д = 0,1(C_1 \cdot C_2)Н,$$

где С₁ и С₂ – соответственно планируемое и фактическое содержание питательных элементов в почве, мг/кг;

Н – нормативная доза питательного элемента сверх выноса его с урожаем для увеличения содержания на 10 мг/кг почвы, кг/га (прил. 50, 51).

В сельскохозяйственном производстве чаще других используется балансовый метод определения доз минеральных удобрений с использованием коэффициентов возврата (коэффициентов возмещения выноса), который позволяет рассчитать оптимальную дозу удобрений для сельскохозяйственных культур как в целом по хозяйству, так и для конкретного поля или отдельно удобряемого участка.

Для расчета доз минеральных удобрений по коэффициентам возмещения выноса используется формула

$$Д = \frac{УВК_v}{1000},$$

где K_v – коэффициент возмещения выноса, %;

B – нормативный вынос, кг.

Коэффициент возмещения выноса питательных элементов урожаем (K_v) определяется как отношение оптимальной дозы удобрения (D_{opt}) по результатам полевых опытов (кг/га д.в.) к выносу питательных элементов урожаем (B_{opt} , кг/га) в оптимальном варианте ($K_v = D_{opt} : B_{opt}$). Величина коэффициентов возмещения зависит от типа и гранулометрического состава почв, запасов в них фосфора и калия, биологических особенностей растений.

Разработаны коэффициенты возврата элементов питания, дифференцированные по интервалу урожайности возделываемых культур до 1 ц/га, что позволяет более точно определять потребность в минеральных удобрениях. По ряду сельскохозяйственных культур уточнены и дополнены прежние нормативы выноса элементов питания. Для загрязненных в результате аварии на ЧАЭС радионуклидами почв, которые находятся в сельскохозяйственном использовании, разработаны параметры дополнительной потребности в фосфорных и калийных удобрениях, соответствующие, принятым в настоящее время в Республике Беларусь, нормативным документам (прил. 16–17).

5.1. Расчет оптимальных доз минеральных удобрений с использованием рекомендаций и компьютерных программ

Ориентировочно дозы органических и минеральных удобрений под основные сельскохозяйственные культуры можно рассчитать, воспользовавшись рекомендуемыми дозами для дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв, разработанных РУП «Институт почвоведения и агрохимии» (прил. 64, 65) [9].

В настоящее время для расчета доз удобрений широко используются компьютерные программы. Методика, разработанная в Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, предполагает расчет потребности в минеральных макро- и микроудобрениях на планируемый урожай и распределение их по ассортименту [8]. При представлении входного документа по фактическим ресурсам удобрений (количе-

ство по видам и формам) методика предполагает вариант соответствующего распределения их по полям и культурам.

Для решения задачи по разработке системы удобрения сельскохозяйственных культур на компьютере заполняются два входных документа:

- размещение посевов и планируемая урожайность сельскохозяйственных культур на 20__ год (прил. 3 и 4);
- количество и ассортимент минеральных удобрений, подлежащих распределению (прил. 5).

В форме «Размещение посевов и планируемая урожайность сельскохозяйственных культур» (прил. 3) в графах 2 и 3 указывается площадь поля и номера входящих в него элементарных участков. Удобряемое поле или участок могут включать один или несколько элементарных участков. Исходя из этой информации, компьютер, обращаясь к банку данных, будет определять необходимые параметры агрохимических свойств для расчета системы удобрения: $pH_{КС}$, P_2O_5 , K_2O , гумус, В, Си, Zn и др.

Если в банке данных отсутствует необходимая информация о параметрах агрохимических свойств соответствующих полей, в графе 3 вместо номера элементарных участков указываются их соответствующие агрохимические показатели ($pH_{КС}$, P_2O_5 (мг/кг), K_2O (мг/кг), гумус (%)) (прил. 4).

В графе 4 указывается балл плодородия поля (рабочего участка).

В графе 5 указывается код предшественника (прил. 6).

Признаки вегетации сельскохозяйственных культур (графа 6) классифицируются следующим образом: основная культура – 1, повторная (поживная, поукосная) – 2, озимые урожая будущего года – 3.

Культура, непосредственно размещаемая на поле или рабочем участке, указывается в графе 7 в соответствии с ее кодом из прил. 6.

Планируемая урожайность сельскохозяйственных культур записывается один раз при ее первом упоминании во входном документе в графе 8. Дифференциация уровня урожайности по полям осуществляется с учетом реального плодородия, почвы (балла). Необходимо отметить, что урожай зерна до 40 ц/га (или соответствующего количества другой продукции) можно планировать и обеспечить получение на почвах при различном содержании фосфора и калия, однако для получения урожайности 60 и более центнеров необходимы хорошо окультуренные почвы с содержанием подвижного фосфора и калия не менее 200 мг/кг.

В графах 9–10 указывается планируемое внесение органических удобрений: код удобрений согласно прил. 18 и доза удобрения в т/га.

В графах 11–12 приводятся данные по радиоактивному загрязнению почв цезием-137 и стронцием-90.

Количества и ассортимент минеральных удобрений, подлежащих распределению (прил. 5), заполняется агрономом хозяйства (фермером) при желании иметь оптимизированную модель наиболее эффективного распределения форм минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры. В этом документе указывается общее количество макро- и микроудобрений по видам в килограммах (кг) действующего вещества (д. в.), а также по формам в физической массе в килограммах.

Дифференциация заданных уровней урожайности сельскохозяйственных культур по полям и отдельно удобряемым участкам

Для расчета потребности в удобрениях во входном документе (прил. 3 или 4) землепользователем указывается планируемая урожайность по сельскохозяйственным культурам в среднем по хозяйству. Однако возможность формирования их урожайности на различных полях и рабочих участках не одинаковая и зависит от целого ряда факторов, важнейшими из которых являются почвенно-агрохимические характеристики почвы (тип и гранулометрический состав, степень увлажнения, подстилающая порода, основные агрохимические показатели (кислотность, содержание гумуса, подвижных соединений фосфора и калия и т. д.).

Комплексным показателем почвенного плодородия является бонитет. Поэтому наиболее объективно дифференцировать плановую урожайность культур по полям и рабочим участкам можно на основе их балльной оценки.

Алгоритм расчета дифференцированной по полям и рабочим участкам урожайности сельскохозяйственных культур

а) выделяются все поля или рабочие участки, где планируется возделывание данной культуры и рассчитывается средневзвешенный оценочный балл плодородия почвы (Бс):

$$B_c = \frac{(B_1 \cdot S_1) + (B_2 \cdot S_2) + \dots (B_n \cdot S_n)}{S_1 + S_2 + \dots S_n},$$

где $B_{1,2,\dots,n}$ – балл плодородия по полям или рабочим участкам;

$S_{1,2,\dots,n}$ – площади полей или рабочих участков.

б) определяется цена урожайности (Π_y) в расчете на один средне-взвешенный балл:

$$\Pi_y = \frac{Y_x}{B_c},$$

где Y_x – планируемая урожайность культуры в целом по хозяйству, ц/га.

в) производится расчет дифференцируемой урожайности (Y_d) по каждому полю или рабочему участку:

$$Y_d = B_{1,2,\dots,вх} \Pi_y.$$

Дозы минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под сельскохозяйственные культуры рассчитываются балансовым методом с использованием коэффициентов возврата элементов питания и поправочных величин к коэффициентам возврата. При расчетах учитываются биологические особенности культурных растений (вынос элементов питания с 10 ц основной и соответствующего количества побочной продукции, способность растений усваивать элементы питания из почвы, минеральных и органических удобрений, симбиотическая фиксация азота), почвенно-агрохимические условия (тип и гранулометрический состав почвы, степень кислотности, содержание гумуса, подвижных форм фосфора, калия, а также микроэлементов), уровень планируемых урожаев, вид и количество вносимых органических удобрений под основную и предшествующую культуру [8].

Коэффициенты возмещения выноса элементов питания и поправочные величины к ним разработаны на основании обобщения полевых опытов с удобрениями, проведенными научно-исследовательскими учреждениями Республики Беларусь с использованием интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

5.1.1. Биологические особенности сельскохозяйственных культур

В основе расчетов доз удобрений лежит вынос элементов питания планируемым урожаем. Вынос элементов питания планируемым урожаем определяется путем умножения планируемого урожая на удельный (нормативный) вынос элементов питания с 10 ц основной и соот-

ветствующего количества побочной продукции (прил. 6). Удельный (нормативный) вынос, используемый для расчетов, разработан Институтом почвоведения и агрохимии на основании обобщения результатов полевых опытов с удобрениями, проведенными научно-исследовательскими учреждениями Республики Беларусь.

Из биологических особенностей предшествующих культур учитывается их способность к азотонакоплению в почве для последующих сельскохозяйственных культур. В связи с этим выделяются пять групп предшественников:

- многолетние бобовые травы – код 691–695, 698;
- однолетние бобовые травы – код 611–618;
- многолетние бобово-злаковые травы – код 687–688;
- однолетние бобово-злаковые травы – код 221–224, 620–621, 651;
- зернобобовые культуры – код 211–218.

Если сельскохозяйственные культуры размещаются после однолетних и многолетних бобовых трав (коды 611–618, 691–695, 698), то расчетная доза азотных удобрений уменьшается на 20 кг/га, если предшественниками являются зернобобовые культуры, однолетние и многолетние бобово-злаковые травосмеси (коды 211–218, 221–224, 620–621, 651, 687–688), то доза азота снижается на 10 кг/га.

При возделывании однолетних и многолетних бобовых трав, а также зернобобовых культур (коды 211–218, 611–618, 691–695, 698) внесение азотных удобрений не предусматривается.

5.1.2. Почвенные условия

Дозы минеральных удобрений дифференцируются в зависимости от типа и гранулометрического состава почв. Дифференциация осуществляется по трем основным группам почв:

1. Дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные, подстилаемые мореной;
2. Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные, подстилаемые песками;
3. Торфяно-болотные.

Коэффициенты возмещения выноса элементов питания и поправочные величины по группам почв и сельскохозяйственным культурам приведены в прил. 7–15.

В зависимости от содержания фосфора и калия в почве (табл. 4) коэффициенты возмещения выноса фосфора и калия дифференцируются

по группам (прил. 10–15). Коэффициенты возмещения выноса азота разработаны с учетом данных по влиянию азотных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур (прил. 7–9).

Таблица 4. Группы по содержанию подвижных форм фосфора и калия в почве (0,2 М НСІ – по Кирсанову)

| Группа | Содержание P_2O_5 , мг/кг почвы | | Содержание K_2O , мг/кг почвы | |
|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Минеральные почвы | Торфяно-болотные почвы | Минеральные почвы | Торфяно-болотные почвы |
| 1 | Менее 60 | Менее 200 | Менее 80 | Менее 200 |
| 2 | 61–100 | 201–300 | 81–140 | 201–400 |
| 3 | 101–150 | 301–500 | 141–200 | 401–600 |
| 4 | 151–250 | 501–800 | 201–300 | 601–1000 |
| 5 | 251–400 | 801–1200 | 301–400 | 1001–1300 |
| 6 | Более 400 | Более 1200 | Более 400 | Более 1300 |

С целью регулирования содержания в почвах элементов питания и более эффективного использования удобрений для почв с оптимальным содержанием P_2O_5 и K_2O (табл. 5) дозы фосфорных и калийных удобрений рассчитываются на уровне, необходимом для получения планируемых урожаев и поддержания плодородия почвы на оптимальном уровне.

Таблица 5. Оптимальные параметры агрохимических свойств почв

| Гранулометрический состав почвы | pH_{KCl} | P_2O_5 , мг/кг | K_2O , мг/кг | MgO , мг/кг | Гумус, % |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------|
| Глинистые и суглинистые | 6,0–6,7 | 250–300 | 200–300 | 150–300 | 2,5–3,0 |
| Супесчаные | 5,5–6,2 | 200–250 | 170–250 | 120–150 | 2,0–2,5 |
| Песчаные | 5,5–5,8 | 150–200 | 100–150 | 80–100 | 1,8–2,2 |
| Торфяно-болотные | 5,0–5,3 | 700–1000 | 600–800 | 450–900 | – |
| Минеральные почвы сенокосов и пастбищ | 5,8–6,2 | 120–200 | 150–200 | 90–120 | 3,5–4,0 |

На бедных почвах возмещение фосфора и калия рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить планируемый урожай сельскохозяйственных культур и повышение содержание подвижных форм фосфора и калия на 10–40 мг/кг на 5-польную ротацию севооборота. При высоком содержании P_2O_5 и K_2O в почве планируются лишь стартовые дозы фосфора и калия (20–30 кг/га д. в.), внесение которых возможно при посеве.

Расчет доз азотных удобрений (D_N) выполняется по формуле

$$D_N = \frac{B \cdot (Y_6 + Y_n) \cdot (K_{вб} - Y_n \cdot P_k)}{1000} - B_n,$$

где B – нормативный (удельный) вынос питательных веществ с 10 ц основной и соответствующего количества побочной продукции, (прил. 6), кг;

Y_6 – базовая (минимальная) урожайность (прил. 7–9), ц/га;

Y_n – планируемый прирост урожайности, ц/га;

$K_{вб}$ – коэффициент возврата при базовой урожайности (прил. 7–9), %;

P_k – поправочная величина к коэффициенту возврата (прил. 7–9);

B_n – поправка к дозе азотных удобрений в зависимости от биологических особенностей предшественников (коды 611–618, 691–695, 698–20 кг/га, коды 211–218, 221–224, 620–621, 651, 687–688 – 10 кг/га).

Расчет доз фосфорных удобрений ($D_{P_2O_5}$) выполняется по формуле

$$D_{P_2O_5} = \frac{B \cdot (Y_6 + Y_n) \cdot (K_{вб} - Y_n \cdot P_k) \cdot K_{pH}}{1000} + K_{рад},$$

где Y_6 – базовая (минимальная) урожайность, (прил. 10–12), ц/га;

$K_{вб}$ – коэффициент возврата при базовой урожайности, (прил. 10–12), %;

P_k – поправочная величина к коэффициенту возврата (прил. 10–12);

K_{pH} – коэффициент корректировки дозы P_2O_5 в зависимости от степени кислотности почвы (при $pH_{KCl} < 5,0$ – $K_{pH} = 1,2$; при $pH_{KCl} 5,1 - 5,5$ – $K_{pH} = 1,1$; при $pH_{KCl} > 5,5$ – $K_{pH} = 1,0$);

$K_{рад}$ – дополнительная потребность в фосфорных удобрениях на загрязненных радионуклидами почвах (прил. 16).

Расчет доз калийных удобрений (D_{K_2O}) выполняется следующим образом:

$$D_{K_2O} = \frac{B \cdot (Y_6 + Y_n) \cdot (K_{вб} - Y_n \cdot P_k) \cdot K_{pH}}{1000} + K_{рад},$$

где Y_6 – базовая (минимальная) урожайность (прил. 13–15), ц/га;

$K_{вб}$ – коэффициент возврата при базовой урожайности (прил. 13–15), %;

P_k – поправочная величина к коэффициенту возврата (прил. 13–15);

K_{pH} – коэффициент корректировки дозы K_2O для культур-кальцефобов (картофель, лен, люпин) в зависимости от степени кислотности почвы (при $pH_{KCl} < 5,6$ – $K_{pH} = 1,0$; при $pH_{KCl} 5,6–6,0$ – $K_{pH} = 1,1$; при $pH_{KCl} > 6,0$ $K_{pH} = 1,2$);

$K_{рад}$ – дополнительная потребность в калийных удобрениях на загрязненных радионуклидами почвах (прил. 17).

Следует учитывать, что алгоритмы расчета доз минеральных удобрений построены с использованием коэффициентов возврата и поправочных величин, при разработке которых уже учтены рекомендуемые дозы органических удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур (картофель, кормовые корнеплоды, сахарная свекла и кукуруза – 60 т/га, озимые зерновые культуры – 20 т/га), а также их последствие. Если при возделывании сельскохозяйственных культур по каким-либо причинам органические удобрения не применяются или применяются в иных дозах, корректировка рассчитанных доз минеральных удобрений проводится по формуле

$$D_{NPK} = (H_0 T_0 + H_1 T_1),$$

где D_{NPK} – доза азота, фосфора и калия, содержащаяся в органических удобрениях;

H_0 – доза органических удобрений в год возделывания культуры, т/га;

T_0 – количество элементов питания, используемое из одной тонны органических удобрений в год их внесения (прил. 18), кг;

H_1 – доза органических удобрений под предшественник, т/га;

T_1 – количество элементов питания, используемое из одной тонны органических удобрений во второй год действия (прил. 18), кг.

Приведенные формулы расчета доз азота, фосфора и калия с новой дифференциацией коэффициентов возмещения и поправочных величин к ним отражают нелинейный характер действия минеральных удобрений с выражением зоны их оптимального диапазона в зависимости от уровня почвенного плодородия и биологических особенностей культур.

Для исключения негативного влияния высоких доз удобрений вводятся экологические ограничения на применение азотных удобрений. Для минеральных удобрений разработан справочник контроля предельных доз удобрений, позволяющий исключить возможные ошибки при разработке системы удобрения (прил. 19).

Результаты исследований, проведенных с озимыми зерновыми культурами, показывают, что при возделывании на почвах с недоста-

точно высоким уровнем плодородия целесообразно предпосевное внесение небольших доз азотных удобрений – 30 % от расчетной дозы на планируемую урожайность. Осеннее внесение азота под озимые зерновые культуры исключается в следующих случаях:

- а) при возделывании на дерново-подзолистых суглинистых и песчаных почвах с содержанием гумуса более 2,0 %;
- б) при размещении после бобовых предшественников;
- в) если действие и последствие органических удобрений, вносимых на указанном поле, составляет более 20 кг/га азота.

Для определения количества потребляемого из органических удобрений азота в осенний период (N_o) используется формула

$$N_o = (H_o T_o + H_1 T_1),$$

где H_o – доза органических удобрений, планируемая под возделываемую культуру, т/га;

T_o – количество элементов питания, используемое из одной тонны органических удобрений в год их внесения (прил. 18), кг;

H_1 – доза органических удобрений, внесенная под предшествующую культуру, т/га;

T_1 – количество элементов питания, используемое из одной тонны органических удобрений во второй год действия (прил. 18), кг.

Следует также учитывать, что практически все применяемые в Республике Беларусь фосфорсодержащие удобрения (аммонизированный суперфосфат, аммофос, аммофосфат, диаммонийфосфат) содержат от 4 до 18 % азота, который озимые зерновые культуры используют с осени при предпосевном внесении фосфорсодержащих удобрений. При внесении полной дозы фосфорсодержащих удобрений азот, содержащийся в них, также учитывается при разработке системы удобрения.

Для озимых зерновых культур урожая текущего года в выходном документе дозы фосфорных и калийных удобрений не приводятся, а по азотным указывается доза, предназначенная для внесения в осенне-летний период.

Для перевода рассчитанных доз азотных, фосфорных и калийных удобрений в действующем веществе на физический вес необходимо использовать содержание питательных веществ в удобрениях, приведенное в прил. 21, или рассчитать по формулам:

$$H = \frac{D}{C} \cdot 100; \quad D = \frac{HC}{100},$$

где Н – доза удобрения в физической массе, кг/га;

Д – доза удобрения в действующем веществе, кг/га;

С – содержание питательных веществ в удобрении, %.

5.1.3. Варианты разработки системы удобрения сельскохозяйственных культур

Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур осуществляется по двум основным вариантам:

- с использованием материалов по агрохимической характеристике почв из автоматизированной базы данных (входной документ, прил. 3);
- с использованием материалов по агрохимической характеристике почв без базы данных (входной документ, прил. 4).

По обоим вариантам использования данных агрохимических свойств почв проводятся следующие расчеты:

- расчет оптимальных доз минеральных удобрений в действующем веществе (базовый вариант);
- базовый вариант дополняется корректировкой доз удобрений (в действующем веществе) по имеющимся в хозяйстве ресурсам удобрений;
- распределение ассортимента минеральных удобрений (в физической массе).

Третий вариант реализуется как завершающий этап системы удобрения при предоставлении информации о количестве имеющихся в хозяйстве форм удобрений (в тоннах физической массы). При этом содержание питательных веществ в различных туках оценивается по классификатору минеральных удобрений (прил. 69).

При отсутствии информации по ассортименту удобрений заказчик может ограничиться указанием во входном документе ресурсов удобрений в тоннах действующего вещества. В этом случае система удобрения при достаточном количестве удобрений реализуется в первом варианте, при неполном обеспечении – во втором.

Распределение ассортимента по сельскохозяйственным культурам осуществляется, исходя из агрохимических и физических свойств различных форм и видов удобрений, их влияния на урожай и качество продукции, технологичности внесения.

Если фактическое наличие минеральных удобрений в хозяйстве превышает рассчитанную потребность в элементах питания, то в выходном документе показывается остаток нераспределенных удобрений по видам и формам.

Если ресурсы хозяйства не обеспечивают внесение удобрений по полной потребности, определяемой базовым (оптимальным) вариантом, то проводится корректировка доз удобрений по описанному ниже алгоритму. При этом откорректированные дозы (в кг/га действующего вещества) показываются отдельной строкой выходного документа.

Алгоритм корректировки доз азотных удобрений при недостатке ресурсов: вначале определяется коэффициент обеспеченности, равный отношению фактического наличия удобрений к потребности, затем (путем умножения потребности конкретного участка на коэффициент обеспеченности хозяйства) – откорректированная доза азота.

Корректировка доз фосфорных удобрений осуществляется следующим образом:

1. Определяется минимальная потребность в фосфорных удобрениях (P_{\min}), для чего суммируются площади всех удобряемых полей и умножаются на минимальную дозу – 15 кг/га фосфора.

$$P_{\min} = (S_1 + S_2 + \dots + S_n) \cdot 0,015).$$

2. Если фактическое наличие фосфорных удобрений больше минимальной потребности, то производятся следующие действия:

- рассчитывается относительный дефицит фосфорных удобрений ($D_{\text{отн}}$), тонн

$$D_{\text{отн}} = P_{\text{общ}} - P_{\min},$$

где $P_{\text{общ}}$ – общая потребность в фосфорных удобрениях, тонн д. в.;

- определяется % обеспеченности фосфором по отношению к относительному дефициту: $\%_{\text{обесп.}} = D_{\text{отн}} / P_{\text{общ.}}$;

- корректировка расчета доз фосфорных удобрений, превышающих 15 кг/га д. в. производится путем умножения их на % обеспеченности и площадь удобряемых участков.

3. Если фактическое наличие фосфорных удобрений меньше минимальной потребности, то все расчетные дозы уменьшаются до 15 кг/га д. в. и перемножаются на площади полей. Вначале расчеты производятся по всем зерновым культурам и далее по другим сельскохозяйственным культурам в порядке их представления в исходном документе. Расчеты прекращаются, когда количество распределяемых удобрений равняется количеству имеющихся у землепользователя фосфорных удобрений.

Корректировка доз калийных удобрений проводится в таком порядке:

1. Определяется общий дефицит калийных удобрений ($D_{\text{общ}}$), тонн

$$D_{\text{общ}} = P_{\text{общ}} - \Phi_n,$$

где $P_{\text{общ}}$ – общая потребность в калийных удобрениях, тонн д. в.;

Φ_n – фактическое наличие калийных удобрений, тонн д. в.

2. Рассчитывается процент обеспеченности возделываемых культур калийными удобрениями: $\%_{\text{обесп.}} = D_{\text{отн}} / P_{\text{общ.}}$

3. Рассчитывается откорректированная доза удобрения ($D_{\text{кор}}$), кг/га

$$D_{\text{кор}} = D_{\text{ф}} \cdot \%_{\text{обесп.}} \cdot S_{\text{уч}},$$

где $D_{\text{ф}}$ – фактическая доза калийных удобрений, кг/га д. в.;

$S_{\text{уч}}$ – площадь удобряемого участка, га.

5.1.4. Распределение минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры по ассортименту

В основу распределения фактического ассортимента минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры в соответствии с рассчитанными дозами положены результаты исследований Института почвоведения и агрохимии и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по оптимизации ассортимента минеральных удобрений для условий Республики Беларусь и изучению эффективного применения форм и видов в различных почвенных условиях под отдельные виды сельскохозяйственных культур.

Для реализации данной задачи используется два нормативно-справочных документа:

- классификатор минеральных удобрений (прил. 69);
- справочник приоритетов минеральных удобрений (прил. 70).

Алгоритм распределения минеральных удобрений предусматривает подбор наиболее эффективной формы каждого вида удобрения по основным видам культур в зависимости от сроков внесения удобрений. Выделяются двадцать две основные группы культур (прил. 70) и три срока внесения: основное + припосевное для всех видов удобрений, две подкормки азотом и некорневая подкормка микроэлементами.

Дробное внесение азотных удобрений предусматривается для озимых и яровых зерновых культур, многолетних злаковых трав, сахарной и кормовой свеклы, кукурузы, сенокосов и пастбищ.

Распределение ассортимента минеральных удобрений осуществляется дважды: по фактической потребности в элементах питания с учетом потребления их из органических удобрений и по потребности в элементах питания с учетом корректировки в зависимости от имеющихся ресурсов минеральных удобрений.

5.1.5. Расчет потребности в микроудобрениях

Потребность в микроудобрениях определяется исходя из биологических особенностей сельскохозяйственных культур, содержания мик-

роэлементов в почвах и рекомендуемых доз внесения, разработанных научными учреждениями Республики Беларусь.

Система удобрения сельскохозяйственных культур предусматривает применение борных, медных, марганцевых, цинковых и молибденовых микроудобрений, оказывающих наиболее существенное влияние на урожайность и качество продукции. Для улучшения качества продукции могут применяться также кобальтовые, йодные, селеновые микроудобрения.

Существуют три основных способа внесения микроудобрений: в почву с последующей заделкой, в виде некорневых подкормок, при предпосевной обработке семян. Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом применения микроудобрений является некорневая подкормка вегетирующих растений. При этом некорневые подкормки микроудобрениями рекомендуются на почвах 1-й и 2-й групп обеспеченности, однако во многих исследованиях положительный эффект от некорневого внесения микроудобрений отмечен и при 3-й группе обеспеченности почвы микроэлементами.

Дозы микроудобрений для почвенного внесения могут планироваться только в том случае, если по содержанию соответствующего элемента почва относится к 1-й группе обеспеченности. При содержании элементов в почве, соответствующей 4-й группе обеспеченности, внесение микроудобрений не предусматривается (табл. 6).

Таблица 6. Градации почв Республики Беларусь по содержанию подвижных форм микроэлементов, мг/кг почвы

| Элемент (вытяжки) | Группы и степень обеспеченности микроэлементами | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 1-я (низкая) | | 2-я (средняя) | | 3-я (высокая) | | 4-я (избыточная) | |
| | Минеральная почва | Торфяно-болотная почва | Минеральная почва | Торфяно-болотная почва | Минеральная почва | Торфяно-болотная почва | Минеральная почва | Торфяно-болотная почва |
| Cu (1 M HCl) | < 1,5 | < 5,0 | 1,6–3,0 | 5,1–9,0 | 3,1–5,0 | 9,1–12,0 | > 5,0 | > 12,0 |
| Zn (1 M HCl) | < 3,0 | <10,0 | 3,1–5,0 | 10,1–15,0 | 5,1–10,0 | 15,1–30,0 | > 10,0 | > 30,0 |
| B (H ₂ O) | < 0,3 | <1,0 | 0,31–0,70 | 1,1–2,0 | 0,71–1,0 | 2,1–3,0 | >1,0 | > 3,0 |
| Mn* (0,1M KCl) | < 2,0 | – | 2,0–6,0 | – | 6,1–10,0 | – | > 10,0 | – |
| Co (1M HNO ₃) | <1,0 | <3,0 | 1,1–2,5 | 3,1–7,5 | 2,51–3,0 | 7,51–9,0 | >3,0 | 9,1–12,0 |

* Марганец определяется только в минеральных почвах.

Для некорневых подкормок предназначены следующие основные микроудобрения (табл. 7): борная кислота, сульфат меди (серноокислая медь), сульфат цинка (серноокислый цинк), сульфат марганца (серноокислый марганец), молибдат аммония (молибденовоокислый аммоний), сульфат кобальта (кобальт серноокислый), Адоб бор, Адоб медь и др.

Таблица 7. Основные виды применяемых микроудобрений

| Вид удобрения | Формула | Содержание действующего вещества, % | Коэффициент пересчета в физическую массу |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Медь серноокислая (сульфат меди) | $\text{CuSO}_4 \times 5\text{H}_2\text{O}$ | 25,0 | 4,00 |
| Борная кислота | H_3BO_3 | 17,0 | 5,88 |
| Цинк серноокислый (сульфат цинка) | $\text{ZnSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ | 22,0 | 4,55 |
| Молибдат аммония | $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \times 4\text{H}_2\text{O}$ | 52,0 | 1,92 |
| Молибдат аммония-натрия | — | 36,0 | 2,78 |
| Марганец серноокислый (сульфат марганца) | $\text{MnSO}_4 \times 4\text{H}_2\text{O}$ | 24,6 | 4,07 |
| Кобальт серноокислый (сульфат кобальта) | $\text{CoSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ | 20,0 | 5,00 |
| Кобальт хлористый (хлорид кобальта) | CoCl_2 | 46,0 | 2,17 |
| Бормедное удобрение | — | 17 (B)–5 (Cu) | 5,88–20,0 |
| Бура | $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \times 10\text{H}_2\text{O}$ | ≈ 11,0 | — |

Наряду с простыми микроудобрениями в сельском хозяйстве широкое применение получили органо-минеральные и хелатные соединения микроэлементов.

Адоб бор – жидкий концентрат удобрения, содержащий 15 % бора (объемные) в органо-минеральной форме. В одном литре удобрения содержится 150 г бора.

Адоб медь – жидкий концентрат удобрения, содержащий 6,43 % меди в хелатной форме, 9 % азота и 3 % магния. В одном литре удобрения содержится 64 г меди, 90 г азота и 30 г магния.

Адоб марганец – жидкий концентрат удобрения, содержащий 15,3 % марганца в хелатной форме, 9,8 % азота и 3 % магния. В одном литре удобрения содержится 62 г цинка, 90 г азота и 30 г магния.

Адоб цинк – жидкий концентрат удобрения, содержащий 6,2 % цинка в хелатной форме, 9 % азота и 3 % магния. В одном литре удобрения содержится 62 г цинка, 90 г азота и 30 г магния.

Эколист моно бор – жидкий концентрат удобрения, содержащий 11 % бора (весовые) в органо-минеральной форме. В одном литре удобрения содержится 150 г бора.

Эколист моно медь – жидкий концентрат удобрения, содержащий 7,5 % меди в хелатной форме, 6 % азота и 4% серы. В одном литре удобрения содержится 88 г меди, 75 г азота и 65 г серы.

Эколист моно марганец – жидкий концентрат удобрения, содержащий 12 % марганца в хелатной форме, 6 % азота и 4,5% серы. В одном литре удобрения содержится 174 г марганца, 87 г азота и 50 г серы.

Эколист моно цинк – жидкий концентрат удобрения, содержащий 8 % цинка в хелатной форме, 6 % азота и 3,8 % серы. В одном литре удобрения содержится 108 г цинка, 81 г азота и 51 г серы.

В последние годы сельскохозяйственному производству зарубежными и отечественными производителями предлагается ряд новых комплексных удобрений, ориентированных для отдельных культур или их групп. Кроме известных форм комплексных удобрений, содержащих макро- и микроэлементы фирмы Кемира, к ним можно отнести комплексные удобрения Басфолиар (Польша, фирма Адоб), Эколист (Польша, фирма Экоплон), составы микроэлементов Витамар (Республика Беларусь) и удобрения Агрикола (Россия, компания Техноэкспорт), Нутривант плюс (Израиль), Кристалон (Нидерланды) и др.

В настоящее время разработаны комплексные препараты на основе микроэлементов и регуляторов роста. МикроСтим медь – жидкое комплексное удобрение содержит 65 г/л азота, 78 г/л меди и 0,5–5,0 мл/л гуминовые вещества. Применяется для некорневых подкормок зерновых культур в дозе 0,5–1,0 л/га.

МикроСтим бор содержит 5 г/л азота, 150 г/л бора и 0,6–8,0 мг/л гуминовые вещества. Применяется для некорневых подкормок сахарной свеклы и озимого рапса в дозе 1,3–2,0 л/га.

Потребность нуждающихся в микроудобрениях сельскохозяйственных культур рассчитывается на основании технологической схемы (табл. 8) и указывается в выходных документах.

Внесение микроудобрений целесообразно совмещать с подкормками жидкими азотными удобрениями (КАС и т. д.), а также обработкой посевов средствами защиты растений и регуляторами роста. При этом требуемую дозу микроудобрений (исходя из объема опрыскивателя) следует растворить в отдельной емкости и влить его в раствор жидкого азотного удобрения, тщательно перемешав рабочий раствор.

Таблица 8. Средние дозы и сроки некорневых подкормок сельскохозяйственных культур микроэлементами

| Культура | Микроэлемент | Некорневая подкормка | |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Доза, г/га д. в. | Срок применения |
| Озимые зерновые | Медь (Cu) | 50 | Конец кущения, флаговый лист |
| | Марганец (Mn) | 50 | |
| Яровые зерновые | Медь (Cu) | 50 | Первый или второй узел |
| | Марганец (Mn) | 50 | |
| Горох, вика, гречиха | Бор (B) | 50 | Бутонизация, ветвление |
| | Марганец (Mn) | 50 | |
| Люпин узколистный | Бор (B) | 50 | Бутонизация |
| | Молибден (Mo) | 50 | |
| | Марганец (Mn) | 50 | |
| Лен-долгунец | Бор (B) | 150 | Фаза «елочки» |
| | Цинк (Zn) | 250 | |
| Сахарная свекла, кормовая свекла | Бор (B) | 200 | 10–12 листьев 25–30 листьев |
| | Марганец (Mn) | 50 | |
| Картофель | Бор (B) | 50 | Смыкание ботвы Бутонизация |
| | Медь (Cu) | 50 | |
| | Марганец (Mn) | 50 | |
| Озимый и яровой рапс | Бор (B) | 300 | Бутонизация |
| | Медь (Cu) | 175 | |
| | Марганец (Mn) | 100 | |
| Кукуруза | Цинк (Zn) | 75 | 6–8 листьев |
| | Медь (Cu) | 75 | |
| Многолетние злаковые травы | Медь (Cu) | 25–100 | Начало вегетации или после 1-го укоса |
| | Кобальт (Co) | 15–50 | |
| Семенники многолетних бобовых трав | Молибден (Mo) | 40 | Бутонизация |
| | Бор (B) | 50 | |

Кроме азота, фосфора, калия и микроэлементов, сельскохозяйственные культуры нуждаются также в таких макроэлементах, как магний, сера и кальций.

При возделывании крестоцветных и зерновых культур целесообразно внесение серы. Доза серных удобрений в зависимости от содержания серы в почве и растении, выноса серы урожаем той или иной культуры, поступления серы с органическими и минеральными удобрениями, а также из атмосферы составляет в среднем от 10 до 40 кг/га.

Большинство сельскохозяйственных культур нуждается также в магнии и кальции, однако в условиях Республики Беларусь достаточное их количество вносится в почву при известковании доломитовой мукой.

При возделывании сахарной свеклы и кормовых культур целесообразно внесение 30–40 кг/га д.в. натрия (например, в виде 40%-ной калийной соли, содержащей ~ 20% Na₂O).

Можно проводить обработку семян микроэлементами.

Обработку семенного материала микроэлементами производят при посеве:

- на почвах 1-й группы обеспеченности микроэлементами, если их не вносили в почву;
- на всех площадях 2-й группы обеспеченности микроэлементами;
- на почвах 3-й группы обеспеченности микроэлементами, на которых планируется получение высоких урожаев возделываемых культур.

Для обработки семян используют сульфат меди (медный купорос), сульфат цинка (цинковый купорос), борную кислоту, молибдат аммония. Дозы микроудобрений при обработке семян приводятся в табл. 9.

Обработку семенного материала микроэлементами проводят одновременно при протравливании с применением пленкообразователей. В Беларуси используют 2%-ный водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ), гисинар и другие.

Таблица 9. Дозы расхода микроудобрений для обработки семян, г препарата на 1 ц семян

| Культуры | Сульфат меди | Борная кислота | Сульфат цинка | Молибдат аммония |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| Зерновые | – | 20–40 | 80–100 | – |
| Зернобобовые | – | 20–30 | – | 15–20 |
| Сахарная и кормовая свекла | – | 150–200 | 200–250 | – |
| Картофель* (на 1 т) | 50–60 | 30–50 | 40–60 | – |
| Многолетние злаковые травы ** | 150–200 | – | – | – |
| Семенники многолетних бобовых трав | – | 20–30 | – | 15–20 |
| Кукуруза | – | 20–40 | 80–100 | – |
| Лен** | 100–200 | 100–150 | 150–200 | – |

* Обрабатывается без NaКМЦ, расход воды увеличивается в 2 раза; ** обрабатывается сухим способом.

5.1.6. Выходная документация

Результаты расчетов по системе удобрения сельскохозяйственных культур на компьютере распечатываются в двух основных документах (прил. 71, 72).

В форме «Система удобрения сельскохозяйственных культур» (прил. 71) по каждому удобряемому полю указываются дозы органических удобрений (т/га) и количество вносимых с ними элементов питания, а также расчетные дозы минеральных удобрений на планируемый урожай сельскохозяйственных культур для основного внесения и в подкормки (кг/га). Система удобрения предусматривает два срока азотных подкормок. Внесение микроэлементов рассчитывается для некорневых подкормок (дозы приводятся в г/га).

Расчетные дозы удобрений в выходном документе корректируются с учетом фактических ресурсов удобрений, имеющихся в хозяйствах, и распределяются дальше в соответствии с имеющимся ассортиментом удобрений. Итоговая строка суммирует фактические дозы удобрений в физическом весе по каждому полю.

В форме «Потребность в минеральных удобрениях...» (прил. 72) указывается общее количество минеральных макро- и микроудобрений, необходимых для получения планируемой урожайности по всем культурам на пашне, а также сенокосах и пастбищах. Во второй части документа приводятся данные о количестве фактически распределенных удобрений под сельскохозяйственные культуры.

6. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

6.1. Озимые зерновые культуры

Озимая пшеница

Озимая пшеница более требовательна, чем озимая рожь, к плодородию почв и отрицательно относится к повышенной кислотности. Наиболее пригодными для этой культуры являются автоморфные дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные, подстилаемые моренными суглинками, почвы с pH_{KCl} – 6,0–7,0, содержанием гумуса – 2 % и выше, подвижного фосфора и калия – более 150 мг/кг. Для формирования 1 т основной продукции и соответствующим количеством побочной продукции для озимой пшеницы требуется в среднем 30 кг азота, 11 кг P_2O_5 и 20 кг K_2O .

Озимая пшеница менее зимостойкая и засухоустойчивая, чем рожь.

Самыми ответственными периодами в питании озимой пшеницы являются 2 периода:

- от всходов до ухода посевов в зиму;
- весной в начале возобновления вегетации.

В первый период озимая пшеница предъявляет повышенные требования к фосфорно-калийному питанию, которое способствует мощному развитию корневой системы и кущению, накоплению сахаров, что важно для хорошей перезимовки. В этот период озимая пшеница должна быть умеренно обеспечена азотом, так как повышенное азотное питание понижает устойчивость растений к перезимовке. Успешной перезимовке способствует внесение органических удобрений.

При отрастании рано весной озимые нуждаются в усиленном азотном питании, так как в это время запасы минерального азота в почве еще невелики.

Это связано с тем, что процессы мобилизации азота почвы в осенне-зимний период протекают слабо, а имеющиеся нитраты теряются из корнеобитаемого слоя вследствие вымывания.

При посеве в рядки следует вносить фосфорные удобрения, так как слабая корневая система озимых зерновых в начале роста не может извлечь достаточного количества фосфора из почвы. Поэтому фосфор, внесенный в рядки, меньше смешивается с почвой и быстрее проникает в корневую систему и в дальнейшем включается в процессы питательных веществ семени, способствует усилению роста корневой системы и подземной массы растений, повышению содержания сахаров в растениях, что в дальнейшем определяет устойчивость растений к неблагоприятным условиям зимовки. Рядковое внесение фосфора в дозе 10–20 кг P_2O_5 способствует повышению урожайности зерна на 1,5–2,5 ц/га.

Система удобрения озимой пшеницы, как правило, трехчленная и включает: основное или допосевное удобрение, припосевное и подкормки. Система удобрения озимой пшеницы может быть минеральной и органоминеральной.

Органические удобрения вносятся в дозах 30–40 т/га навоза, торфонавозного компоста перед основной обработкой почвы – вспашкой. Можно использовать и жидкий бесподстилочный навоз в дозах 40–50 т/га.

Калийные и фосфорные удобрения вносятся вразброс перед вспашкой или предпосевной обработкой почвы.

Дозы минеральных удобрений зависят от величины планируемого урожая, содержания в почве гумуса, подвижных форм фосфора и калия, типа и гранулометрического состава почвы, количества вносимых органических удобрений и предшественника.

Определяют дозы удобрений на ЭВМ или используются рекомендации научных учреждений.

Озимая пшеница максимальное количество питательных веществ потребляет в фазе выхода в трубку, а заканчивается их поступление в растения, как правило, к фазе цветения. За этот период растения усваивают 78–92 % азота, 75–88 % фосфора и 85–88 % калия.

Средние расчетные дозы минеральных удобрений под озимую пшеницу на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене приведены в табл. 10.

Таблица 10. Дозы минеральных удобрений* под озимую пшеницу на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 |
| Азотные | — | 80–100 | 100–120 | 120–140 | 140–160** | 160–180** |
| Фосфорные | Менее 100 | 70–90 | × | × | × | × |
| | 101–150 | 60–70 | × | × | × | × |
| | 151–200 | 40–60 | 60–70 | × | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–75 | 75–90 |
| | 301–400 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | × | × | × | × |
| | 81–140 | 60–80 | × | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × | × |
| | 201–300 | 40–50 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–60 |

* На фоне внесения 30–50 т/га органических удобрений; ** на фоне ретардантов.

Для корректировки доз минеральных удобрений при возделывании озимой пшеницы на других почвах используют поправочные коэффициенты (табл. 11).

На низкокультуренных почвах с невысокими запасами подвижных форм фосфора и калия высокая урожайность озимых зерновых культур не планируется, дозы минеральных фосфорных и калийных удобрений в соответствующей таблице не приводятся.

Обязательным приемом должно быть припосевное внесение фосфора в дозе 10–20 кг/га д. в. Внесение фосфора в рядки усиливает пи-

тание в начальный период, способствует лучшему укоренению озимых зерновых. Для рядкового внесения используются аммонизированный суперфосфат, аммофос и другие формы удобрений.

Таблица 11. Поправочные коэффициенты к дозам минеральных удобрений в зависимости от типа и гранулометрического состава почв

| Тип и гранулометрический | Поправочные коэффициенты | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные на морене | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Дерново-подзолистые супесчаные и песчаные на песках | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Торфяные | 0,4 | 1,0 | 1,1 |

Подкормки фосфорными и калийными удобрениями нецелесообразны из-за низкой их эффективности.

Лучшей формой минеральных удобрений под озимые зерновые культуры с осени является сложносмешанное комплексное удобрение марки NPK 5:16:35, выпускаемое Гомельским химическим заводом. При отсутствии комплексных удобрений в качестве фосфорных удобрений используют аммофос, аммонизированный суперфосфат, калийных – хлористый калий.

Формирование высоких урожаев зерна в большой степени определяется системой применения азотных удобрений.

Для получения урожайности озимых зерновых 40–50 ц/га азотные удобрения вносят в три-четыре срока: до посева (при необходимости), в начале возобновления весенней вегетации (ВВВ), в стадию выхода в трубку (стадия первого узла, 31 стадия), а на пшенице – и в начале стадии колошения (51–52 стадии). При формировании высокопродуктивных посевов (урожайность зерна 60 ц/га и выше) необходима большая доза азота. Поэтому в стадию флагового листа (37 стадия) на посевах озимой пшеницы проводят еще одну подкормку.

До посева азотные удобрения рекомендуется вносить в следующих случаях:

- при размещении озимых зерновых после небобовых предшественников;
- на почвах с низким содержанием гумуса (на суглинистых – менее 2 %, супесчаных – менее 1,8 %);
- если органические удобрения не вносились ни под предшественник, ни под саму культуру.

В остальных случаях, до посева вносят 20–40 кг/га азота. Формы удобрений: КАС, мочевины, аммонийная селитра, сульфат аммония. Следует учитывать, что в настоящее время в качестве фосфорсодержащих удобрений в основном используются аммофос и аммонизированный суперфосфат. Наряду с фосфором вносится и небольшое количество азота.

Первую подкормку азотными удобрениями проводят весной в начале возобновления активной вегетации растений, когда среднесуточная температура воздуха превысит +5 °С и появятся молодые корешки. Цель первой ранневесенней подкормки азотом заключается в том, чтобы усилить мощность кущения растений. Провести ее надо в максимально сжатые сроки (не более чем за 10 дней), так как при поздних сроках подкормки на боковых побегах сформируется укороченный колос, который не даст полноценного зерна или не успеет созреть к началу уборки. Рекомендуемая доза азота для первой ранневесенней подкормки озимых зерновых – 60–70 кг/га, лучшей формой азотных удобрений является КАС (без разбавления), которая позволяет внести азот по поверхности поля с максимальной равномерностью. Карбамид следует применять по влажной почве.

Вторая подкормка проводится в стадию первого узла (над поверхностью почвы начинает прощупываться первый узел, 31 стадия). В эту стадию закладывается основной потенциал урожайности озимых зерновых культур (длина колоса, число зерен в колосе, масса зерна одного колоса). Рекомендуемая доза азота для второй подкормки 35–40 кг/га. Важным условием формирования высокой урожайности является как можно большая продолжительность работы листового аппарата растений. Чем больше продолжается фотосинтетическая деятельность листьев, тем выше будет окупаемость удобрений и конечный урожай. Поэтому после начала трубкования следует избегать ожогов листового аппарата, осторожно относиться к применению КАС и отдавать предпочтение твердым формам азотных удобрений – аммонийной селитре, мочеvine.

Третья подкормка в стадии последнего (флагового) листа планируется для получения урожаев более 60 ц/га. Оптимальная доза азота в этот период составляет 40–50 кг/га. Формы удобрений: аммонийная селитра, мочевины, КАС с разведением водой в соотношении 1:3 или 1:4 (использовать опрыскиватели с волочильными шлангами).

Четвертая подкормка проводится на озимой пшенице в начале колошения для улучшения качества зерна. Рекомендуемая доза азота,

10 кг/га. В эту подкормку лучше всего использовать 8%-ный раствор мочевины.

Получение высоких уровней урожайности озимых зерновых на фоне высоких доз азотных удобрений возможно при внесении ретардантов и должно сопровождаться активной химической защитой растений.

Из микроэлементов наибольшее значение для озимых зерновых культур имеют медь и марганец. Применение марганца оправдано, если значение обменной кислотности pH_{KCl} больше 6,0. Технологическая схема для получения высоких урожаев озимой пшеницы, разработанная в РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», приведена в табл. 12. Наряду с простыми микроудобрениями сульфатом меди и сульфатом марганца эффективно использование жидких микроудобрений, содержащих микроэлементы в форме хелатных соединений.

Таблица 12. Технологическая схема применения минеральных удобрений под озимую пшеницу (урожайность 70–100 ц/га)

| Дозы удобрений и регуляторов роста | Формы удобрений | Сроки применения |
|---------------------------------------|---|--|
| Органические удобрения. 40–50 т/га | Соломистый или торфяной навоз | Осенью под вспашку |
| $N_{14-20}P_{60-90}K_{120-140}$ | Аммофос, хлористый калий | До посева |
| N_{60-70} | КАС или карбамид | Весной в начале вегетации |
| N_{35-40} | Карбамид | В фазе начала выхода в трубку |
| 1,0–1,25 л/га 0,2 л/га 0,5 л/га | Регуляторы роста: хлормекватхлорид 750, или модус, или серон | В стадии первого узла. расход рабочего раствора 200 л/га |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца, или Адоб медь и Адоб марганец, или МикроСтим медь и МикроСтим марганец | Некорневые подкормки: в стадии первого узла с добавлением мочевины – 10–15 кг на 200 л рабочего раствора* |
| N_{40-50} | КАС (внесение опрыскивателем с волочильными шлангами) или мочевина | В фазе появления флагового листа |
| 0,2 л/га 0,5 л/га | Регуляторы роста: модус, или серон | Появление – полное развитие флагового листа |
| N_{10} | Водный раствор карбамида в концентрации 10 % | Колошение |

* Возможно применение в баковой смеси с ретардантом и фунгицидом.

Некорневые подкормки медью и марганцем проводятся в фазе ко-нец кушения – или стадии первого узла в дозе по 50 г д. в. на 1 га. При планировании высоких урожаев озимой пшеницы более 50 ц/га проводится вторая подкормка этими микроэлементами в той же дозе в фазе флагового листа.

Наряду с простыми микроудобрениями сульфатом медью и сульфатом марганца эффективно использовать микроэлементы в форме хелатных соединений (Адоб медь, Адоб марганец, Эколист моно медь, Эколист моно марганец, МикроСтим медь, МикроСтим марганец и другие формы).

Озимая рожь

Среди злаковых хлебов озимая рожь является менее требовательной культурой к климатическим условиям. Рожь – культура малотребовательная к почвам. Она может расти и на низинных торфяно-болотных почвах, суглинистых, супесчаных, песчаных и на тяжелых глинистых почвах. Оптимальная реакция почвенной среды для нее $p_{H_{KCl}} - 5,5-6,0$. Озимая рожь отличается более мощной развитой корневой системой и повышенной способностью усваивать элементы питания, чем озимая пшеница.

Вынос элементов питания озимой рожью на 1 т основной и соответствующего количества побочной продукции в среднем составляет 26 кг N, 11 кг P_2O_5 и 23 кг K_2O . К концу фазы кушения растения озимой ржи потребляют примерно третью часть азота, четвертую часть фосфора и калия от общего потребления. Усвоение растениями озимой ржи азота и калия заканчивается в фазе цветения, а потребление фосфора продолжается до восковой спелости. Максимум потребления элементов питания (до 70 %) падает на фазу кушения и выхода в трубку. В этот период происходит не только интенсивный рост вегетативной массы, но также формирование колоса со всеми органами. Поэтому озимая рожь осенью и ранней весной должна быть обеспечена всеми элементами питания.

Внесение фосфорных и калийных удобрений приводит к повышению морозостойкости растений. При резком недостатке фосфора в почве рост ржи резко ухудшается. Рожь потребляет фосфор равномерно на протяжении вегетации.

Озимая рожь является культурой средне реагирующей на внесение калийных удобрений. При обеспечении потребности ржи в калии раз-

виваются более сильные растения, имеющие прочные, менее склонные к полеганию стебли. Недостаток калия с осени приводит к ослаблению кушения растений. Растения при этом становятся значительно более доступными поражению грибными болезнями. Особенно большое значение имеет применение калия на песчаных и торфяных почвах.

Эта культура потребляет сравнительно большое количество азота с самого начала роста и развития. Однако наиболее высокая потребность в азоте отмечается рано весной, так как в это время минеральных соединений азота в почве мало в связи со слабой мобилизацией азота из-за низких температур. Таким образом, несколько повышенное фосфорно-калийное и умеренное азотное питание растений озимой ржи с осени является важным условием получения высоких урожаев.

Система удобрения озимой ржи трехчленная и включает основное, припосевное внесение и подкормки. Органические удобрения в дозе 30–40 т/га, фосфорные и калийные вносятся под озимую рожь до сева под основную обработку почвы. Дозы минеральных удобрений для озимой ржи приведены в табл. 13. При наличии комбинированных сеялок в рядки при посеве вносится 15–20 кг P_2O_5 в форме аммофоса, аммонизированного суперфосфата и других водорастворимых фосфорных удобрений.

Для озимой ржи достаточно провести две подкормки азотными удобрениями. Первая – в дозе 60–70 кг/га д. в. с возобновлением вегетации и вторая – в фазе начала выхода в трубку в дозе 25–30 кг/га д. в.

Таблица 13. Дозы минеральных удобрений* под озимую рожь на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене

| Удобрения, кг/га д.в. | Содержание P_2O_5 и K_2O мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|-----------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 |
| Азотные | – | 80–100 | 100–120 | 120–130 | 130–140** |
| Фосфорные | Менее 100 | 70–90 | × | × | × |
| | 101–150 | 60–70 | × | × | × |
| | 151–200 | 40–60 | 60–70 | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–75 |
| | 301–400 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | × | × | × |
| | 81–140 | 60–80 | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 201–300 | 40–50 | 50–70 | 70–90 | 90–110 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |

*На фоне внесения 30–40 т/га органических удобрений; ** на фоне ретардантов.

Для формирования урожайности зерна более 50 ц/га и выше требуется оптимизация всех факторов минерального питания, в том числе повышенные дозы азотных удобрений и применение микроэлементов. Особенно важны для озимой ржи такие микроэлементы, как медь и марганец.

Оптимальный срок применения некорневой подкормки микроэлементами – в стадию первого узла. Для озимой ржи достаточно провести одну подкормку медью и марганцем в дозе по 50 г д. в. меди и марганца. Марганцевые удобрения эффективны на почвах с pH_{KCl} выше 6,0.

Наряду с простыми микроудобрениями (сернокислая медь, сульфат марганца), эффективно использование жидких микроудобрений Адоб и Эколист, которые содержат медь и марганец в форме хелатных соединений и более технологичны в применении. Использование их обуславливается в первую очередь финансовыми возможностями хозяйств, поскольку все они, как правило, дороже простых микроудобрений.

Некорневые подкормки озимых зерновых культур микроэлементами являются энергосберегающим приемом, так как технологически могут совмещаться с применением фунгицидов, регуляторов роста и подкормкой азотом, при этом сульфаты меди и марганца растворяются в отдельной емкости. Приготовление растворов баковых смесей рекомендуется проводить непосредственно перед их применением.

Технологическая схема применения удобрений в течение вегетационного периода для озимой ржи, разработанная РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», приведена в табл. 14.

Таблица 14. Технологическая схема применения минеральных удобрений под озимую рожь (урожайность 60–70 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|---------------------------------|---|---|
| $N_{15-20}P_{40-50}K_{120-140}$ | Аммофос, хлористый калий | До посева |
| N_{60-70} | КАС или мочевины | Весной в начале вегетации |
| N_{30-40} | Мочевина | В фазе начала выхода в трубку |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца или Адоб медь и Адоб марганец или МикроСтим медь и МикроСтим марганец | Некорневые подкормки: в стадии первого узла в баковой смеси с ретардантом и фунгицидом и добавлением мочевины – 10–15 кг на 200 л рабочего раствора |

Применение твердых форм азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра) следует осуществлять только при наличии в хозяйствах штанговых машин РШУ-12, СУ-12, МТТ-4У, или центробежных машин «Альфа», «RAUCH» (Германия), или РДУ-1,5. Машины НРУ-0,5, РМГ-4, РУМ-5, РУМ-8 обеспечивают минимально возможную степень неравномерности 20 %, а в условиях производства – 40–50 %. По данным Института почвоведения и агрохимии недобор урожая зерна в этом случае от неравномерного внесения азота составляет от 2,5 до 4,0–5,0 ц/га. Достичь высокой равномерности позволяет применение жидкого азотного удобрения КАС опрыскивателями ОТМ-2-3, ОП-2000, S-320 и др. Исследования, проведенные с различными формами азотных удобрений (КАС, аммонийная селитра, карбамид, сульфат аммония), показали, что по влиянию на урожайность озимых зерновых культур все они практически равноценны. При поверхностном внесении мочевины без заделки в почву могут происходить газообразные потери азота до 20–25 % от внесенной дозы. Эти потери могут быть снижены до 12–15 %, если вносить карбамид по влажной почве. Рекомендуется также использовать для подкормок медленнодействующую форму мочевины с гуминовыми добавками.

Озимая тритикале

Озимая тритикале – зерновая культура, в которой удачно сочетается высокая экологическая пластичность озимой ржи с урожайностью и качеством пшеницы. Озимая тритикале способна давать более высокие урожаи по сравнению с пшеницей на бедных почвах и в связи с этим в Беларуси пригодных почв для ее выращивания больше, чем для озимой пшеницы. Наиболее высокую урожайность озимая тритикале формирует на связных почвах со слабокислой или нейтральной реакцией почвенной среды (pH_{KCl} 5,5–7,0). Отдельные сорта этой культуры отличаются повышенными требованиями к плодородию почвы. Их следует возделывать на хорошо окультуренных почвах.

Самыми ответственными периодами в питании озимой тритикале являются период от всходов до ухода посевов в зиму и весной в начале возобновления вегетации.

В первый период озимая тритикале предъявляет повышенные требования к фосфорно-калийному питанию, которое способствует мощному развитию корневой системы и кущению, накоплению сахаров, что важно для хорошей перезимовки. В этот период растения должны быть

умеренно обеспечены азотом, так как повышенное азотное питание понижает устойчивость растений к перезимовке. Успешной перезимовке способствует внесение органических удобрений.

При отрастании рано весной озимая тритикале нуждается в усиленном азотном питании, так как в это время запасы минерального азота в почве еще невелики.

Озимая тритикале максимальное количество питательных веществ потребляют в фазе выхода в трубку, а заканчивается их поступление в растения, как правило, к фазе цветения. За этот период растения усваивают 78–92 % азота, 75–88 % фосфора и 85–88 % калия.

Одной тонной основной продукции с учетом побочной озимая тритикале в среднем выносит 26 кг азота, 11 кг P_2O_5 и 22 кг K_2O .

Для озимой тритикале, как правило, система удобрения трехчленная, включающая основное, припосевное удобрение и подкормки. С точки зрения применяемых видов удобрений она может быть минеральной или органоминеральной. Последняя предполагает внесение подстилочного навоза в дозе 20–40 т/га, бесподстилочного – 40–50 т/га. Органические удобрения вносятся под вспашку.

Дозы минеральных удобрений рассчитываются комплексным методом с использованием ЭВМ или определяются по рекомендациям научных учреждений. Средние расчетные дозы минеральных удобрений под озимую тритикале на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене приведены в табл. 15.

Таблица 15. Дозы минеральных удобрений* под озимую тритикале на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 |
| Азотные | — | 80–100 | 100–120 | 120–140 | 140–160** | 160–180** |
| Фосфорные | Менее 100 | 70–90 | × | × | × | × |
| | 101–150 | 60–70 | × | × | × | × |
| | 151–200 | 40–60 | 60–70 | × | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–75 | 75–90 |
| | 301–400 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | × | × | × | × |
| | 81–140 | 60–80 | × | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × | × |
| | 201–300 | 40–50 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–60 |

* На фоне внесения 20–30 т/га органических удобрений; ** на фоне ретардантов.

Для корректировки доз минеральных удобрений при возделывании озимой тритикале на дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почвах при расчете доз азотных и калийных удобрений вводится поправочный коэффициент 1,1, фосфорных – 0,9. На торфяно-болотных почвах при расчете доз азотных удобрений поправочный коэффициент – 0,7, фосфорных – 1 и калийных – 1,1.

На низкокультуренных почвах с невысокими запасами подвижных форм фосфора и калия высокая урожайность озимой тритикале не планируется, дозы минеральных фосфорных и калийных удобрений в соответствующей таблице не приводятся.

Фосфорные и калийные удобрения под озимую тритикале вносят до сева под основную обработку почвы. Под озимую тритикале допускается основное внесение азота только на почвах слабокультуренных с содержанием гумуса менее 1,8 % в дозе 20–30 кг при размещении после злаковых и крестоцветных предшественников.

Лучшей формой минеральных удобрений под озимые зерновые культуры с осени является сложносмешанное комплексное удобрение марки NPK 5:16:35, выпускаемое Гомельским химическим заводом. При отсутствии комплексных удобрений в качестве фосфорных удобрений используют аммофос, аммонизированный суперфосфат, калийных – хлористый калий.

Формирование высоких урожаев зерна в большой степени определяется системой применения азотных удобрений.

Для получения урожайности озимой тритикале 40–50 ц/га азотные удобрения вносят в три срока: до посева (при необходимости), в начале возобновления весенней вегетации, в стадию выхода в трубку (стадия 1-го узла, 31 стадия). При формировании высокопродуктивных посевов (урожайность зерна 60 ц/га и выше) необходима большая доза азота. Поэтому в стадию флагового листа (37 стадия) на посевах озимой тритикале проводят еще одну подкормку.

Первую подкормку азотными удобрениями весной проводят в начале возобновления активной вегетации растений при достижении устойчивой среднесуточной температуры на уровне 5 °С и выше и появятся на растениях отрастающие белые корешки. Провести ее надо в максимально сжатые сроки (не более чем за 10–12 дней), так как при поздних сроках подкормки на боковых побегах сформируется укороченный колос, который не даст полноценного зерна или не успеет созреть к началу уборки. Следует иметь в виду, что при избыточном азотном питании растения усиленно кустанья весной, чрезмерно уве-

личивается вегетативная масса в ущерб формированию репродуктивных органов. Такие растения предрасположены к полеганию и поражению болезнями. Рекомендуемая доза азота для первой ранневесенней подкормки озимой тритикале – 60–70 кг/га, лучшей формой азотных удобрений является КАС (без разбавления), которая позволяет внести азот по поверхности поля с максимальной равномерностью.

Вторая подкормка проводится в стадии первого узла (над поверхностью почвы начинает прощупываться первый узел, 31 стадия). В эту стадию закладывается основной потенциал урожайности озимых зерновых культур (длина колоса, число зерен в колосе, масса зерна одного колоса). Рекомендуемая доза азота для второй подкормки 35–40 кг/га. После начала трубкования следует избегать ожогов листового аппарата, осторожно относиться к применению КАС и отдавать предпочтение твердым формам азотных удобрений – аммонийной селитре, карбамиду.

Третья подкормка в стадии последнего (флагового) листа планируется для получения урожаев более 60 ц/га. Оптимальная доза азота в этот период составляет 40–50 кг/га. Формы удобрений: аммонийная селитра, мочевины, КАС с разведением водой в соотношении 1:3 или 1:4 (использовать опрыскиватели с волоочильными шлангами).

Получение высоких уровней урожайности озимой тритикале на фоне высоких доз азотных удобрений возможно при внесении ретардантов и должно сопровождаться активной химической защитой растений.

Из микроэлементов наибольшее значение для озимой тритикале имеют медь и марганец. Применение марганца оправдано, если значение обменной кислотности (pH_{KCl}) больше 6,0. Для средних уровней урожайности необходимо планировать проведение одной некорневой подкормки в стадии первого узла. Для высокопродуктивных посевов (50 ц/га и выше) рекомендуется двукратная некорневая подкормка микроэлементами в начале активной вегетации весной или в стадии первого узла и в стадии флагового листа. Технологическая схема для получения высоких урожаев озимой тритикале представлена в табл. 16. Наряду с простыми микроудобрениями сульфатом меди и сульфатом марганца эффективно использование жидких микроудобрений, содержащих микроэлементы в форме хелатных соединений (Адоб Cu, Эколист моно медь, МикроСтим Cu, Адоб Mn, Эколист моно марганец и другие).

Таблица 16. Технологическая схема применения минеральных удобрений под озимую тритикале (урожайность 70–100 ц/га)

| Дозы удобрений и регуляторов роста | Формы удобрений | Сроки применения |
|--------------------------------------|---|---|
| Органические удобрения 40–50 т/га | Соломистый или торфяной навоз | Осенью под вспашку |
| $N_{14-20}P_{60-90}K_{12-140}$ | Аммофос, хлористый калий | До посева |
| N_{60-70} | КАС или карбамид | Весной в начале вегетации |
| N_{35-40} | Карбамид | В фазе начала выхода в трубку |
| 1,0–1,25 л/га 0,2л/га 0,5л/га | Регуляторы роста: хлормекватхлорид 750, или модус, или серон | В стадии первого узла. расход рабочего раствора 200 л/га |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца, или Адоб медь и Адоб марганец, или МикроСтим медь и МикроСтим марганец | Некорневые подкормки: в стадии первого узла с добавлением мочевины – 10–15 кг на 200 л рабочего раствора* |
| N_{40-50} | КАС (внесение опрыскивателем с волоочильными шлангами) или карбамид | В фазе появления флагового листа |
| 0,2 л/га 0,5 л/га | Регуляторы роста: моддус, или серон | Появление – полное развитие флагового листа |

* Возможно применение в баковой смеси с ретардантом и фунгицидом.

6.2. Яровые зерновые культуры

Яровая пшеница

Из яровых зерновых культур яровая пшеница наиболее требовательна к плодородию почвы. У яровой пшеницы наиболее короткий вегетационный период и более сжатый период поглощения элементов питания, чем у озимой пшеницы. Количество же элементов питания, выносимое с 1 т основной продукции с учетом побочной, примерно такое же, как и у озимой пшеницы.

Яровая пшеница хорошо удаётся на почвах с pH_{KCl} 6,0–7,3.

На формирование 1 т зерна яровая пшеница потребляет в среднем 30,4 кг азота, 11,6 кг P_2O_5 и 24,7 кг K_2O . У яровой пшеницы по сравнению с озимой менее развита корневая система, она слабо кустиста. Это вызывает необходимость обеспечения полноценного питания на всем протяжении вегетационного периода.

Наибольшую потребность в азоте яровая пшеница испытывает в период от начала кущения до выхода в трубку, за это время она поглощают около 40 % азота от потребляемого за весь вегетационный период. Недостаток азота в этот период приводит к нарушению формирования генеративных органов и снижению урожайности.

Критическим периодом фосфорного питания яровой пшеницы является начальный период роста. Обеспеченность фосфором яровых зерновых в этот период способствует хорошему развитию корневой системы, формированию крупного колоса, более раннему созреванию растений. Фосфорные удобрения дают меньшую прибавку урожая, чем азотные, но без них растения хуже развиваются.

Наибольшее количество калия яровые культуры потребляют в первые периоды роста. Более высокая эффективность калийных удобрений отмечается при низкой обеспеченности почв подвижным калием.

Поглощение питательных элементов у яровых зерновых заканчивается в основном к периоду колошения-цветения.

Яровая пшеница на дерново-подзолистых почвах хорошо использует последствие органических удобрений, внесенных под предшественник.

Дозы минеральных удобрений при возделывании яровых зерновых культур рассчитываются для каждого конкретного поля с учетом типа почвы и ее гранулометрического состава, планируемой урожайности, обеспеченности почвы подвижными соединениями фосфора и калия, предшественника, последствия органических удобрений.

Рекомендуемые дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений под яровую пшеницу в зависимости от типа почвы, уровня планируемой урожайности и содержания в почве подвижных соединений фосфора и калия приведены в табл. 17.

Система удобрения под яровую пшеницу минеральная, 2–3-членная: основное, припосевное и при необходимости подкормка.

Азотные удобрения при возделывании яровой пшеницы на минеральных почвах при планировании высоких урожаев вносят в три приема: N_{60-70} весной под предпосевную культивацию (основное внесение), N_{20-40} – в стадии первого узла (подкормка) и N_{15-20} – в стадии колошения (некорневая подкормка). При планировании урожаев яровой пшеницы 60 ц/га и более необходимо внесение 30 кг/га азота в стадии флагового листа и внесение ретардантов.

Для торфяных почв низинного типа вводятся для яровой пшеницы поправочные коэффициенты по сравнению с дерново-подзолистыми

суглинистыми и супесчаными на морене почвах по азоту 0,4, P_2O_5 – 1,0 и K_2O – 1,1.

Таблица 17. Рекомендуемые дозы минеральных удобрений под яровую пшеницу на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в.* | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 | 71–80 |
| Азотные | – | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–120 |
| Фосфорные | Менее 100 | 65–80 | × | × | × | × |
| | 101–150 | 55–70 | 70–80 | × | × | × |
| | 151–200 | 40–55 | 55–70 | 70–80 | 80–90 | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 |
| | 301–400 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | × | × | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | 120–140 | × |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 | 120–140 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–60 |

* На фоне последствия 60 т/га органических удобрений; × – при данной обеспеченности почв фосфором и калием получение планируемой урожайности экономически нецелесообразно.

Если расчетные дозы азотных удобрений не превышают 60–70 кг/га, то их эффективнее вносить в один прием под предпосевную культивацию.

Доза для подкормки может корректироваться на основании данных растительной диагностики.

Из азотных удобрений до сева применяются любые формы, лучшей является КАС, которая позволяет внести азот с максимальной равномерностью. В подкормку в стадии первого узла используют медленнодействующую мочевины (с гуматами), КАС с разбавлением водой 1:4. При отсутствии КАС первую азотную подкормку допускается проводить карбамидом с гуматами или аммонийной селитрой.

Для увеличения содержания белка и клейковины поздняя азотная некорневая подкормка в начале колошения яровой пшеницы проводится 10%-ным раствором карбамида. В раствор можно добавить сульфат аммония (5–10 кг/га в физическом весе). Сера, содержащаяся в этом удобрении, способствует увеличению содержания белка в зерне.

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью с заделкой под зяблевую вспашку, культивацию или весной под предпосевную культивацию.

Из имеющегося ассортимента минеральных удобрений лучшими формами являются аммофос, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий.

Для внесения под предпосевную культивацию рекомендуется сложномешанное комплексное удобрение марки 16:12:20, выпускаемое на Гомельском химическом заводе (содержит 16 % азота, 12 % фосфора и 20 % калия).

Для обеспечения яровой пшеницы фосфором в критический период при наличии комбинированных сеялок вносят 10–20 кг/га фосфора в рядки при посеве. Лучшими формами удобрения из производимых в Республике Беларусь являются аммонизированный суперфосфат, аммофос.

Эффективным приемом при возделывании яровых зерновых культур является некорневая подкормка медью, а на почвах с pH более 6,0 – марганцем. Оптимальные сроки проведения некорневой подкормки – стадия первого и второго узла, доза – 50 г/га меди и марганца. Технологические схемы применения минеральных макро- и микроудобрений в основные периоды роста яровой пшеницы приводятся в табл. 18, 19.

Таблица 18. Технологическая схема применения минеральных удобрений под яровую пшеницу (урожайность 50–60 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|------------------------------|--|---|
| $N_{60}P_{60-90}K_{120-150}$ | Карбамид или КАС, аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе первого узла |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе последнего листа |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца или ЭлеГум медь и ЭлеГум марганец, или Адоб медь и Адоб марганец | Некорневая подкормка в фазе первого узла с добавлением карбамида (10 кг/га), или КАС (10 л/га), расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Регулятор роста | Терпал Ц – 1,2–1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе появления флагового листа, расход рабочего раствора – 200 л/га |

Таблица 19. Технологическая схема применения удобрений под яровую пшеницу (урожайность 61–80 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|----------------------------------|---|---|
| $N_{60-90}P_{90-120}K_{150-180}$ | Карбамид или КАС, аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе первого узла |
| Фунгицид | Альто Супер, 0,6 л/га, или другие | В стадии флагового листа |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе последнего листа |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца, или Адоб медь и Адоб марганец | Некорневая подкормка в фазе первого узла с добавлением карбамида (10 кг/га), или КАС (10 л/га), расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Регулятор роста | Терпал Ц – 1,0–1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе появления флагового листа, расход рабочего раствора – 200 л/га |

Из медных удобрений применяются серноокислая медь и удобрения, содержащие медь в хелатной форме (Адоб Cu, Эколист моно медь, МикроСтим медь и другие). Из марганцевых удобрений используются серноокислый марганец, Адоб марганец.

Ячмень

Ячмень отличается повышенными требованиями к уровню питания, что объясняется очень коротким вегетационным периодом (70–110 дней) и чрезвычайно быстрым ходом потребления питательных элементов. Период поглощения питательных веществ у ячменя в основном заканчивается к середине вегетации, примерно за 40 дней до созревания. Ко времени выхода в трубку он потребляет около 70 % калия, 40 % фосфора и более 60 % азота, используемых за весь вегетационный период. По выносу элементов питания ячмень мало отличается от озимых зерновых культур. Для формирования 1 т зерна вместе с соломой ячмень потребляет в среднем 29,1 кг азота, 11,9 кг P_2O_5 и 27,4 кг K_2O .

Ячмень лучше удается на окультуренных плодородных почвах с реакцией, близкой к нейтральной (pH_{KCl} 6,0–7,0). Он хорошо использует последствие органических удобрений, внесенных под предшественник. В связи с этим в севооборотах его хорошо размещать после пропашных культур.

При выращивании высокобелкового кормового ячменя необходимо повышенное азотное питание в сочетании с оптимальным фосфорным и калийным удобрением. Расчетные дозы минеральных удобрений под ячмень фуражный приведены в табл. 20 (прил. 64, 65).

Таблица 20. Дозы минеральных удобрений* под ячмень на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|----------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 |
| Азотные | — | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100** |
| Фосфорные | Менее 100 | 65–80 | × | × | × |
| | 101–150 | 55–70 | × | × | × |
| | 151–200 | 40–55 | 55–70 | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | 20–30 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
| Калийные | Менее 80 | 80–110 | × | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |

* На фоне последствия 30–400 т/га органических удобрений; ** на фоне ретардантов (Терпал Ц – 1,0–1,5 л/га на пшенице в фазе появления флагового листа и моддус на посевах ячменя в дозе 0,3 л/га в фазе начала выхода в трубку (образовании второго междоузлия) и 0,3 л/га в период появления последнего листа).

На торфяно-болотных почвах для ячменя к дозам удобрений, приведенных для дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почв, вводятся поправочные коэффициенты по азоту 0,4, P₂O₅ – 1,0 и K₂O – 1,1 или можно воспользоваться прил. 65.

Основную дозу азотных (60 кг/га д. в.), а также фосфорные и калийные удобрения под ячмень обычно вносятся весной под культивацию или прямой посев после разбрасывания удобрений комбинированными почвенно-посевными агрегатами. На связных почвах фосфорные и калийные удобрения могут вноситься под ячмень с осени. Из имеющегося ассортимента минеральных удобрений в республике лучшими формами являются КАС (для основного внесения), карбамид, аммофос, диаммофос, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий. В фазе начала выхода в трубку проводится подкормка твердыми азотными удобрениями (карбамид, аммиачная селитра) в дозе 30 кг/га д. в. Необходимо отметить, что подкормки азотными удобрениями

ниями могут быть эффективными только при достаточном увлажнении почвы.

Технологическая схема применения минеральных удобрений под ячмень продовольственный приведена в табл. 21, 22.

Таблица 21. Технологическая схема применения минеральных удобрений под ячмень продовольственный (урожайность 50–60 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|------------------------------|--|---|
| $N_{60}P_{60-90}K_{120-150}$ | Карбамид или КАС, аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе первого узла |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе последнего листа |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца или ЭлеГум медь и ЭлеГум марганец, или Адоб медь и Адоб марганец | Некорневая подкормка в фазе первого узла с добавлением карбамида (10 кг/га), или КАС (10 л/га), расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Регулятор роста | Терпал Ц – 1,2–1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе появления флагового листа, расход рабочего раствора – 200 л/га |

Таблица 22. Технологическая схема применения удобрений под ячмень продовольственный (урожайность 61–80 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|----------------------------------|--|---|
| $N_{60-90}P_{90-120}K_{150-180}$ | Карбамид или КАС, аммофос, или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе первого узла |
| Фунгицид | Альто Супер, 0,6 л/га, или другие | В стадии флагового листа |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе последнего листа |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца, или Адоб медь и Адоб марганец | Некорневая подкормка в фазе первого узла с добавлением карбамида (10 кг/га), или КАС (10 л/га), расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Регулятор роста | Терпал Ц – 1,2–1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе появления флагового листа, расход рабочего раствора – 200 л/га |

При возделывании ячменя рекомендуются подкормки медными и марганцевыми удобрениями в дозах по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку. Марганцевые удобрения эффективны на дерново-под-

золистых почвах с pH_{KCl} выше 6,0. Для подкормок микроудобрениями могут быть использованы сернокислая медь и сернокислый марганец или микроудобрения, содержащие эти микроэлементы в хелатных формах: Адоб медь, Адоб марганец, Эколист моно медь, Эколист марганец, МикроСтим медь, МикроСтим марганец и др. При проведении некорневой подкормки на 200 л рабочего раствора надо добавлять 10 кг/га карбамида.

Пивоваренный ячмень

В пивоваренном ячмене высокое содержание белка в зерне – отрицательный момент, так как чем больше белка, тем меньше крахмала, который является основным экстрактивным веществом. Поэтому система удобрения пивоваренного ячменя должна быть направлена на повышение содержания в зерне не белка, а крахмала и общего выхода экстрактивных веществ. Хороший пивоваренный ячмень содержит 58–65 % крахмала и выше, а экстрактивность колеблется в пределах 75–82 % массы сухого вещества. Разница между этими величинами (14–15 %) падает на долю водорастворимых органических соединений, способных при экстрагировании переходить в раствор. Чем выше экстрактивность зерна ячменя, тем больше выход пива. Высокие дозы азота повышают белковость зерна и снижают пивоваренные качества ячменя. В связи с этим рекомендуется разовое внесение под пивоваренный ячмень азотных удобрений (N_{60}), учитывая ограничения по белку (9–12 % при оптимальном содержании 10,5 %).

Оптимальные дозы минеральных удобрений под ячмень пивоваренный приводятся в табл. 23.

Дозы азотных удобрений до 60 кг/га и расчетные дозы фосфорных и калийных удобрений применяются в один прием до посева с заделкой под культивацию. На связных почвах фосфорные и калийные удобрения можно внести с осени. При наличии специально оборудованных сеялок 15–20 кг/га д. в. фосфора целесообразно вносить в рядки при посеве. Лучшая форма удобрений для основного внесения – комплексное удобрение марки 9–18–24 с медью и марганцем или марки 10–18–22 с медью и марганцем.

На хорошо окультуренных почвах на посевах с потенциальной урожайностью 60–80 ц/га проводится одна подкормка азотными удобрениями в дозе до 20 кг/га д. в. фазе начала выхода в трубку.

Таблица 23. Дозы минеральных удобрений* под пивоваренный ячмень дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемый урожай (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------|---------|---------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60** | 61–80** |
| Азотные | – | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 70–80 |
| Фосфорные | Менее 100 | 65–80 | × | × | × |
| | 101–150 | 55–70 | × | × | × |
| | 151–200 | 40–55 | 55–70 | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | 20–30 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
| Калийные | Менее 80 | 80–110 | × | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |

* На фоне последействия 50–60 т/га органических удобрений; ** на фоне ретардантов – моддус в дозе 0,3 л/га в фазе начала выхода в трубку (образование второго междоузлия) и 0,3 л/га в период появления последнего листа).

Медные и марганцевые микроудобрения вносят в дозах по 50 г/га д. в. в фазе начала выхода в трубку так же, как и продовольственного ячменя.

Яровая тритикале

Для возделывания яровой тритикале более пригодными являются дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые почвы. Можно эту культуру возделывать и на супесях, подстилаемых моренным суглинком. Оптимальные агрохимические показатели почвы для этой культуры: рН_{KCl} 5,5–7,0, содержание гумуса не менее 1,6 %, подвижного фосфора и калия не менее 150 мг/кг.

Яровая тритикале на 1 т основной продукции с учетом побочной в среднем выносит 25,3 кг N, 12 кг P₂O₅ и 21,9 кг K₂O. Она по сравнению с другими яровыми зерновыми культурами имеет более длительный вегетационный период и хорошо отзывается на подкормки азотными удобрениями.

От начала выхода в трубку до колошения яровая тритикале потребляет примерно 2/3–3/4 всего количества азота и зольных элементов. В период развития яровой тритикале от появления всходов до конца кущения потребляется меньше элементов минеральной пищи, чем в

последующие фазы развития растений. Однако в этот период яровая тритикале весьма чувствительна к недостатку питательных элементов и особенно фосфора.

Дозы минеральных удобрений зависят от типа почвы, гранулометрического состава, обеспеченности почвы подвижными формами фосфора, калия, предшественников (табл. 24 и прил. 64, 65). Фосфорные и калийные удобрения на связных почвах можно вносить с осени, чаще P_2O_5 – 50–90 кг д. в., K_2O – 60–120 кг д. в. с учетом плодородия почвы. Можно их применять и весной. Наибольшее значение в формировании урожайности яровой тритикале имеют азотные удобрения, которые следует вносить в предпосевную культивацию или прямой посев после разбрасывания удобрений почвенно-посевными агрегатами в дозе N_{80-90} . Дробное внесение азота в подкормку в фазе начала выхода в трубку проводится твердыми азотными удобрениями (карбамид, аммонийная селитра, КАС при разбавлении водой 1:4) в дозе 30 кг д. в. При планировании высоких урожаев применяются ретарданты (Терпал Ц и другие). Из имеющегося ассортимента рекомендуется под предпосевную культивацию применять комплексные удобрения марки 16:12:20.

Таблица 24. Дозы минеральных удобрений* под яровое тритикале на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|----------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 |
| Азотные | – | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100** |
| Фосфорные | Менее 100 | 65–80 | × | × | × |
| | 101–150 | 55–70 | × | × | × |
| | 151–200 | 40–55 | 55–70 | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | 20–30 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
| Калийные | Менее 80 | 80–110 | × | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |

* На фоне последствия 30–40 т/га органических удобрений; ** поправочный коэффициент к дозам, приведенным в табл. 15 для дерново-подзолистых супесчаных и песчаных на песках – для азота – 1,1, P_2O_5 – 0,9, K_2O – 1,1, а торфяных 0,4, 1,1 и 1,1 соответственно.

В припосевное внесение при наличии комбинированных сеялок вносят 15–20 кг P_2O_5 фосфорных удобрений в рядки. Лучшими формами являются аммофос и суперфосфаты.

Микроэлементы играют важную роль в получении высокой урожайности зерна яровой тритикале хорошего качества. Наиболее чувствительна эта культура к недостатку меди, а также марганца на почвах с pH_{KCl} больше 6,0. Некорневую подкормку медью и марганцем проводят в фазе начала выхода в трубку в дозе 50 г/га д. в. При запланированной урожайности зерна свыше 50 ц/га целесообразно дополнительно внести микроэлементы в фазе флаг-листа.

Применяются микроэлементы прежде всего на почвах с низкой и средней обеспеченностью, на почвах с высоким содержанием микроэлементов, как правило, их не вносят. Наряду с простыми солями (сернокислая медь, сернокислый марганец), эффективным приемом является некорневая подкормка жидкими микроудобрениями, содержащими микроэлементы в хелатной форме (препараты Эколист, Адоб, МикроСтим и другие). Микроудобрения растворяют в гектарной норме воды (200–300 л/га).

Технологическая схема применения удобрений при возделывании яровой тритикале приведена в табл. 25, 26.

Таблица 25. Технологическая схема применения минеральных удобрений под яровое тритикале (урожайность 50–60 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|------------------------------|--|---|
| $N_{60}P_{60-90}K_{120-150}$ | Карбамид или КАС, аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе первого узла |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе последнего листа |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца или ЭлеГум медь и ЭлеГум марганец, или Адоб медь и Адоб марганец | Некорневая подкормка в фазе первого узла с добавлением карбамида (10 кг/га), или КАС (10 л/га), расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Регулятор роста | Терпал Ц – 1,2–1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе появления флагового листа, расход рабочего раствора – 200 л/га |

Таблица 26. Технологическая схема применения удобрений под яровое тритикале (урожайность 61–80 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|----------------------------------|---|---|
| $N_{60-90}P_{90-120}K_{150-180}$ | Карбамид или КАС, аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе первого узла |
| Фунгицид | Альт Супер, 0,6 л/га, или другие | В стадии флагового листа |
| N_{30} | Карбамид | Подкормка в фазе последнего листа |
| $Cu_{50}Mn_{50}$ | Сульфат меди и сульфат марганца, или Адоб медь и Адоб марганец | Некорневая подкормка в фазе первого узла с добавлением карбамида (10 кг/га), или КАС (10 л/га), расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Регулятор роста | Терпал Ц – 1,2–1,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе появления флагового листа, расход рабочего раствора – 200 л/га |

Овес

По сравнению с другими яровыми зерновыми культурами овес имеет более растянутый период поглощения элементов питания. Он мирится с кислыми почвами, но лучшие урожаи дает на слабокислых и нейтральных почвах. Оптимальная реакция почвенной среды pH_{KCl} 5,0–6,5. Овес обладает высоким потенциалом биологической продуктивности, лучше, чем ячмень и яровая пшеница усваивает питательные вещества из почвы, хорошо использует последствие ранее вносимых удобрений.

С одинаковым урожаем овес выносит несколько больше фосфора и калия и меньше азота, чем ячмень. На образование 1 т урожая зерна и соответствующего количества побочной продукции он потребляет в среднем 25,9 кг азота, 12,4 кг P_2O_5 и 28,6 кг K_2O .

При возделывании овса на дерново-подзолистых почвах, особенно легких, обнаруживается сильное действие азотных удобрений. Достаточное обеспечение овса фосфором способствует хорошему росту корневой системы, формированию качественного зерна, более раннему созреванию растений. Наибольшее количество калия растения поглощают в первые периоды роста. Калий регулирует водный обмен, повышает засухоустойчивость, сопротивляемость к болезням и вредителям, устойчивость к полеганию, ускоряет созревание зерна.

Овес является менее требовательной культурой к плодородию почвы и предшественнику, поэтому в севообороте его обычно размещают в последнем поле.

Система удобрения овса трехчленная и включает внесение удобрений до посева, при посеве и в подкормку.

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью под зяблевую вспашку, культивацию или весной – под предпосевную культивацию.

Из имеющегося ассортимента минеральных удобрений лучшими формами являются аммофос, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий.

Дозы удобрений дифференцируются в зависимости от уровня планируемой урожайности, предшественника, типа гранулометрического состава, обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия (табл. 27, прил. 64).

Таблица 27. Дозы минеральных удобрений под овес на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемый урожай (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------|--------|----------|
| | | 31–40 | 41–50 | 51–60 | Более 60 |
| Азотные | – | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100** |
| Фосфорные | Менее 100 | 65–80 | × | × | × |
| | 101–150 | 55–70 | × | × | × |
| | 151–200 | 40–55 | 55–70 | × | × |
| | 201–300 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | 20–30 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
| Калийные | Менее 80 | 80–110 | × | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | × | × | × |
| | 141–200 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |

** Дозы минеральных удобрений для дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почв на песках по сравнению с приведенными в табл. умножаются по азоту на коэффициент – 1,1, P_2O_5 – 0,9, K_2O – 1,1, а торфяных на 0,4, 1,0, 1,1 соответственно.

Поскольку овес является ценной фуражной и продовольственной культурой, важное значение имеет качество зерна, особенно количество и состав белков. Белки овса имеют высокую биологическую ценность (60–70 %). Для повышения содержания белка азотные удобрения под эту культуру рекомендуется применять дробно.

Из азотных удобрений до посева применяются любые формы, лучшей является КАС, которая позволяет внести азот равномерно. Если расчетные дозы азота не превышают 60 кг/га д. в., то их эффективнее вносить в один прием под предпосевную культивацию. При наличии комбинированных сеялок в рядки при посеве вносится 15–20 кг P_2O_5 в форме аммофоса, аммонизированного суперфосфата или другого водорастворимого фосфорного удобрения. Дозы азотных удобрений более 60 кг/га вносятся дробно: до посева и часть азота в подкормку в фазу конец кущения – начало выхода в трубку. В подкормку используют карбамид, КАС с разбавлением водой 1:4. Можно использовать также карбамид с гуматами и аммонийную селитру. Подкормки азотными удобрениями могут быть эффективными лишь при достаточном увлажнении почвы.

Овес хорошо отзывается на применение медных микроудобрений, а на почвах с pH_{KCl} более 6,0 и марганцевых. Эти микроудобрения в некорневую подкормку вносятся в дозах 50 г/га д. в. меди и марганца в фазе начала выхода в трубку. Для подкормки могут быть использованы сернокислая медь и сернокислый марганец или микроудобрение, содержащее эти микроэлементы в хелатной форме: Адоб медь, Адоб марганец, Эколист моно медь, Эколист моно марганец, МикроСтим медь, МикроСтим марганец и другие. При проведении некорневой подкормки микроудобрениями на 200 л рабочего раствора рекомендуется добавлять 10 кг/га карбамида.

6.3. Зернобобовые культуры

Возделывание различных видов зернобобовых культур (горох, люпин, вика яровая, соя) является важнейшим звеном в системе кормопроизводства Республики Беларусь и обусловлено главным образом запросами комбикормовой промышленности для балансирования концентрированных кормов по переваримому белку.

Для устранения дефицита белка РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» предложил ввести оптимизированную структуру посевных площадей. В этой структуре предусмотрено увеличение в 2015 году посевных площадей под зернобобовыми культурами до 350 тыс. га, из них люпина узколистного – 130 тыс., гороха – 150 тыс., вики яровой – 70 тыс. и сои – 25 тыс. га. Это даст возможность ежегодно выделять на кормовые цели около 700 тыс. т. зерна

зернобобовых и обеспечить республику собственными семенами этих культур.

Основной биологической особенностью зернобобовых культур (горох, вика, пелюшка, люпин, кормовые бобы) является фиксация азота воздуха благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, что снижает их потребность в азотных удобрениях. Коэффициент азотфиксации у этих культур составляет в среднем 60 % от общего потребления азота на формирование урожая. Примерно 75 % азота, фиксированного бактериями из воздуха, используется растениями, а 25 % остается в клубеньках и после минерализации пожнивно-корневых остатков зернобобовых культур способствует улучшению азотного питания последующих культур. Благодаря симбиотической деятельности, с пожнивными остатками в почве накапливается от 50 до 150 кг/га азота в зависимости от культуры.

Кроме того, зернобобовые культуры, выделяя лимонную кислоту через корневую систему, переводят многие труднорастворимые соединения фосфора, кальция и калия в легкодоступные, обогащая ими пахотный слой. Хорошо развитая корневая система зернобобовых культур обеспечивает рыхление, оструктуривание и дренажирование пахотного слоя и подпахотного горизонта, улучшая их водно-физические свойства. Это снижает эрозию почв, повышает их биологическую активность, стабилизирует баланс гумуса. В большей степени это проявляется у люпина и гороха.

Наиболее благоприятные условия для симбиотической азотфиксации создаются на оптимальном уровне фосфорно-калийного питания и обеспеченности доступным молибденом – микроэлементом, принимающем участие в азотфиксации. Повышенное содержание в почве минерального азота значительно уменьшает азотфиксацию, и зернобобовые культуры становятся такими же потребителями азота, как и другие.

Для возделывания гороха, вики, пелюшки и кормовых бобов наиболее пригодными являются дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые почвы, а также супеси, подстилаемые связными породами. Оптимальные агрохимические показатели почвы: pH – 6,0–6,5, содержание гумуса – не ниже 1,8 %, подвижных соединений фосфора и калия – не менее 150 мг/кг.

Пелюшка, вика, кормовые бобы предъявляют более высокие требования к плодородию почвы, чем люпин. Они лучше растут на связных

по гранулометрическому составу почвах, хорошо реагируют на известкование. Оптимальное значение pH_{KCl} для них 6–7.

Зернобобовые культуры требовательны к определению места в севообороте. В связи с накоплением в почве инфекции корневых гнилей не допускается возвращение бобовых на прежнее поле севооборота ранее, чем через 5–6 лет. Лучший предшественник – озимые и яровые зерновые.

Зернобобовые культуры – особенно люпин – чувствительны к высокому содержанию хлора в почве. Эти культуры более или менее равномерно потребляют питательные вещества почвы и удобрений. Горох и вика заканчивают потребление питательных веществ в конце цветения, люпин – при созревании бобов на главном стебле.

Указанные биологические особенности зернобобовых культур определяют потребность их в минеральных удобрениях.

В среднем на формирование 1 т зерна зернобобовые потребляют 61,7 кг азота, 17,6 кг фосфора, 37,2 кг калия.

Система удобрения пелюшки, вики, кормовых бобов минеральная, двучленная, включающая основное внесение и некорневую подкормку микроудобрениями.

Непосредственное внесение органических удобрений (30 т/га) рекомендуется только под кормовые бобы.

Высокую потребность в азоте зернобобовые могут удовлетворять фиксацией клубеньковыми бактериями из воздуха и поглощением из почвы. Обычно они не нуждаются во внесении азотных удобрений.

Под вику, пелюшку азотные удобрения в дозе 30–60 кг/га д. в. вносят под предпосевную культивацию на почвах с содержанием гумуса менее 1,8 % и при неблагоприятных условиях для азотфиксации (дефицит влаги, низкая температура).

Внесение азотных удобрений под эти культуры нерационально. При внесении азотных удобрений они переходят на автотрофный тип питания, и вместо накопления азота становятся азотопотребителями. Как исключение, на почвах с низким плодородием (гумуса менее 1,5 %), в условиях прохладной затяжной весны, если в стадии 3–4 листьев нет биологически активных клубеньков, вносят 20–30 кг/га азота.

Применение азота экономически выгодно заменить инокуляцией семян зернобобовых бактериальным удобрением Сапронит. Предпосевная обработка 1 т семян проводится рабочей смесью: 1 л Сапронита + 10 л воды (непосредственно перед посевом). Инокуляция семян

проводится на машинах для протравливания в крытых помещениях. Хранить обработанные семена не рекомендуется.

Дозы внесения фосфорных и калийных удобрений зависят от планируемой урожайности и содержания доступных форм этих веществ в почве (табл. 28, прил. 64, 65). Под посевы зернобобовых культур используются все виды фосфорных и калийных удобрений.

Срок внесения фосфорных и калийных удобрений – осенью под зяблевую вспашку. На легких почвах, где это невозможно из-за опасности вымывания, калий необходимо вносить рано весной под первую культивацию в виде сульфата калия.

Таблица 28. Дозы минеральных удобрений под зернобобовые культуры на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 15–20 | 21–25 | 26–35 | 36–40 |
| Фосфорные | Менее 100 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 101–150 | 40–60 | 60–80 | 80–90 | × |
| | 151–200 | 30–45 | 45–60 | 60–75 | 70–90 |
| | 201–300 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| | 301–400 | – | 10–15 | 10–15 | 15–20 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | 100–120 | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | × |
| | 141–200 | 60–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | 40–50 |

Люпин

При разработке системы удобрения под люпин необходимо учитывать не только повышение урожайности, но и качество продукции. Фосфорные и калийные удобрения повышают содержание белка в семенах люпина на 1,0–1,5 % и более. Положительное влияние на увеличение содержания белка в зерне люпина оказывают и молибденовые удобрения.

Основной биологической особенностью люпина является фиксация азота воздуха благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями, что снижает потребность в азотных удобрениях. Коэффициент азотфиксации у него составляет в среднем 60 % от общего потребления азота на формирование урожая. Примерно 75 % азота фиксированного бактериями из воздуха используется растениями, а 25 % остается в клубеньках и после минерализации пожнивно-корневых остатков способствует

улучшению азотного питания последующих культур. Он фиксирует из воздуха до 160–180 кг/га азота. Другим культурам он после себя оставляет 50–100 кг/га азота.

Важная особенность люпина – способность поглощать из почвы и удобрений труднорастворимые формы фосфора.

Наиболее благоприятные условия для симбиотической азотфиксации создаются на оптимальном уровне фосфорно-калийного питания и обеспеченности доступным молибденом – микроэлементом, принимающем участие в азотфиксации.

Повышенное содержание в почве минерального азота значительно уменьшает азотфиксацию, эта культура становится таким же потребителями азота, как и другие.

Люпин узколистный предпочитает песчаные, супесчаные и легкосуглинистые почвы. Оптимальная реакция среды для узколистного люпина pH_{KCl} – 5,0–5,6, а люпина желтого – pH_{KCl} – 4,5–5,0. Люпин узколистный переносит pH_{KCl} от 4,5 до 7,5.

Люпин является типичным хлорофобом. Эта культура более или менее равномерно потребляет питательные вещества почвы и удобрений. Люпин заканчивает потребление элементов питания при созревании бобов на главном стебле.

Указанные биологические особенности определяют потребность люпина в минеральных удобрениях.

В среднем на 1 т семян и соответствующего количества побочной продукции люпин выносит 84,3 кг азота, 19,9 кг P_2O_5 и 44 кг K_2O .

Система удобрения люпина минеральная, двучленная, включающая основное внесение и некорневую подкормку микроудобрениями.

Высокую потребность в азоте люпин удовлетворяет фиксацией клубеньковыми бактериями из воздуха и поглощением из почвы. Обычно он не нуждается во внесении азотных удобрений.

Внесение под люпин азотных удобрений нерационально. Как исключение, на почвах с низким плодородием (гумуса менее 1,5 %), в условиях прохладной затяжной весны, если в стадии 3–4 листьев нет биологически активных клубеньков (в разрезе они должны быть розового цвета), вносят 20–30 кг/га азота.

Дозы внесения фосфорных и калийных удобрений зависят от планируемой урожайности и содержания доступных форм этих веществ в почве (табл. 29, прил. 64).

Люпин – типичный хлорофоб и калийные удобрения, содержащие хлор, рекомендуется на связных почвах вносить с осени. Лучший срок

внесения фосфорных и калийных удобрений – осенью под зяблевую вспашку. На легких почвах, где это невозможно из-за опасности вымывания калия, хлористый калий необходимо вносить рано весной под первую культивацию.

Таблица 29. Дозы минеральных удобрений под люпин на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 15–20 | 21–25 | 26–35 | 36–40 |
| Фосфорные | Менее 100 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 101–150 | 40–60 | 60–80 | 80–90 | × |
| | 151–200 | 30–45 | 45–60 | 60–75 | 70–90 |
| | 201–300 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| | 301–400 | – | 10–15 | 10–15 | 15–20 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | 100–120 | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | × |
| | 141–200 | 60–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | 40–50 |

Характерной особенностью люпина, особенно желтого, является устойчивость к повышенной кислотности почвенного раствора и негативное отношение к избытку кальция.

При этом из-за антагонизма между калием и кальцием значительно ухудшается калийный режим питания. Поэтому на производственных участках дозы внесения калия необходимо увеличить на 20–30 % по сравнению с расчетными на планируемый урожай. Чтобы избежать отрицательного действия известкования почвы на урожайность люпина, его в севообороте необходимо проводить за 3–4 года до того, как на данном поле будет возделываться эта культура.

Лучшая форма известковых удобрений – доломитовая мука. На дерново-подзолистых почвах положительное влияние на урожайность семян люпина оказывают микроэлементы бор и молибден, активизирующие процесс симбиотической фиксации азота. В фазу бутонизации рекомендуется некорневая подкормка бором и молибденом в дозе по 50 г/га д. в. Микроудобрения рекомендуется применять в составе баковой смеси с инсектицидами. Возможна обработка семян борной кислотой (300 г/т семян) и молибдатом аммония (250 г/т). Можно проводить некорневые подкормки также микроудобрениями Эколист моно бор и Адоб бор в дозе 0,3 л/га в баковой смеси с инсектицидами. Для улучшения азотфиксации проводится предпосевная обработка 1 т семян

люпина рабочей смесью: 1 л Сапронита + 10 л воды (непосредственно перед посевом).

Соя

При возделывании сои в комплексе агротехнических приемов ведущая роль принадлежит минеральным удобрениям.

Соя является высокобелковой культурой. Она содержит 33–35 % белков и 17–20 % жира. Характерная особенность белка сои – наличие в нем большого количества альбуминов, которые составляют 90 % суммарного белка. Поскольку эта фракция сбалансирована по аминокислотному составу, то в белке сои незаменимые аминокислоты составляют 33,5–35,0 суммарного белка, в том числе около 7 % лизина. Биологическая ценность белков сои высокая и составляет около 70 %.

Нормальное питание сои может протекать при реакции почвенной среды, близкой к нейтральной (pH_{KCl} 6,0–7,0), и она хорошо отзывается на известкование кислых почв.

В сравнении с другими культурами соя много выносит азота с урожаем. На 1 т урожая семян с учетом побочной продукции она потребляет 75 кг азота, 20 кг P_2O_5 и 25 кг K_2O . Потребность сои в элементах питания определяется ее биологическими особенностями. В начале вегетации эта культура развивается слабо, от всходов до цветения ей требуется небольшое количество элементов питания. По мере приближения к фазе цветения требования ее к питанию значительно возрастают. Наибольшая потребность в элементах питания – в период от цветения до массового налива бобов, в это время растения поглощают 65 % азота, фосфора и калия. Содержание азота в растениях сои практически не изменяется, а содержание фосфора постепенно увеличивается. Наибольшее количество калия в растениях содержится в период цветения.

Соя предъявляет высокие требования к плодородию почвы и хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений. Оптимальные дозы минеральных удобрений повышают урожайность на 5–7 ц/га и более, а белковость семян этой культуры возрастает на 2–3 %. Большинство данных свидетельствует о положительном действии на урожайность и качество семян сои лишь невысоких доз азота (40–60 кг/га). При этом эффективна и инокуляция семян препаратами клубеньковых бактерий. Лучшее соотношение питательных веществ с удобрениями по действующему веществу N:P:K – 1:1,5:2,0.

Как показали исследования на кафедре агрохимии БГСХА (Т. Ф. Персикова), более высокая урожайность семян сои при возделывании на среднеокультуренной дерново-подзолистой легкосуглинистой почве была получена при внесении $N_{60}P_{60}K_{90}$. В зависимости от степени окультуренности почвы, содержания подвижных форм фосфора и калия эффективными дозами удобрений для сои по данным опытов, проведенных в Беларуси, были $N_{30-60}P_{50-70}K_{60-120}$.

Эффективным приемом для сои является применение борных и молибденовых удобрений, а также инокуляция семян препаратами клубеньковых бактерий Соя-Риз в дозе 200 г на гектарную порцию семян. Некорневые подкормки микроэлементами применяются в фазе бутонизации бором и молибденом в дозе 50 г д. в. на 1 га.

Горох

Горох по составу зерна и соломы отличается от зерновых злаков повышенным содержанием азота, фосфора, калия, а часто магния и серы. На 1 т основной продукции с учетом побочной горох выносит 58,5 кг азота, 14 кг P_2O_5 , 29,0 кг K_2O , 24 кг CaO , 4,8 кг MgO и 10,5 кг SO_4 . У гороха максимум накопления элементов питания происходит к концу вегетации.

Горох – в симбиозе с клубеньковыми микроорганизмами до 65–70 % азота, идущего на формирование урожая, усваивают из атмосферы. Поэтому потребность в азотных удобрениях у них по сравнению с другими культурами значительно ниже. Внесение азотных удобрений в дозах 25–35 кг/га д. в. следует предусматривать только в годы с прохладной затяжной весной, когда в почве процессы азотфиксации проходят при неблагоприятных условиях (дефиците влаги в почве и низких температурах). Для увеличения азотфиксации применяют бактериальное удобрение.

Горох предъявляет более высокие требования к плодородию почв, чем люпин, он лучше растет на связных по гранулометрическому составу почвах, хорошо реагируют на известкование. Оптимальное значение pH_{KCl} для него 6–7. Он хорошо реагирует на внесение фосфорно-калийных удобрений, повышает урожайность семян, увеличивает фиксацию азота из атмосферы. Горох принадлежит к группе культур, которые хорошо используют запасы фосфора в почвах.

Горох хорошо отзываются на последствие органических удобрений. Биологические особенности зернобобовых культур определяют

потребность их в минеральных удобрениях. Расчетные дозы фосфорных и калийных удобрений под горох приведены в табл. 30 (прил. 64). Азотные удобрения применяют в дозе 30–60 кг/га д. в., а также фосфорные и калийные вносят весной в один прием под культивацию. Хлорсодержащие калийные удобрения при возделывании гороха на дерново-подзолистых суглинистых почвах можно вносить с осени, так как он чувствителен к высокому содержанию хлора в почвах.

Таблица 30. Дозы минеральных удобрений под горох на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 15–20 | 21–25 | 26–35 | 36–45 |
| Фосфорные | Менее 100 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 101–150 | 40–60 | 60–80 | 80–90 | × |
| | 151–200 | 30–45 | 45–60 | 60–75 | 70–90 |
| | 201–300 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| | 301–400 | – | 10–15 | 10–15 | 15–20 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | 100–120 | × | × |
| | 81–140 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | × |
| | 141–200 | 60–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 |
| | 201–300 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | 40–50 |

Горох хорошо отзывается на применение микроэлементов. Хорошим способом применения микроэлементов для него является обработка семян по 100–150 г д. в. молибдена и бора на 1 т семян. Эффективна также некорневая подкормка гороха в фазу бутонизации бором в дозе 50 г/га и марганцем – 50 г/га д. в. Марганец эффективен на почвах с рН_{KCl} больше 6,0.

Горох хорошо реагирует на обработку семян Сапронитом из расчета 200 л на гектарную порцию семян.

6.4. Просо

Благодаря биологическим особенностям просо лучше других зерновых культур использует почвенную влагу, меньше страдает от засухи и весьма отзывчиво на улучшение технологии возделывания, в том числе и на удобрения.

Наиболее высокую урожайность просо формирует на связных почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды (рН_{KCl} 5,5–7,0).

Наиболее пригодными для проса являются хорошо прогреваемые торфяно-болотные почвы, а также дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные, подстилаемые моренным суглинком. Допустимо возделывание на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах, подстилаемых песками.

Рекомендуемое содержание гумуса – не менее 1,6 %, подвижных соединений фосфора и калия – не менее 150 мг/кг.

В первые фазы роста и развития просо растет очень медленно и мало использует элементов питания. У этой культуры короткий период потребления питательных веществ: от кущения до налива зерна просо в течение 45–55 дней использует 80–90 % элементов питания. Максимум поступления азота и калия отмечается в фазе выметывания, фосфора – в фазе восковой спелости.

На формирование 1 т зерна и соответствующего количества соломы используется 30–32 кг азота, 13–15 кг фосфора, 32–34 кг калия, 10–13 кг кальция.

Система удобрения проса минеральная, включающая основное, припосевное внесение и подкормку.

Просо исключительно хорошо использует последствие навоза, поэтому лучше органические удобрения вносить под предшествующую культуру в дозе не менее 40 т/га.

Полную дозу фосфорных и калийных удобрений вносят до посева (табл. 31–33). Хорошие результаты обеспечивает 15–30 кг/га д.в. фосфора в рядки при посеве (просо одна из наиболее отзывчивых на этот агроприем культура).

Таблица 31. Средние дозы минеральных удобрений под просо на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах, подстилаемых мореной

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | | < 30 | 31–40 | 41–50 | 51–60 | 61–70 |
| Азотные | – | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 |
| Фосфорные | Менее 100 | 50–65 | 65–80 | × | × | × |
| | 101–150 | 40–55 | 55–70 | 70–80 | × | × |
| | 151–200 | 30–40 | 40–55 | 55–70 | 70–80 | 80–90 |
| | 201–300 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | – | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 |
| Калийные | Менее 80 | 60–80 | 80–100 | × | × | × |
| | 81–140 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | × |
| | 141–200 | 40–50 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | 120–140 |
| | 201–300 | 30–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 301–400 | – | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |

**Таблица 32. Средние дозы минеральных удобрений под просо
на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных на песках почвах**

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 15–20 | 21–25 | 25–30 | 31–35 | 36–40 |
| Азотные | — | 40–45 | 45–55 | 55–65 | 65–75 | 75–85 |
| Фосфорные | Менее 100 | 40–45 | 45–50 | × | × | × |
| | 101–150 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | × | × |
| | 151–200 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |
| | 201–300 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
| Калийные | Менее 80 | 60–70 | 70–80 | × | × | × |
| | 81–140 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | × | × |
| | 141–200 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 |
| | 201–300 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |

**Таблица 33. Средние дозы минеральных удобрений под просо
на торфяно-болотных почвах**

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---------|--------|
| | | 30–40 | 41–50 | 51–60 |
| Азотные | — | 20–25 | 25–30 | 30–40 |
| Фосфорные | Менее 200 | 65–85 | 85–100 | × |
| | 201–400 | 50–60 | 60–80 | × |
| | 401–600 | 40–55 | 55–70 | 70–80 |
| | 601–800 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| | 801–1000 | 20–25 | 25–30 | 30–40 |
| Калийные | Менее 200 | 90–110 | 110–130 | × |
| | 201–400 | 75–85 | 95–110 | × |
| | 401–600 | 65–80 | 80–95 | 95–110 |
| | 601–800 | 35–55 | 55–75 | 75–90 |
| | 801–1000 | 25–35 | 35–45 | 45–55 |

Примечание. × – при данной обеспеченности фосфором и калием получение планируемой урожайности нерентабельно.

Азотные удобрения на минеральных почвах необходимо вносить под предпосевную культивацию в форме КАС, карбамида или сульфата аммония в дозе 60–90 кг/га д. в. в зависимости от типа почв и планируемой урожайности.

По данным научных исследований под просо целесообразно использовать комплексное NPK-удобрение 16:12:20 с регулятором роста растений феномелан (375–500 кг АФК соответствует N_{60–85}P_{45–65}K_{75–110}) или карбамида с гидрогуматом, применение которых обеспечивает прибавку урожайности зерна от 1,6 до 3,8 ц/га по сравнению со смесью простых удобрений.

Институтом почвоведения и агрохимии разработана технологическая схема применения удобрений для проса (табл. 34).

Таблица 34. Технологическая схема применения минеральных удобрений под просо на планируемую урожайность 40–50 ц/га

| Формы удобрений и пестицидов | Дозы удобрений и пестицидов, д. в. | Сроки и способы применения |
|---|--|---|
| Кинто Дуо Иншур Перформ | 2 л/т 0,4–0,5 л/т | Протравливание семян до посева |
| Карбамид или КАС, аммофос или аммонизированный суперфосфат, хлористый калий | $N_{90}P_{40-60}K_{90-100}$ | До посева под предпосевную обработку почвы |
| Сектор турбо, МД Базагран, 480 г/л, в.р. Балерина, СЭ | 0,075–0,1 л/га 2–4 л/га 0,3–0,5 л/га | Опрыскивание посевов в фазе 3–4 листьев проса против однолетних двудольных, в т.ч. устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторых многолетних двудольных сорняков |
| Сульфат меди, Адоб медь Сульфат марганца, Адоб марганец | $Cu_{25}Mn_{25}$ | Некорневая подкормка в фазе кушения, расход рабочего раствора – 200 л/га |
| Би-58 новый или его аналоги | 0,7–1 л/га | Опрыскивание посевов против комариков и тлей по мере необходимости в период вегетации |

При посеве на зерно доза азота на минеральных почвах не должна превышать N_{90} , а на торфяно-болотных – N_{20-40} .

Подкормки проса азотом в стадию метелки рекомендуются только на посевах, предназначенных на зеленую массу, где общая его доза в среднем составляет не менее 120 кг/га д. в.

Внесение микроэлементов может проводиться в виде некорневой подкормки в фазе кушения медью и на известкованных почвах марганцем в дозах 25 г/га (сульфат меди и сульфат марганца, Адоб медь, Адоб марганец, Эколист моно медь, Эколист моно марганец и др.).

По данным исследований кафедры агрохимии БГСХА высокоэффективным приемом возделывания проса на зерно является обработка семян микроэлементами и регуляторами роста. Перед посевом проводится инкрустация семян раствором, содержащим медь и цинк в дозах 150 г/т, а также регулятором роста Эпибрасинолидом 20 мг/т. Обработка проводится совместно с протравливанием семян и исключает дополнительное внесение микроэлементов в период вегетации. В качестве микроудобрений могут применяться соли металлов или их хелат-

ные формы (сульфат меди и сульфат цинка или Эле Гум-медь и Эле Гум-цинк, Адоб медь и Адоб цинк, Эколист моно Медь, Эколист моно Цинк), а в качестве регулятора роста Эпин.

6.5. Гречиха

В последние годы гречиха в Беларуси возделывается на площади около 20 тыс. га. Выращивать гречиху экономически выгодно даже при уровне урожайности 11 ц/га.

Особенности питания. Гречиха предпочитает хорошо аэрируемые, быстропрогреваемые, чистые от сорняков дерново-подзолистые супесчаные, а также легко- и среднесуглинистые почвы. Она плохо растет на тяжелых, переувлажненных почвах и песках. Гречиха требовательна не только к почве, но и к месту произрастания. В низких местах, где растения могут страдать от избытка влаги, повреждаться заморозками, туманами, зарастать сорняками, гречиху высевать нельзя. Малопригодны для нее и возвышенные места. Ее рекомендуется размещать на участках, защищенных от холодных ветров. Гречиха менее, чем зерновые колосовые, чувствительна к кислотности почвы. Оптимальная величина pH_{KCl} лежит в пределах 5,2–6,0.

Несмотря на способность хорошо усваивать из почвы труднодоступные формы фосфора и калия, гречиха, имея слаборазвитую корневую систему, хорошо отзывается на удобрения.

По сравнению с зерновыми хлебами гречиха очень интенсивная культура. Эта крупяная культура потребляет азота в 1,5 раза (37,5 кг/т), фосфора – в 2 (19,8 кг/т), калия – в 2 (48,2 кг/т) больше, чем зерновые культуры.

У гречихи короткий период потребления питательных веществ, за 30–40 дней (до цветения) после посева гречиха использует более 60 % азота и калия и до 50 % фосфора от использованного количества. Это калиелюбивая культура. Фосфор используется в большей мере во второй половине вегетации. Как и другие культуры, в начале роста и гречиха испытывает потребность в фосфоре. К азоту гречиха менее требовательна, чем к фосфору и калию. Избыток азота задерживает созревание и резко снижает плодообразование. Гречиха – ярко выраженный хлорофоб.

Система удобрения гречихи – минеральная, включающая основное внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, припосевное – фосфорных и в подкормку – микроудобрений (борных, марган-

цевых и цинковых). Оптимальные дозы минеральных удобрений под гречиху представлены в табл. 35.

Таблица 35. Дозы минеральных удобрений под гречиху

| Удобрения кг/га д. в. | Содержание Р ₂ O ₅ и К ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 10,0–15,0 | 15,1–20,0 | 20,1–25,0 | 25,1–30,0 |
| Азотные | – | 35–45 | 45–55 | 55–60 | 65–70 |
| Фосфорные | Менее 100 | 40–60 | 60–80 | × | × |
| | 101–150 | 30–40 | 40–60 | 60–80 | × |
| | 151–200 | 25–35 | 35–50 | 50–70 | 70–90 |
| | 201–300 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| | 301–400 | – | 15–20 | 20–25 | 25–30 |
| Калийные | Менее 80 | 60–80 | 80–100 | × | × |
| | 81–140 | 50–70 | 70–90 | 90–110 | × |
| | 141–200 | 40–60 | 60–80 | 80–90 | 90–100 |
| | 201–300 | 20–30 | 35–45 | 45–55 | 55–65 |
| | 301–400 | – | 20–25 | 25–30 | 30–40 |

Дозы азотных удобрений под средне- и позднеспелые сорта, возделываемые после зерновых предшественников, не должны превышать 70 кг/га, после пропашных – 30–45 кг/га. Для скороспелых сортов дозы азота можно увеличить на 15–20 кг/га. Лучшим азотным удобрением является сульфат аммония, так как гречиха предъявляет повышенные требования к питанию серой. Азотные удобрения в основной прием вносятся под предпосевную обработку почвы.

Фосфорные удобрения рекомендуется вносить осенью под вспашку или весной под предпосевную культивацию. Эффективным приемом использования фосфорных удобрений является внесение их в рядки при посеве в дозе 15–20 кг/га д. в.

Так как гречиха относится к хлорофобным культурам, отрицательно реагирующим на хлор, при высоких дозах внесения хлорсодержащих калийных удобрений у гречихи может наблюдаться пятнистость листьев и снижение урожайности зерна.

В республике под гречиху в основном вносятся хлорсодержащие калийные удобрения (хлористый калий), так как выпуск бесхлорных калийных удобрений (сульфата калия) не производится.

Внесение хлорсодержащих калийных удобрений является одним из основных факторов, лимитирующих получение высоких урожаев гречихи. Поэтому хлористый калий под гречиху на дерново-подзолистых

легкосуглинистых и связносупесчаных почвах, подстилаемых моренными суглинками, следует вносить с осени. За осенний и весенний период хлор из удобрений практически полностью вымывается.

На легких почвах хлористый калий не рекомендуется вносить с осени, так как потери калия из удобрений составляют 25–33 кг/га. Поэтому на песчаных и рыхлосупесчаных почвах хлористый калий под гречиху вносится весной под ранневесеннюю культивацию.

Для основного внесения можно использовать комплексные хлорсодержащие удобрения для гречихи, производимые Гомельским заводом:

- для почв со средним и повышенным содержанием подвижного фосфора и калия в почвах марки N : P : K = 16–12–20; 15–11–19; 14–10–17. Они содержат N – 14–16 %, P_2O_5 – 10–12 %, K_2O – 17–20 %, MgO – до 4 %, B – 0,17–0,18 %, Zn – до 0,2 %, Cu – до 0,2 %, Fe – 0,02 % и регуляторы роста растений (Феномелан, Эпин или Гидрогумат);

- для почв с низким содержанием подвижных соединений фосфора и калия в почвах марки N:P:K = 8–20–30, 9–18–28, 10–19–25.

Кроме того, для внесения под предпосевную культивацию можно использовать бесхлорные комплексные удобрения, которые выпускает Гринтур:

- для почв с повышенным содержанием подвижных соединений фосфора и средним и повышенным содержанием калия в почвах, марки N:P:K = 13:7–9:15–17;

- для почв с низким содержанием подвижных соединений фосфора и средним и повышенным содержанием подвижного калия в почвах, марки N:P:K = 8–19–16, 10–16–17.

В составе всех перечисленных удобрений входят микроэлементы и регуляторы роста растений, указанные в марке N:P:K = 16–12–20.

Дозы комплексных удобрений под гречиху на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах представлены в табл. 36.

На почвах I и II групп обеспеченности почв бором, марганцем и цинком гречиха нуждается в борных, марганцевых и цинковых удобрениях. Микроудобрения вносятся в некорневую подкормку до начала фазы бутонизации в дозе B – 50 г/га (250 г/га борной кислоты), Mn – 50 г/га (200 г сульфата марганца) и Zn – 50 г/га (200 г/га сульфата цинка). В качестве микроудобрений можно использовать органо-минеральные и хелатные формы Эколист, Адоб и др.

Таблица 36. Дозы комплексных удобрений под гречиху, кг ф. в./га

| Комплексные удобрения | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зерно), ц/га | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 10,0–15,0 | 15,1–20,0 | 20,1–25,0 | 25,1–30,0 |
| | | Дозы удобрений, кг/га | | | |
| | | 35–45* | 45–55* | 55–60* | 65–70* |
| N ₁₆ P ₁₂ K ₂₀ с модифицирующими добавками | P ₂ O ₅ от 150 до 250 K ₂ O от 141 до 300 | 220–280 | 280–345 | 345–375 | 410–440 |
| N ₁₅ P ₁₁ K ₁₉ с модифицирующими добавками | P ₂ O ₅ от 150 до 250 K ₂ O от 141 до 300 | 230–300 | 300–370 | 370–400 | 430–470 |
| N ₁₄ P ₁₀ K ₁₇ с модифицирующими добавками | P ₂ O ₅ от 150 до 250 K ₂ O от 141 до 300 | 250–320 | 320–395 | 395–430 | 460–500 |
| N ₁₃ P _{7–9} K _{15–17} с модифицирующими добавками | P ₂ O ₅ от 150 до 250 K ₂ O от 141 до 300 | 270–350 | 350–420 | 420–460 | 500–540 |

* Доза действующего вещества азота в комплексном удобрении, по которой рассчитывается физический вес удобрения на 1 гектар.

6.6. Лен-долгунец

Лен-долгунец – культура высокочувствительная к пищевому режиму. Высокая требовательность к плодородию почвы объясняется слаборазвитой корневой системой с невысокой усвояющей способностью и коротким вегетационным периодом. Лен плохо использует питательные элементы из труднодоступных соединений почвы.

С 1 т основной продукции с учетом побочной лен выносит 58,1 кг азота, 22,9 кг P₂O₅, 73,0 кг K₂O, 15,0 кг CaO, 7,8 кг MgO и 16,0 кг SO₄.

Критические периоды в питании растений по азоту – от фазы «елочка» до бутонизации, фосфору – от всходов до образования 10–12 листьев (до фазы «елочки») и по калию – в первые три недели роста (фаза «елочки»), а также в фазе бутонизации, когда калий необходим растениям для образования семян и волокна.

При недостатке азота рост льна задерживается, образуются короткие и тонкие однокоробчатые растения, не обеспечивается высокий урожай. В то же время избыток азота усиливает образование листьев, при этом стебель затеняется, быстро вытягивается и полегает, так как механические ткани не успевают окрепнуть. Образуется рыхлое непрочное волокно, задерживается созревание семян.

Фосфорное голодание приводит к приостановлению роста стебля, уменьшению его технической длины, снижению урожая семян и прочности волокна.

Недостаточное калийное питание в первые три недели после всходов ослабевает образование волокна, а после бутонизации ухудшает качество и снижает урожай волокна.

К фазе «елочка», когда рост незначителен, растения льна усваивают 16–36 % азота, 6–15 % фосфора и 11–12 % калия от общего потребления этих элементов. К моменту цветения лен усваивает 60–84 % азота, 63–80 % фосфора и 71–90 % калия от общего потребления в зависимости от сортовых особенностей. Максимальное количество элементов питания лен получает в период быстрого роста от конца фазы «елочка» до цветения.

Лен – типичный хлорофоб. Хлор снижает урожай и ухудшает его качество.

При определении доз удобрений под лен возникает ряд специфических трудностей, обусловленных биологическими особенностями этой культуры (невысокая усваивающая способность корневой системы, короткий период их потребления, повышенная чувствительность к концентрации почвенного раствора и недостатку влаги). Лен больше, чем другие культуры, требует соблюдения доз и правильного соотношения элементов питания, равномерного распределения удобрений по полю.

На почвах, хорошо обеспеченных азотом (содержание гумуса 2 % и более), соотношение между азотом, фосфором и калием должно составлять 1:3:4, а бедных (меньше 1,5 % гумуса) – 1:2:2. Система для льна-долгунца рекомендуется трехчленная: основное (допосевное) внесение удобрений, припосевное в рядки при посеве и подкормка микроэлементами.

Наиболее пригодными и пригодными почвами для возделывания льна являются дерново-подзолистые автоморфные (нормального увлажнения) и временно избыточно увлажненные средне- и легкосуглинистые, связносупесчаные, подстилаемые моренными суглинками и песками, а также рыхлосупесчаные, подстилаемые моренными суглинками ближе 1 м.

Не следует размещать посевы льна на полях мелкоконтурных, крутосклонных и завалуненных.

При подборе почв для посева льна определяющим фактором является показатель кислотности почвы. Для льна оптимальное значение $pH_{(KCl)}$ находится в узком интервале 5,0–5,6 единиц. При посеве на почвах с $pH_{(KCl)}$ более 6,0 единиц лен поражается кальциевым хлорозом, в силу чего резко снижаются урожайность и качество волокна.

При уровне pH 5,7–5,8 избыток кальция можно нейтрализовать дополнительным внесением калийных удобрений.

На урожайность льна отрицательно действует также повышенное содержание в почве алюминия. Избыток подвижного алюминия (более 2 мг/кг почвы) вызывает токсикоз, стеблестой изреживается, урожайность снижается. Лен чувствителен к недостатку бора и цинка и особенно на известкованных почвах.

Важнейший фактор, обеспечивающий высокую урожайность и качество льноволокна, – сбалансированное питание растений (макро-, и микроэлементами).

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений под лен-долгунец приведены в табл. 37.

Таблица 37. Дозы минеральных удобрений под лен на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (волокно), ц/га | | | | |
|---------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 7–9 | 9–11 | 11–13 | 13–15 | 15–20 |
| Азотные | – | 25–30 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 |
| Фосфорные | Менее 100 | – | – | – | – | – |
| | 101–150 | 80–90 | – | – | – | – |
| | 151–200 | 70–80 | 80–90 | – | – | – |
| | 201–300 | 50–60 | 60–70 | 80–90 | 90–100 | 100–110 |
| | 301–400 | 15–20 | 15–20 | 20–30 | 40–50 | 50–60 |
| Калийные | Менее 80 | – | – | – | – | – |
| | 81–140 | 110–120 | – | – | – | – |
| | 141–200 | 90–110 | 110–130 | – | – | – |
| | 201–300 | 70–90 | 90–110 | 110–130 | 140–160 | 160–180 |
| | 301–400 | 30–40 | 40–50 | 40–50 | 60–70 | 70–80 |

Максимально допустимой дозой азота при размещении посевов льна после небобовых предшественников является 35 кг/га д. в. Если лен возделывается после зернобобовых и пропашных, по обороту клеверного пласта (зерновые), то дозы азотных удобрений необходимо уменьшить на 10–15 кг/га д. в. Более высокие их дозы приводят к полеганию стеблестой, усиливают заболеваемость растений, снижают урожай и качество льнопродукции.

В настоящее время разработаны марки комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений, содержащие необходимые макро- и микроэлементы (бор, цинк, железо, и, при необходимости, регуляторы роста растений), в том числе: марка NPK – 6:21:32 с B, Zn, Fe предна-

значена для почв с низким содержанием фосфора; NPK – 5:16:35 с В, Zn, Fe – для почв со средним и повышенным содержанием фосфора и низким содержанием калия; NPK – 7:15:29 с В, Zn, Fe – для почв с высоким содержанием фосфора и калия. Удобрения рекомендуются для внесения в основную заправку почвы.

В рядки при посеве применяют 15–20 кг/га д. в. P_2O_5 . Можно использовать комплексные удобрения аммофос и аммонизированный суперфосфат.

Дозы комплексных удобрений на дерново-подзолистых почвах под лен-долгунец рассчитываются по азоту в зависимости от уровня планируемой урожайности и содержания в почве подвижных соединений фосфора и калия (табл. 38).

Таблица 38. Дозы комплексных удобрений под лен-долгунец на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Комплексные удобрения | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемый урожай (волокно), ц/га | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | 7–9 | 10–12 | 13–15 | >16 |
| | | Дозы удобрений, кг/га | | | |
| $N_6P_{21}K_{32}$ с 0,22 % (В), 0,30 % (Zn) и 0,2 % (Fe) | P_2O_5 101–250 K_2O 200–400 | 250* $N_{15}P_{53}K_{80}$ | 330 $N_{20}P_{70}K_{105}$ | 400 $N_{24}P_{84}K_{128}$ | 500 $N_{30}P_{105}K_{160}$ |
| $N_5P_{16}K_{35}$ с 0,17 % (В), 0,26 % (Zn) и 0,2 % (Fe) | P_2O_5 250–400 K_2O 140–200 | 300* $N_{15}P_{48}K_{105}^{**}$ | 400 $N_{20}P_{64}K_{140}$ | 500 $N_{25}P_{80}K_{175}$ | 600 $N_{30}P_{96}K_{210}$ |

* Физический вес удобрения на 1 га; ** доза внесения на 1 га действующего вещества.

При отсутствии в хозяйствах комплексных форм удобрений для льна рекомендуется применение стандартных форм удобрений (азотных, фосфорных, калийных).

Технологические схемы применения удобрений под лен приводятся в табл. 39.

В зависимости от степени кислотности почв рекомендуются три варианта системы удобрения льна-долгунца, которые обеспечивают максимальное снижение поражаемости растений кальциевым хлорозом (табл. 39).

Для внесения твердых комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений под лен применяют штанговые машины РШУ-12, СУ-12, МТТ-4Ш, или центробежные машины РДУ-1,5, РУ-2000, «Alfa», «Rauch».

Из **микроэлементов** для льна наиболее важны бор и цинк. Лучшим способом их применения являются некорневые подкормки в фазе

«елочки» – 150 г/га д.в. бора и 250 г/га д. в. цинка (можно совмещать с химической прополкой посевов).

Таблица 39. Технологическая схема применения макро- и микроудобрений при выращивании льна-долгунца (урожайность льноволокна 10–12 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|--|--|---|
| pH – 5,5–5,6 | | |
| N _{20–30} P _{60–90} K _{90–120} | Комплексное удобрение марки 5–16–35 или 6–21–32, или аммофос и хлористый калий | До посева |
| B _{30–75} Zn _{46–92} | Адоб бор, Адоб цинк или МикроСтим бор, МикроСтим цинк | Некорневая подкормка: В фазе всходы-начало фазы «елочка» (до высоты растений 4–5 см) в баковой смеси с инсектицидом против льняной блошки. Расход рабочего раствора 200 л/га |
| pH – 5,7–5,9 | | |
| N _{20–30} P _{60–90} K _{150–180} | Комплексное удобрение марки 5–16–35 или 6–21–32, или аммофос и хлористый калий | До посева |
| B _{30–75} Zn _{46–92} | Адоб бор, Адоб цинк Или МикроСтим бор, МикроСтим цинк | Некорневая подкормка: В фазе всходы-начало фазы «елочка» (до высоты растений 4–5 см) в баковой смеси с инсектицидом против льняной блошки. Расход рабочего раствора 200 л/га |
| pH – 6,0–6,2 | | |
| N _{20–30} P _{60–90} K _{180–210} | Комплексное удобрение марки 5–16–35 или 6–21–32, или аммофос и хлористый калий | До посева |
| B _{30–75} Zn _{46–92} | Адоб бор, Адоб цинк Или МикроСтим бор, МикроСтим цинк | Некорневые подкормки: 1-я – в фазе всходы-начало фазы «елочка» (до высоты растений 4–5 см) в баковой смеси с инсектицидом против льняной блошки. 2-я – через 7–10 дней после первой. Расход рабочего раствора 200 л/га |

6.7. Сахарная свекла

Сахарная свекла – культура, требовательная к почвенным условиям. Лучшими для ее возделывания являются дерново-карбонатные, дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы, подстилаемые моренными суглинками. Наиболее благоприятная реакция почвенного

раствора для сахарной свеклы – pH_{KCl} 6,5–7,5, содержание гумуса – не менее 1,8 %, подвижного фосфора и калия не менее 150 мг/кг, бора не менее 0,7 мг/кг.

Сахарная свекла в процессе вегетации выносит большое количество элементов питания. С 1 т корнеплодов и соответствующим количеством ботвы сахарная свекла выносит в среднем 4,0 кг азота, 1,6 кг P_2O_5 и 6,5 кг K_2O . Вынос элементов питания этой культурой в значительной мере зависит от вносимых удобрений, плодородия почвы и условий погоды.

Сахарная свекла хорошо реагирует на известкование. Известкование проводится пылевидной доломитовой мукой или отходом сахарного производства – дефекатом. Длительное известкование доломитовой мукой привело к тому, что содержание магния в почвах свекло-сеющих хозяйств республики стало выше оптимального уровня (150 мг/га MgO). На этом фоне проявляется высокая эффективность известкования дефекатом. С гектарной нормой дефеката 8 т/га (эквивалентной 5 т/га доломитовой муки) наряду с кальцием в почву вносятся 95 кг/га азота, фосфора, калия и значительное количество микроэлементов цинка, меди, марганца, бора, кобальта. Эффективность известкования проявляется и в последствии на других культурах. Вносить дефекат необходимо разбрасывателями удобрений с центробежными рабочими органами: МВУ-5А, МВУ-8, МХА-7 и другими. Известкование следует проводить под предшественник или непосредственно под сахарную свеклу. Затраты на известкование дефекатом примерно в два раза меньше, чем доломитовой мукой.

В развитии сахарной свеклы имеются три периода: первый – развитие листьев, второй – рост корнеплодов и третий – накопление сахара.

В первоначальный период развития свеклы, когда ее корневая система развита слабо, необходимо в почве различие доступных питательных веществ в непосредственной близости к прорастающему семени. Недостаток элементов питания в этот период отрицательно сказывается в дальнейшем развитии корнеплода и накопления в нем сахара. В период образования листьев большое значение имеет повышение в питательной среде удельного веса азота. Чем полнее свекла обеспечена в этот период азотным питанием, тем выше урожайность и сахаристость корнеплодов.

В период роста корнеплодов и накопления сахара снижение удельного веса азота оказывает положительное влияние на урожайность и

качество сахарной свеклы. Действие фосфора и калия зависит от обеспеченности свеклы азотом.

Большое значение в правильной системе питания сахарной свеклы имеет оптимальное соотношение между отдельными элементами питания в разные периоды роста. Это соотношение обеспечивается системой удобрений, внесением органических и минеральных удобрений и сочетанием основного внесения удобрений, припосевного и подкормок.

Навоз (40–80 т/га) лучше вносить под предшественники сахарной свеклы – озимые, а под свеклу в этом случае применять только минеральные удобрения. Навоз можно вносить и непосредственно под свеклу – осенью под вспашку. Если подстилочный или жидкий навоз вносится после известкования, то необходимо сначала заделать известь. Внесение навоза на неприкрытую доломитовую муку или дефека́т приводит к потерям азота.

В начале роста сахарная свекла поглощает относительно небольшое количество азота, фосфора и калия, однако в этот период она очень чувствительна к недостатку фосфора. Внесение 10–20 кг/га P_2O_5 в рядки при посеве создает благоприятный пищевой режим в первые 15–20 дней после всходов. Эффективно в припосевное удобрение вносить по 10 кг NPK в форме комплексных удобрений. В период интенсивного роста листьев свекла потребляет много азота и калия. Для формирования корнеплодов растениям требуется умеренное азотное и усиленное фосфорное и калийное питание. Максимальное поступление элементов питания в растения свеклы отмечается в июле-августе. К концу вегетации сахарной свеклы 43 % азота, 18 % фосфора и 38 % калия теряется в результате отмирания, опадения листьев и оттока элементов питания в почву.

Сахарная свекла отзывчива на органические удобрения. Она имеет продолжительный период вегетации и хорошо использует из них питательные вещества.

Важным условием эффективного использования минеральных удобрений является дифференцированное их внесение с учетом планируемого урожая и уровня почвенного плодородия (табл. 40, прил. 64).

Наиболее эффективные из минеральных удобрений – азотные. Каждый килограмм азота способствует увеличению урожая корнеплодов на 50–60 кг. Однако с целью улучшения качества корнеплодов максимальные дозы азотных удобрений не должны превышать 130–

140 кг/га. Избыточное азотное питание приводит к накоплению альфа-аминного азота в корнеплодах и снижению чистоты клеточного сока, что в результате уменьшает выход сахара. Повышенные дозы азотных удобрений рекомендуется вносить дробно – 90–100 кг/га в основное внесение и 30–40 кг/га в подкормку. Лучшее время подкормки азотом – первая пара настоящих листьев, но не позднее четырех пар листьев. Подкормку азотом завершают до середины июня.

Таблица 40. Дозы минеральных удобрений* под сахарную свеклу на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. ** | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемый урожай (корнеплоды), ц/га | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 400–450 | 451–500 | 501–550 | 551–600 |
| Азотные | – | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 |
| Фосфорные | Менее 100 | 110–120 | × | × | × |
| | 101–150 | 100–110 | 110–120 | × | × |
| | 151–200 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| | 201–300 | 50–55 | 55–60 | 60–70 | 70–80 |
| | 301–400 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
| Калийные | Менее 80 | 120–140 | × | × | × |
| | 81–140 | 110–130 | 130–150 | × | × |
| | 141–200 | 90–100 | 100–120 | 120–140 | 140–150 |
| | 201–300 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| | 301–400 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–60 |

* На фоне внесения 60 т/га органических удобрений; ** при данной обеспеченности подвижными формами фосфора, калия получение планируемой урожайности экономически нецелесообразно.

Фосфорные и калийные удобрения вносят под предпосевную культивацию; на связных почвах возможно осеннее внесение фосфора и калия. В основное внесение применяют все имеющиеся в республике формы азотных и фосфорных удобрений. При дозах выше N_{100} КАС, сульфат аммония вносят за 7–10 дней до посева. В качестве калийных удобрений эффективно использовать 40%-ную калийную соль, которая наряду с калием содержит 20 % натрия, внесение которого увеличивает урожай корнеплодов и улучшает их качество.

В почве свеклосеющих районов Беларуси низкое содержание серы. Как серосодержащие удобрения, следует использовать сульфат аммония (3–4 ц/га), фосфогипс (2 т/га) и комплексное серосодержащее удобрение.

Сахарная свекла относится к культурам, чувствительным к недостатку бора. При недостатке бора развивается гниль сердечка, снижается сахаристость, снижается урожай. Лучшим способом внесения микроудобрений является некорневая подкормка бором (200 г/га) и марганцем (50 г/га д. в.). При этом во время вегетации сахарной свеклы проводятся две некорневые обработки микроэлементами: первая – в фазу смыкания листьев в рядке, вторая – через 1–1,5 месяца после первой.

Целесообразно применение борной кислоты в почве в дозе 2–3 кг/га в почву. В почве бор связывается с органическим веществом и коэффициент его использования растениями измеряется в десятых и сотых долях процента. С урожаем сахарной свеклы 500 ц/га выносятся 400 г/га бора. Две некорневые подкормки бором в фазе 10–12-го листа и повторно через 30–45 дней полностью удовлетворяют потребность в боре этой культуры.

Наряду с борной кислотой можно использовать борные удобрения, содержащие бор в органической форме, как производимые в Беларуси (МикроСтим бор, МикроСил бор), в которых дополнительно содержатся регуляторы роста – гидрогумат и Экосил, так и в Польше (Адоб бор, Эколист моно бор, Солубор).

Опытной научной станцией по сахарной свекле разработаны составы удобрительные для некорневых подкормок «Свекла», которые состоят из борной кислоты, мочевины, сернокислых солей марганца, меди, цинка, кобальта, молибденовокислого аммония. Эти составы зарегистрированы и запатентованы и показали высокую эффективность. Первую некорневую подкормку этими составами рекомендуется проводить от смыкания растений в рядках до смыкания в междурядьях, вторую – в конце июля – начале августа, в засуху необходима третья некорневая подкормка.

Разработаны комплексные удобрения для сахарной свеклы, сбалансированные по элементному составу с учетом плодородия почв и биологических особенностей культуры.

Дозы комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений под сахарную свеклу рассчитываются по азоту, возможно и по фосфору (в комплексном удобрении), в зависимости от планируемого урожая и содержания подвижных форм фосфора и калия в почве (табл. 41, прил. 64).

Таблица 41. Дозы комплексных удобрений, рекомендуемые Институтом почвоведения и агрохимии, под сахарную свеклу на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых моренными суглинками почвах

| Комплексные удобрения | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемый урожай (корнеплоды), ц/га | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 300–400 | 401–450 | 451–500 | 501–600 |
| | | Дозы удобрений, кг/га | | | |
| | | 90–110** | 110–120** | 120–130** | 130–150** |
| $N_{16}P_{12}K_{20}$ с В и Мп | $P_2O_5 < 200$ $K_2O < 200$ | 560–690* | 690–750 | 750–810 | 810–940 |
| $N_{13}P_{12}K_{19}$ с В, S и Na | $P_2O_5 < 200$ $K_2O < 200$ | 690–850 | 850–920 | 920–1000 | 1000–1150 |
| $N_{14}P_8K_{18}$ с В и Мп | P_2O_5 201–400 K_2O 201–400 | 640–790 | 790–860 | 860–930 | 930–1070 |
| $N_{17}P_9K_{22}$ с В и Мп | P_2O_5 201–400 K_2O 201–400 | 530–650 | 650–700 | 700–770 | 770–880 |

* Физический вес удобрения на 1 га; ** доза действующего вещества азота в комплексном удобрении, по которой рассчитывается физический вес удобрения на 1 гектар.

Технологическая схема применения удобрений, разработанная РУП «Институт почвоведения и агрохимии», при возделывании сахарной свеклы приводится в табл. 42.

Таблица 42. Технологическая схема применения удобрений при возделывании сахарной свеклы (урожайность 500–600 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|-----------------------------------|---|---|
| Навоз 60–70 т/га | – | Осенью под вспашку |
| $N_{100-120}P_{60-90}K_{150-180}$ | Комплексное удобрение марки 16–12–20 или КАС, мочевины, аммофос, хлористый калий | До посева |
| N_{30} | Мочевина | В фазе 2–4 листьев |
| $B_{100-300}Mn_{50}$ | Борная кислота (Солюбор ДФ) и сульфат марганца или ЭлеГум бор и ЭлеГум марганец или Адоб бор и Адоб марганец | Некорневые подкормки: 1-я – в фазе 10–12 листьев с добавлением мочевины до 10 кг на 200 л рабочего раствора; 2-я – через 1–1,5 месяца после 1-й |

6.8. Кормовая свекла

Кормовая свекла дает хорошие урожаи на богатых органическим веществом дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах с глубоким пахотным горизонтом, отличающихся повышенным плодо-

родиет. Она дает хорошие урожаи на почвах с близкой к нейтральной реакцией почвенной среды (pH_{KCl} 6,2–7,2) и очень отзывчива на известкование.

Кормовая свекла обладает слаборазвитой корневой системой, в то же время при высокой урожайности она потребляет большое количество питательных веществ. Вынос с 1 т основной и соответствующим количеством побочной продукции составляет 3,5 кг азота, 1,1 кг P_2O_5 и 7,9 кг K_2O . Кормовая свекла с урожаем корнеплодов 800 ц/га выносит из почвы 280 кг азота, 88 кг – P_2O_5 и 632 кг K_2O .

В течение вегетации кормовая свекла потребляет элементы питания неодинаково. Усиленное азотное питание необходимо при формировании надземной массы. Фосфор равномерно поглощается в течение вегетации. Калий активней поглощается во второй половине вегетации. Например, кормовая свекла за май – июнь потребляет 23 % азота от общего потребления и по 15–16 % фосфора и калия, в июле – августе – 67–68 % азота и калия и 62 % фосфора, а в сентябре азота только 10 %, фосфора – 23 и калия 16 %.

Кормовая свекла хорошо отзывается на совместное применение органических и минеральных удобрений. Окупаемость 1 т навоза кормовой свеклой составляет 200 кг и 1 кг NPK – 65 кг корнеплодов.

Кормовая свекла хорошо отзывается на внесение комплексных удобрений в рядки при посеве в дозе по 10–12 кг NPK.

Под кормовую свеклу можно вносить любые формы азотных и фосфоросодержащих удобрений, которые используются в настоящее время в Беларуси.

Система удобрения под кормовую свеклу – органоминеральная. Органические удобрения под нее вносятся в дозе 80–90 т/га. Лучшим сроком их внесения является осеннее под вспашку.

Минеральные удобрения вносятся в дозах, рассчитанных в зависимости от содержания элементов питания в почвах и уровня планируемой урожайности (табл. 43, прил. 64, 65).

Фосфорные и калийные удобрения можно вносить как осенью под вспашку, так и весной под предпосевную культивацию. Лучшей формой калийных удобрений для кормовой свеклы, так же как и для сахарной, является калийная соль, которая содержит натрий. На песчаных и рыхлосупесчаных почвах калийные удобрения вносятся под предпосевную культивацию.

Таблица 43. Дозы минеральных удобрений* под кормовую свеклу на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность (корнеплоды), ц/га | | | |
|------------------------|--|--|---------|---------|---------|
| | | 200–300 | 301–500 | 501–700 | 701–900 |
| Азотные | – | 40–60 | 60–100 | 100–140 | 140–180 |
| Фосфорные | Менее 100 | 50–70 | 70–110 | × | × |
| | 101–150 | 30–50 | 50–80 | × | × |
| | 151–200 | 20–40 | 40–70 | 70–100 | × |
| | 201–300 | 10–30 | 30–50 | 50–70 | 70–80 |
| | 301–400 | – | 10–20 | 20–30 | 30–40 |
| Калийные | Менее 80 | 60–100 | 100–180 | × | × |
| | 81–140 | 40–80 | 80–150 | × | × |
| | 141–200 | 30–60 | 60–100 | 110–160 | × |
| | 201–300 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–110 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | 40–60 |

*На фоне внесения 80–90 т/га органических удобрений.

Азотные удобрения под кормовую свеклу в дозах более 120 кг/га д. в. применяются в два приема: 100–120 кг/га – под предпосевную культивацию и 40–60 кг/га в подкормку в фазу 2–4 настоящих листьев, но не позднее 8 листьев. Максимальная доза азотных удобрений не должна превышать 180 кг/га д. в., так как более высокие дозы приводят к избыточному накоплению нитратов (выше ПДК – 800 мг/кг сырой массы) в корнеплодах.

На посевах кормовой свеклы при низком и среднем содержании бора и марганца в почве проводятся некорневые подкормки борными и марганцевыми удобрениями в фазе 10–12 листьев (смыкание ботвы в междурядьях) в дозах В – 100–300 г/га, Мп – 50 г/га (табл. 43). Максимальную дозу бора (300 г/га) необходимо вносить на почвах 1-й группы обеспеченности бором и при засушливых условиях вегетационного периода. Наряду с борной кислотой и сернокислым марганцем можно применять Адоб бор (0,7–2,0 л/га), Эколист моно бор (0,7–2,0 л/га), Адоб марганец (0,3 л/га), Эколист моно марганец (0,3 л/га). Рекомендуются добавлять до 10 кг карбамида на 200 л рабочего раствора.

6.9. Кукуруза

Кукуруза лучше других зерновых культур использует солнечную энергию, благодаря чему обладает большим потенциалом продуктив-

ности и поэтому предъявляет высокие требования к плодородию почвы и применению удобрений. Она хорошо растет на дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых почвах, супесчаных и песчаных, подстилаемых моренным суглинком почвах, с высоким содержанием гумуса. Малопригодными для кукурузы являются тяжелосуглинистые, а также песчаные почвы, подстилаемые песками. Непригодны для нее заболоченные почвы с близким стоянием грунтовых вод, с повышенным содержанием солей и кислые почвы с pH_{KCl} выше 5,5. Плодородие почвы в большей мере гарантирует получение высоких урожаев, особенно зерна.

Кукуруза имеет мощную корневую систему, способную извлекать элементы питания из большого объема почвы. С 1 т зеленой массы она выносит 3,3 кг азота, 1,2 кг P_2O_5 и 4,2 кг K_2O , а с 1 т зерна и соответствующим количеством побочной продукции 30,2 кг азота, 13,3 кг P_2O_5 и 27,6 кг K_2O .

Кукуруза не переносит кислых почв и без известкования даже при внесении органических и минеральных удобрений нельзя рассчитывать на хорошие урожаи этой культуры. Почву под посев кукурузы желательно произвестковать под предшествующую культуру.

Она полнее, чем другие зерновые культуры, использует питательные вещества почвы и удобрений, так как имеет более продолжительный вегетационный период.

Кукуруза – теплолюбивая культура, что в основном определяет требования к условиям произрастания. При недостатке тепла весной она очень медленно развивается в первый месяц после появления всходов. Пониженные температуры в этот период способствуют проявлению относительного голодания растений, так как кукуруза активно потребляет питательные вещества при температуре почвы на глубине 10 см более 10 °С. В это время она весьма требовательна к наличию в почве легкодоступных питательных элементов.

Питательные вещества кукуруза потребляет на протяжении всего периода вегетации, вплоть до наступления восковой спелости зерна. Однако наиболее интенсивное их поглощение наблюдается в период быстрого роста за сравнительно короткий промежуток времени – выметывание метелок – цветения. К фазе цветения кукуруза усваивает до 60 % азота, фосфора и до 80 % калия от общего выноса урожаем. Поглощение азота продолжается почти до созревания.

Азот особенно необходим кукурузе при появлении 6–7-го листа, когда закладываются метелки и початки. Максимальное поглощение

азота приходится на период за две-три недели до выбрасывания метелок.

Поглощение фосфора продолжается более длительное время. Кукуруза усваивает его равномерно вплоть до созревания. Фосфор требуется кукурузе после появления всходов для лучшего развития корней, а также в фазы цветения и образования зерна. Недостаток фосфора в почве задерживает рост и развитие цветков и зерен в початке. Фосфорные удобрения, внесенные в припосевное и основное удобрение, способствуют мощному развитию корневой системы, более раннему образованию початков и созреванию.

Калий необходим на протяжении всей вегетации кукурузы, недостаток его в почве способствует полеганию этой культуры, особенно в увлажненные годы. Однако калий наиболее интенсивно поглощается в первый период вегетации.

Кукуруза потребляет много серы, кальция и магния. Магний и цинк повышает урожай зерна и устойчивость кукурузы к холоду. Недостаток серы сдерживает образование белка, а меди и бора – сахаров, витамина С. При оптимальном борном питании увеличивается озерненность початка.

Кукуруза плохо усваивает питательные вещества из труднорастворимых соединений и выдерживает повышенную концентрацию солей в почве, а также высокие дозы минеральных удобрений в прикорневой зоне.

При возделывании кукурузы в севообороте лучшей системой удобрения является органоминеральная, включающая основное внесение минеральных и органических удобрений, припосевное – фосфора и подкормку азотом и микроэлементами. Доза подстильного навоза и компостов под кукурузу составляет 60–80 т/га. Лучшим сроком применения является внесение его осенью под вспашку. Под кукурузу можно вносить жидкий бесподстильный навоз в дозах, соответствующих содержанию в нем азота до 200 кг/га. Более высокие дозы могут приводить к накоплению нитратов в растениях и загрязнению грунтовых вод.

Оптимальные дозы минеральных удобрений определяются в зависимости от содержания фосфора и калия в почве и уровня планируемой урожайности (табл. 44, прил. 64).

Фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить осенью под вспашку, на супесчаных – весной под предпосевную культивацию. Обязательным условием (при наличии в хозяйстве

соответствующей техники) должно быть внесение фосфора 10–15 кг/га P_2O_5 в рядки при посеве в форме суперфосфата или аммофоса.

Таблица 44. Дозы минеральных удобрений* под кукурузу на силос на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность, ц/га | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 350–400 | 401–450 | 451–500 | 501–550 | 551–600 |
| Азотные | – | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–150 |
| Фосфорные | Менее 100 | 90–100 | × | × | × | × |
| | 101–150 | 70–80 | 80–90 | × | × | × |
| | 151–200 | 55–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 |
| | 201–300 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 |
| Калийные | Менее 80 | 120–140 | × | × | × | × |
| | 81–140 | 100–110 | 110–120 | × | × | × |
| | 141–200 | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–140 |
| | 201–300 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| | 301–400 | 35–40 | 40–45 | 45–50 | 50–55 | 55–60 |

*На фоне внесения 60–80 т/га органических удобрений.

Расчетную дозу азота до 120 кг/га вносят в один прием под предпосевную культивацию. При использовании более высоких доз азота необходимо часть азота (30 кг/га) внести в подкормку в фазе 4–6 листьев. Для подкормки лучше использовать карбамид или КАС. Подкормку кукурузы КАС необходимо проводить опрыскивателями, оснащенными волочильными шлангами, чтобы избежать ожогов растений.

Система удобрения кукурузы в севообороте несколько отличается от системы удобрения ее при повторном посеве. Так, при повторном посеве органические удобрения вносятся через год, а минеральные – ежегодно. Дозы фосфора и калия рассчитываются с учетом планируемой урожайности и содержания P_2O_5 и K_2O в почве.

На посевах кукурузы при низком и среднем содержании цинка и меди в почве рекомендуется проводить некорневые подкормки цинковыми и медными удобрениями в фазе 6–8 листьев в дозе 150 г/га и 50 г/га соответственно. Наряду с сернокислым цинком можно использовать Эколист моно цинк в дозе 1,3 л/га, или Адоб цинк – 2 л/га в баковой смеси с 10 кг мочевины на 200 л/га рабочего раствора. Адоб медь для подкормки кукурузы используется в дозе 0,8 л/га, Эколист моно медь – 0,6 л/га.

Таблица 45. Технологическая схема применения удобрений при возделывании кукурузы (урожайность зерна 100–110 ц/га)

| Дозы удобрений | Формы удобрений | Сроки применения |
|--|---|---|
| Севоборот | | |
| Навоз 60–70 т/га | – | Осенью под вспашку |
| N ₉₀ P _{60–80} K _{120–150} | КАС или мочевины, ам- мофос, хлористый калий | До посева |
| N ₃₀ | Мочевина | В фазе 4–6 листьев |
| Zn ₁₅₀ | Адоб цинк, или сульфат цинка | Некорневые подкормки: в фазе 6–8 листьев. в баковой смеси с мочевиной – 10 кг на 200 л рабочего раствора |
| Монокультура | | |
| 1-й год – навоз 80 т/га | – | Осенью под вспашку |
| N _{70–80} P ₆₀ K ₁₂₀ | КАС или мочевины, ам- мофос, хлористый калий | До посева |
| N ₃₀ | Мочевина | В фазе 4–6 листьев |
| 2-й год – N ₉₀ P ₈₀ K ₁₅₀ | КАС или мочевины, ам- мофос, хлористый калий | До посева |
| N ₃₀ | Мочевина | В фазе 4–6 листьев |
| Zn ₁₅₀ | Адоб цинк, или сульфат цинка | Некорневые подкормки: в фазе 6–8 листьев. в баковой смеси с мочевиной – 10 кг на 200 л рабочего раствора |

Следует отметить, что системы удобрения кукурузы на зерно и на силос существенно не отличаются. Однако непременным условием системы удобрения кукурузы на зерно является обязательное применение фосфорных удобрений в оптимальных дозах.

6.10. Картофель

Картофель в Беларуси является ценной продовольственной, кормовой и технической культурой. Он может давать хорошие урожаи на разных по генезису и гранулометрическому составу почвах. Наиболее благоприятны для возделывания картофеля дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком.

С урожаем картофеля на каждую тонну клубней выносятся в среднем 5,4 кг азота, 1,6–2,0 кг P₂O₅ и 9,5–10,7 кг K₂O. Установлено, что в растениях картофеля содержится больше всего калия, меньше азота и еще меньше фосфора. Такое соотношение основных элементов питания наблюдается, как правило, во всех почвенно-климатических условиях и на всех сортах картофеля независимо от агротехнических усло-

вий его выращивания. Картофель – высокопродуктивное растение и выносит с урожаем больше питательных элементов, чем зерновые, лен, многолетние травы, но меньше, чем сахарная и кормовая свекла.

Наиболее интенсивно растения картофеля потребляют в фазах бутонизация – цветение. Среднепоздние сорта в этот период усваивают около 40–50 % азота, 50 % фосфора и 60 % калия от максимального потребления. Это происходит на протяжении месяца (июль в наших условиях). К уборке в клубнях сосредотачивается 78–80 % азота, 90 % фосфора и 96 % калия от содержания его в урожае.

Картофель является культурой, весьма требовательной к почвенным условиям, что определяется его физиологическими особенностями: слаборазвитой корневой системой и ее высокой потребностью в кислороде в период интенсивного клубнеобразования. Система удобрения картофеля должна обеспечивать не только высокую урожайность, но и хорошее качество клубней, сбалансированных по химическому составу, с низким содержанием нитратов.

Для картофеля наиболее подходят структурированные, плодородные, водопроницаемые, легкого или среднего гранулометрического состава (с содержанием физической глины от 10 до 40 %), достаточно прогреваемые почвы. Оптимальный уровень плотности среднесуглинистых почв – 1,0–1,2 г/см³, супесчаных – 1,3–1,4 г/см³. При плотности среднесуглинистой почвы 1,4 г/см³ урожайность снижается на 35–40 %. Плотность почвы определяет не только урожайность, но и товарный вид картофеля – величину, форму и сохранность клубней.

Поля должны быть выровнены (допускается угол склона до 3°), не завалунены, удаленность от хозяйственных центров и населенных пунктов не должна превышать 3 км.

Картофель хорошо переносит повышенную кислотность почвы. Оптимальной для него является кислотность в интервале pH (в KCl) от 5,3 до 5,8. В связи с интенсивным известкованием кислых почв картофель необходимо возделывать в специальных севооборотах, в которых pH почвы не превышает указанные значения. Стабильные урожаи клубней на уровне 350–400 ц/га обеспечиваются при строгом соблюдении всех технологических операций на почвах с содержанием гумуса 2,0–3,0 %, фосфора – 250–300 мг, калия – 200–250 мг в кг почвы. Высокое содержание гумуса способствует большему накоплению крахмала в клубнях картофеля.

Основным условием эффективного возделывания картофеля является совместное применение органических и минеральных удобрений.

Для получения урожайности 300 и более центнеров с гектара на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемых мореной, почвах требуется вносить 55–75 т/га, на супесчаных, подстилаемых песками, – 60–80 т/га органических удобрений. На всех почвах органические удобрения под среднеспелые, среднепоздние и поздние сорта картофеля необходимо вносить с осени под зяблевую вспашку или по зяби с заделкой в почву культиватором, на легких почвах (супесчаные, на песках) – весной. Весеннее внесение органических удобрений на суглинистых почвах приводит к задержке весенне-полевых работ, переуплотнению почвы и существенному недобору урожая.

Обязательными требованиями являются равномерное распределение органических удобрений по поверхности поля и быстрая заделка их в почву. В зависимости от запасов элементов питания и уровня планируемой урожайности рекомендуются следующие дозы минеральных удобрений (табл. 46, прил. 64).

Таблица 46. Дозы минеральных удобрений* под картофель на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемый урожай (клубни), ц/га | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 200–250 | 251–300 | 301–350 | 351–400 |
| Азотные | – | 60–70 | 70–85 | 85–100 | 100–120 |
| Фосфорные | Менее 100 | 70–80 | × | × | × |
| | 101–150 | 50–60 | 60–70 | × | × |
| | 151–200 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 |
| | 201–300 | 25–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |
| | 301–400 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–40 |
| Калийные | Менее 80 | 80–100 | × | × | × |
| | 81–140 | 60–80 | 80–100 | × | × |
| | 141–200 | 50–60 | 60–80 | 80–100 | 100–120 |
| | 201–300 | 40–50 | 50–60 | 60–80 | 80–100 |
| | 301–400 | 30–35 | 35–40 | 40–50 | 50–60 |

* На фоне внесения 50–60 т/га органических удобрений.

Максимально допустимой дозой азотных удобрений при внесении 60–70 т/га органических удобрений являются 120 кг/га д. в.

Предельно допустимые дозы азота для раннеспелых и среднеранних сортов картофеля – 110–120, среднеспелых – 100–110, среднепоздних и позднеспелых – 80–90 кг/га д.в. Дозы азота для всех сортов семенного картофеля – 60–90 кг/га.

Институтом почвоведения и агрохимии разработано комплексное удобрение для картофеля с содержанием азота, фосфора и калия 16–12–20 с серой и микроэлементами – бором и медью, в котором все элементы питания сбалансированы с учетом биологических требований культуры.

При отсутствии комплексных удобрений применяются простые формы минеральных удобрений: сульфат аммония, аммофос, хлористый калий.

Азотные удобрения лучше вносить весной в один прием под перепахку зяби или культивацию. На супесчаных, подстилаемых песками, почвах возможна подкормка азотом (20–30 кг/га) в первую междурядную обработку при высоте куста 15–20 см.

Фосфорные удобрения вносят как осенью, так и весной. Обязательным приемом должно быть внесение 20–30 кг/га P_2O_5 в рядки при посадке или полного минерального удобрения $N_{20-30}P_{20-30}K_{20-30}$. Хлорсодержащие калийные удобрения на почвах связного гранулометрического состава рекомендуется вносить осенью под вспашку или весной под культивацию, на почвах легкого гранулометрического состава – только весной.

На почвах 1-й и 2-й группы обеспеченности рекомендуется при планировании высоких урожаев картофеля эффективно применять микроэлементы бор, медь, марганец в начале бутонизации в дозе по 50 г/га д. в. Наряду с борной кислотой, сернокислой медью и сернокислым марганцем можно использовать Адоб бор – 0,5 л/га, Адоб медь – 0,8, Адоб марганец – 0,3 или Эколист медь – 0,6, Эколист марганец – 0,3 л/га. Расход рабочего раствора – 200 л/га. Некорневые подкормки микроэлементами можно совмещать с применением инсектицидов против колорадского жука.

6.11. Озимый и яровой рапс

Яровой и озимый рапс в республике возделывается на площади 300 тыс. га, что составляет 6,3 % в структуре посевных площадей. Окупаемость 1 кг минеральных удобрений (NPK) при возделывании рапса составляет 3,2 кг маслосемян.

Особенности питания. Как озимый, так и яровой рапс предъявляют повышенные требования к плодородию почв, особенно к азотному режиму.

Наиболее пригодными для посева озимого рапса являются плодородные дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые почвы, подстилаемые моренным суглинком с pH_{KCl} 6,0–6,5. Малопригодны торфяно-болотные почвы из-за возможного поражения корневой системы растений, песчаные – вследствие низкой влагоемкости, а также почвы с близким расположением грунтовых вод.

Рапс яровой хорошо растет на среднесуглинистых и супесчаных почвах, а также можно возделывать данную культуру на мелиорированных землях и торфяниках. Непригодны для возделывания ярового рапса легкие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод, подстилаемые плотными водонепроницаемыми породами, а также почвы с кислой реакцией среды.

Оптимальные агрохимические показатели почвы: pH_{KCl} – 6,0–6,5, содержание гумуса – не менее 1,8 %, подвижных форм P_2O_5 и K_2O – не менее 150 мг/кг.

Для успешной перезимовки посевы озимого рапса следует размещать преимущественно на северных, восточных и северо-восточных склонах, т. е. там, где ниже среднесуточный перепад температур.

Рапс – культура, потребляющая значительное количество азота. С 1 т семян и соответствующим количеством соломы озимый рапс в среднем выносит 54–62 кг азота, 24–34 – фосфора и 35–40 кг калия, яровой – 55–58 кг азота, 20–24 кг фосфора и 46–53 кг калия, т. е. озимый рапс потребляет немного больше азота и калия, чем яровой.

На ранних стадиях развития (фаза листообразования) озимый рапс от ярового отличается более растянутым периодом поглощения элементов питания и более высокой интенсивностью потребления элементов питания. В дальнейшем динамика поглощения питательных веществ рапсом яровым и озимым имеет одинаковый характер: потребление элементов продолжается до созревания семян, максимальный период поглощения азота, фосфора и калия наблюдается в период стеблевания-бутонизация. К фазе бутонизации рапс озимый и яровой потребляют 65–76 % основных элементов питания.

Рапс характеризуется повышенным требованием к обеспеченности почв микроэлементами, особенно бором, марганцем и цинком, потребность в которых возрастает на известкованных почвах. Доступность микроэлементов для рапса снижается в сухие годы, а также при холодной погоде, избыточном фосфорном и азотном питании.

Система удобрения озимого рапса минеральная, двучленная: основное удобрение и подкормка.

Органические удобрения в виде навоза или компоста (20–30 т/га) на песчаных и бедных гумусом почвах рекомендуется вносить под предшественник. Рапс хорошо использует их последствие. Дозы внесения минеральных удобрений для озимого рапса рассчитывают с учетом уровня планируемой урожайности и содержания элементов питания представлены в табл. 47, прил. 64.

Таблица 47. Дозы минеральных удобрений под озимый рапс на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Планируемая урожайность (семена), ц/га | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 20,1–25,0 | 25,1–30,0 | 30,1–35,0 | 35,1–40,0 |
| Азотные | – | 80–100 | 100–120 | 120–160 | 160–180 |
| Фосфорные | Менее 100 | 75–90 | × | × | × |
| | 101–150 | 65–80 | 80–95 | × | × |
| | 151–200 | 50–65 | 65–80 | 80–95 | 95–110 |
| | 201–300 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 |
| | 301–400 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 |
| Калийные | 201–300 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 |
| | 301–400 | 20–30 | 30–40 | 40–45 | 45–50 |

Полную дозу фосфорных и калийных удобрений лучше вносить после уборки предшественника под основную обработку почвы с соблюдением приемов, направленных против переуплотнения почвы. Кроме того, для снижения потерь калия от вымывания на почвах с легким гранулометрическим составом целесообразно вносить 60–70 % расчетной дозы калия осенью, а остальную часть – рано весной, причем оптимальной формой калийных удобрений для данной подкормки является сульфат калия.

Азотные удобрения, как правило, применяются после перезимовки озимого рапса в два приема. Только в исключительных случаях азот (не более 30 кг/га) вносят осенью (плохой предшественник, в качестве органического удобрения использовалась солома, низкое плодородие почвы). Чтобы внесение под посев культуры азота, фосфора и калия было сбалансированным, лучше всего применять комплексные удобрения. На почвах:

- с низкой и средней степенью обеспеченности подвижными формами фосфора и калия N:P:K 5-6:18-20:30-35, 5:16:35 + S + гидрогумат, 5:16:35 + S + феномелан, 5:16:35 + S + эпин;

- с повышенным и высоким содержанием фосфора и калия – N:PK – 7-8:16-18:25-31, 7:16-18:25-31 + S + B, 7:16-18:25-31 + S + B + Mn,

7:16-18:25-31 + S + B + Mn + эпин. Подобные комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения разработаны РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» совместно с ОАО «Гомельский химический завод».

Азотные удобрения следует вносить в подкормки. *Первую* – в дозе $N_{110-120}$ – во время возобновления весенней вегетации. Лучшими формами азотных удобрений являются аммиачная селитра, КАС, карбамид. В годы с ранней весной в первую подкормку следует вносить 40–60 кг/га азота, а остальную дозу внести в фазе бутонизации. В этом случае возврат весенних заморозков не окажет губительного действия на растения рапса. Также следует учесть, что в первую очередь следует подкармливать ослабленные посевы и посевы, расположенные на легких почвах.

Вторую подкормку (N_{40-60}) проводят в фазе стеблевания (примерно через 2–2,5 недели после первой) – аммонийной селитрой, КАС, карбамидом. Во вторую подкормку озимого рапса нельзя использовать сульфат аммония, так как это может вызвать ожоги растений. В случае использования сульфата аммония необходимо обратить особое внимание на содержание серы в почве. Так, данное удобрение целесообразно использовать на почвах с низким содержанием обменной серы (менее 6,0 мг/кг почвы). На почвах с более высоким ее содержанием внесение сульфата аммония может приводить к повышению содержания глюкозинолатов в маслосеменах.

При внесении КАС доза азота не должна превышать 30 кг/га. КАС необходимо разбавить водой в соотношении 1:3. При этом в раствор можно ввести микроэлементы и инсектициды. Подкормку проводить в утреннее или вечернее время.

При недостаточном внесении азота в первые две подкормки можно провести и *третью* – спустя 1–1,5 недели в фазе бутонизации **до начала цветения**. В этом случае используют 5–10%-ный раствор карбамида, КАС или ЖКУ, содержащее N, Mn, S, B, Mo. При слабом развитии растений или при густоте стояния растений менее 40 шт/м² дозу азота следует повысить на 20–40 кг/га.

Растворы карбамида и жидкие комплексные удобрения необходимо применять совместно со средствами защиты, когда сроки борьбы против большинства вредителей и некорневой подкормки совпадают. Совместное проведение мероприятий по защите растений и некорневых подкормок уменьшает количество проходов сельскохозяйственной

техники, тем самым снижает переуплотнение почвы и угнетение растений и существенно уменьшает затраты на возделывание культуры.

При возделывании озимого рапса на маслосемена обязательным условием является проведение некорневых подкормок бором, марганцем, молибденом и магнием. Так, в осенний период (в фазе 3–5 листьев) целесообразно проведение первой некорневой подкормки бором в дозе 30–50 г/га, вторая некорневая подкормка проводится в весенний период (в фазе бутонизации) – бор 50–70 г/га, марганец – 50–100 г/га, молибден – 30–40 г/га, магний – 50–100 г/га. Также микроэлементы рекомендуется вводить при инкрустации семян – В – 200 г, Мп – 300 г/т семян, так как подвижность данных микроэлементов при известковании почв снижается.

В качестве микроудобрений можно использовать минеральные соли и хелатные или органо-минеральные соединения, производимые различными производителями (Адоб Мп, Адоб В, МикроСтим бор, МикроСил бор и др.). Технологическая схема применения макро- и микроудобрений в технологии возделывания озимого рапса, разработанная РУП «Институт почвоведения и агрохимии», приведена в табл. 48.

Таблица 48. Технологическая схема применения удобрений при возделывании озимого рапса (урожайность 40–50 ц/га)

| Дозы удобрений, кг/га д. в. | Формы удобрений | Сроки применения |
|----------------------------------|---|---|
| $N_{20-24}P_{80-100}K_{120-150}$ | Аммофос, хлористый калий | До посева |
| $N_{100-120}$ | КАС или сульфат аммония | Весной в начале вегетации |
| N_{50-60} | Мочевина | Через 2–2,5 недели после первой |
| $B_{0,20}Mn_{0,05}$ | Борная кислота (Солюбор ДФ) и сульфат марганца или Адоб бор и Адоб марганец или МикроСтим бор или МикроСил бор | Некорневые подкормки: Осень: в фазе 4–6 листьев Весна: 1-я – в фазе стеблевания 2-я – перед цветением в баковой смеси с инсектицидом и добавлением мочевины – 12 кг на 200 л рабочего раствора |

Основным условием получения высоких урожаев семян ярового рапса является рациональное внесение минеральных удобрений и оп-

тимальное значение pH 5,8–6,5. Система удобрения ярового рапса включает основное внесение удобрений и подкормку.

Органические удобрения целесообразно вносить под предшественник рапса. Фосфорные и калийные удобрения на связных почвах вносят осенью при основной обработке, на легких почвах – в предпосевную культивацию. В качестве фосфорных удобрений можно использовать комплексные удобрения аммофос, аммонизированный суперфосфат, из калийных – хлористый калий.

Дозы фосфорных и калийных удобрений представлены в табл. 49, 50 и прил. 64.

Таблица 49. Дозы фосфорных удобрений под яровой рапс на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на моренных суглинках, кг/га д. в.

| Предшественник | Содержание в почве подвижной формы P_2O_5 , мг/кг | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | менее 100 | 101–150 | 151–200 | 201–300 | 301–400 |
| Картофель, кукуруза (50 т/га навоза) | 65–80 | 55–65 | 45–55 | 30–35 | 15 |
| Озимые зерновые (20 т/га навоза) | 70–85 | 60–70 | 50–60 | 35–40 | 20 |
| Зерновые, зернобобовые, многолетние и однолетние травы | 75–90 | 65–75 | 55–65 | 40–45 | 25 |

Таблица 50. Дозы калийных удобрений под яровой рапс на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на моренных суглинках, кг/га д. в.

| Предшественник | Содержание в почве подвижной формы K_2O , мг/кг | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | менее 80 | 81–140 | 141–200 | 201–300 | 301–400 |
| Картофель, кукуруза (50 т/га навоза) | 95–110 | 85–105 | 75–85 | 45–55 | 0–25 |
| Озимые зерновые (20 т/га навоза) | 110–125 | 100–120 | 90–100 | 60–70 | 35 |
| Зерновые, зернобобовые, многолетние и однолетние травы | 120–135 | 110–130 | 100–110 | 70–80 | 45 |

С экологической точки зрения, учитывая высокую подвижность азотных удобрений, их внесение следует проводить весной под предпосевную обработку почвы.

Азот под рапс яровой при расчетной дозе более 90 кг/га следует вносить дробно: до посева в виде КАС, мочевины или аммонийной селитры (50 % расчетной дозы) и подкормки. Недостаточное внесение в основное удобрение азота можно компенсировать двукратными внекорневыми подкормками (5–10 % раствором карбамида или раствором КАС), но не заменить основное внесение азотных удобрений. При

этом необходимо строго соблюдать концентрацию раствора и не проводить обработку в фазе цветения рапса. Первая подкормка – фаза 4–6 листьев (30 % расчетной дозы) в виде сульфата аммония, мочевины или аммонийной селитры. Вторая подкормка – фаза бутонизации (20 % расчетной дозы) в виде КАС (обязательно с разведением) одновременно с внесением микроэлементов и инсектицидной обработкой от рапсового цветоеда, с нормой расхода баковой смеси 300 л/га.

Исследования, проведенные кафедрой агрохимии, почвоведения и сельскохозяйственной экологии УО ГГАУ, показали, что с агрономической, энергетической и экономической точек зрения внесение азотных удобрений в дозах более 150 кг/га д.в. неэффективно, так как абсолютные величины прироста урожая при этом снижаются.

При известковании кислых почв происходит уменьшение подвижности многих микроэлементов. В наибольшей степени это относится к бору и марганцу, что требует обязательного дополнительного их внесения на почвах с рН, близкой к нейтральной, или после известкования. Снижение доступности микроэлементов может проявляться также на почвах легкого гранулометрического состава, особенно в засушливые годы. В связи с этим на дерново-подзолистых почвах рекомендуется использовать в виде некорневой подкормки, начиная с фазы 6–8 листьев и заканчивая фазой бутонизации: бор 50–70 г/га, марганец – 50–100 г/га, молибден – 30–40 г/га, магний – 50–100 г/га в виде солей металлов или с использованием микроудобрений, содержащих металлы в хелатной форме.

Однако наиболее оптимальным сроком внесения микроудобрений является фаза бутонизации, которая длится, в зависимости от погодных условий, около месяца. Использование микроудобрений следует совмещать с применением инсектицидов против рапсового цветоеда и скрытнохоботника.

6.12. Однолетние травы и многолетние травы

Однолетние травы

Однолетние травы в республике ежегодно высеваются на площади более 300 тыс.га. Они используются для получения зеленого корма, силоса, сенажа или семян. В группу однолетних трав входят бобовые (сераделла, горох, вика, люпин), капустные (рапс яровой, рапс озимый, горчица, редька масличная, сурепица озимая), злаковые (райграс одно-

летний). Все указанные культуры высеваются в чистых (кроме вики и гороха) и смешанных посевах (табл. 51, прил. 64).

Таблица 51. Однолетние травы

| Злаковые | Бобовые | Капустные | Смешанные посевы |
|--------------------|-------------------------------|---|---|
| Райграс однолетний | Сераделла, люпин, горох, вика | Рапс яровой, рапс озимый, сурепица озимая, редька масличная | Люпин + овес, горох + овес, вика + овес, вика + рапс яровой, редька масличная + овес, рапс озимый + райграс однолетний + сераделла, люпин + горох + райграс однолетний, горох + овес + райграс однолетний |

Однолетние травы в севообороте могут использоваться как основная или как промежуточная культура.

Для однолетних трав наиболее пригодны суглинистые, супесчаные и песчаные, подстилаемые мореной, а также торфяные почвы.

Средний вынос элементов питания с 1 т зеленой массы однолетних трав представлен в табл. 52. Бобовые травы отличаются максимальным выносом азота, капустные и злаковые – максимальным выносом калия.

Таблица 52. Средний вынос элементов питания однолетними травами

| Вид однолетних трав | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | кг/т зеленой массы | | |
| Бобовые | 4,8 | 1,3 | 3,9 |
| Бобово-злаковые | 4,5 | 1,3 | 4,3 |
| Капустные | 4,4 | 0,9 | 5,0 |
| Райграс однолетний | 3,9 | 1,7 | 9,2 |

Дозы минеральных удобрений зависят от возделываемой культуры, планируемой урожайности, типа почв и их окультуренности (табл. 53, прил. 64, 65).

Таблица 53. Дозы минеральных удобрений под однолетние травы

| Группа однолетних трав | Доза NPK, кг/га |
|--------------------------------------|---|
| Дерново-подзолистые почвы | |
| Капустные злаковые | N ₉₀₋₁₁₀ P ₄₀₋₅₀ K ₈₀₋₁₂₀ |
| Злаковые (райграс однолетний) | N ₁₀₀₋₁₁₀ P ₄₀₋₅₀ K ₈₀₋₁₂₀ |
| Бобово-злаковые | N ₆₀₋₈₀ P ₃₀₋₄₀ K ₆₀₋₈₀ |
| Бобовые | P ₄₀₋₅₀ K ₈₀₋₁₀₀ |
| Торфяные почвы | |
| Капустные, злаковые, бобово-злаковые | N ₂₀₋₄₀ P ₃₀₋₄₀ K ₇₀₋₁₀₀ |

Оптимальная доза азота азотных удобрений под бобово-злаковые смеси составляет 60–80 кг/га. Увеличение дозы азота не приводит к росту продуктивности и ухудшает качество корма. Поскольку бобово-злаковые травосмеси являются хорошим предшественником под озимые зерновые культуры, то под них рекомендуется внесение органических удобрений в дозах 30–40 т/га.

При возделывании райграса однолетнего в чистом виде оптимальная доза азотных удобрений составляет 100–110 кг/га д. в. Для капустных культур рекомендуется внесение 90–100 кг/га азота. Под однолетние бобовые травы азотные удобрения не вносятся.

На торфяных почвах под все однолетние травы рекомендуется применять $N_{20-40}P_{30-40}K_{70-100}$. На деградированных торфяниках доза минерального азота увеличивается до 40–60 кг/га.

Азотные, фосфорные и калийные удобрения вносят в основной прием под предпосевную культивацию.

Многолетние травы

В Республике Беларусь возделывают многолетние бобовые травы (клевер, люцерна посевная, галега восточная (козлятник), донник, лядвенец рогатый), многолетние злаковые травы (тимopheевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, лисохвост луговой, мятлик луговой, кострец безостый, райграс пастбищный, полевица белая, двукосточник) и многолетние бобово-злаковые травы.

В полевых и кормовых севооборотах многолетние травы возделываются в чистом виде либо в смеси бобовых со злаковыми. Эффективнее их возделывать в чистом виде, что позволяет более рационально использовать минеральные удобрения на злаковых травах и потенциал симбиотической азотфиксации бобовых трав. На постоянных участках может возделываться люцерна в течение 5–6 лет и галега (до 10 лет).

Бобовые многолетние травы отличаются способностью использовать азот из воздуха в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Коэффициент азотфиксации у этих культур составляет 60–70 %. В связи с этим бобовые многолетние травы не нуждаются в азоте.

Они требуют окультуренных почв с оптимальным содержанием питательных веществ и хорошими водно-физическими свойствами почв. Условием получения высокой урожайности клевера является pH_{KCl} почвенной среды – 6,0–7,0, люцерны – 6,5–7,0.

Многолетние бобовые травы отличаются большим выносом калия. На формирование 1 т сена они расходуют 23,4 кг азота, 5,1 кг фосфора, 27,2 кг калия.

Наиболее интенсивно усвоение элементов питания у многолетних бобовых трав происходит в фазы бутонизации и цветения. В первые годы жизни бобовым травам необходим фосфор в легкодоступной форме. Они требовательны к микроэлементам: бору, молибдену и меди.

Перспективными высокопродуктивными многолетними бобовыми культурами для кормопроизводства республики являются лядвенец рогатый, галега восточная, донник белый. Лядвенец рогатый не требователен к плодородию почвы, устойчив к повышенной кислотности почв, оптимально ($\text{pH}_{\text{КСИ}}$ 4,5–7,5). Галега восточная отличается высоким (до 10 лет) продуктивным долголетием. Она хорошо растет на всех почвах (кроме заболоченных и песчаных, развивающихся на песках), требует известкования при $\text{pH}_{\text{КСИ}}$ менее 5,5. Донник белый – двулетнее, засухоустойчивое растение. Он произрастает на всех типах почв (кроме тяжелых переувлажненных и кислых почвах $\text{pH}_{\text{КСИ}} < 5,8$).

Многолетние злаковые травы менее требовательны к почвенным условиям. Они лучше переносят повышенную кислотность, однако на известкованных почвах они дают большую урожайность.

Удобрение клевера лугового. Известкование почвы под клевер проводят полной дозой и по возможности за год или за 2 года до его посева.

Клевер, как правило, высевают под покров ячменя, однолетних трав, озимой ржи. Клевер луговой положительно реагирует на применение органических удобрений под предшественник. При внесении под покровную зерновую культуру 30–40 т/га навоза клевер быстрее растет в начальный период, повышается надежность его сохранения под покровом и в период зимовки.

Под покровную культуру рекомендуется вносить не более 60 кг азота. При больших дозах азота наблюдается угнетение клевера зерновыми покровными культурами, что отрицательно отражается на сохранности всходов и последующей продуктивности всходов.

Главным критерием определения доз фосфорных и калийных удобрений клевера являются данные по содержанию подвижных форм фосфора и калия в почве и планируемой урожайности клевера (табл. 54, прил. 64). Фосфорные удобрения можно вносить в запас или весной после перезимовки (1 год пользования) в начале возобновления весенней вегетации. Для калия предпочтительнее также весенние подкормки.

Таблица 54. Дозы минеральных удобрений под многолетние травы на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах

| Удоб- рения, кг/га д. в. | Содер- жание Р ₂ O ₅ и K ₂ O, мг/кг почвы | Бобовые травы* (зеленая масса) | | | Злаковые травы ** (сено) | | | Бобово-злаковые травы (сено) | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| | | Планируемая урожайность (семена), ц/га | | | | | | | | |
| | | 200– 300 | 301– 400 | 401– 500 | 40–60 | 61–80 | 81–100 | 40–60 | 61–80 | 81–100 |
| Азот- ные | – | – | – | – | 80–100 | 110– 130 | 130– 150 | 50–60 | 60–70 | 70–90 |
| Фос- форные | Менее 100 | 70–100 | × | × | 70–100 | × | × | 70–100 | × | × |
| | 101–150 | 60–80 | × | × | 60–80 | × | × | 60–80 | × | × |
| | 151–200 | 50–70 | 70–90 | × | 50–70 | 70–90 | × | 50–70 | 70–90 | × |
| | 201–300 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 40–50 | 50–60 | 60–70 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | – | 20–30 | 30–40 | – | 20–30 | 30–40 |
| Калий- ные | Менее 80 | 120– 150 | × | × | 120– 150 | × | × | 120– 150 | × | × |
| | 81–140 | 110– 140 | × | × | 110– 140 | × | × | 110– 140 | × | × |
| | 141–200 | 100– 120 | 120– 140 | – | 100– 120 | 120– 140 | × | 100– 120 | 120– 140 | × |
| | 201–300 | 70–100 | 100– 120 | 120– 140 | 70–100 | 100– 120 | 120– 140 | 70–100 | 100– 120– | 120– 140 |
| | 301–400 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 30–40 | 40–50 | 50–60 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |

* Клевер, люцерна, галега восточная (козлятник), донник, лядвинец рогатый; ** тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница, листовост луговой, мятлик, кострец безостый, райграс пастбищный, полевица, двухкосточник.

Если дозы калия выше 90 кг/га, то их лучше применять дробно под укосы, что обеспечит эффективное использование растениями и снизит потери калия из почвы. В случае, когда растения клевера лугового вышли из-под покрова ослабленные, в первый год его жизни необходима подкормка фосфором и калием. Фосфорные и калийные удобрения способствуют накоплению сахаров в корневых клетках растений клевера и тем самым уменьшают выпадение клевера во время зимовки. Оптимальной дозой удобрения в зависимости от уровня плодородия почвы в подкормку клевера осенью, после уборки покровной культуры, является P_{30–60}K_{50–90}.

На почвах 1-й и 2-й групп обеспеченности бором и молибденом клевер нуждается в борных и молибденовых удобрениях, которые можно внести в некорневую подкормку в фазе бутонизации клевера в дозе 50 г/га бора и 25–50 г/га молибдена. Предпочтительнее с точки

зрения энергосбережения предпосевная обработка семян молибдатом аммония в дозе 20 г д. в./ц семян и борной кислотой в дозе 30–50 г д. в./ц семян.

Важным компонентом современной технологии возделывания бобовых многолетних трав являются инокуляция семян перед посевом и применением регуляторов роста растений. Для увеличения азотфиксации семена бобовых трав обрабатывают Сапронитом в дозе 1 л/т семян. Регуляторы роста рекомендуется применять в фазе начала стеблевания клевера из расчета 350 г/га квартазина или 50 мл/га эпина. Прибавка урожая зеленой массы клевера от регуляторов роста составляет 2,5–6,3 т/га, от Сапронита – 5,6–7,2 т/га.

Удобрение люцерны. Люцерна более, чем клевер, требовательна и отзывчива как на общее плодородие почв, так и на обеспеченность их фосфором и калием. Содержание подвижного фосфора и калия должно быть не менее 150 мг/кг почвы. Эта культура высевается под покров и беспокровно.

При беспокровном посеве органические удобрения вносятся непосредственно под люцерну, при использовании покровного посева их применяют в дозах 30–40 т/га под зерновые покровные культуры.

При возделывании люцерны без покрова фосфорные и калийные удобрения вносят в основной прием до посева и в подкормку. Припосевное внесение фосфора в дозе 15 кг/га повышает урожайность и устойчивость люцерны к неблагоприятным условиям. При ежегодном использовании люцерны фосфорные и калийные удобрения вносятся весной в начале возобновления вегетации.

Применение микроудобрений, Сапронита и регуляторов роста растений под люцерну проводится так же, как и на клевере.

Удобрение галеги восточной, лядвенца рогатого, донника белого аналогично системе удобрения клевера лугового и люцерны. Под эти культуры не применяют азотные удобрения. Как исключение, под галегу восточную в первый год жизни (при беспокровном возделывании) допускается внесение азота в подкормку в дозе 30–60 кг/га, если под предшественник или непосредственно под саму культуру не применялись органические удобрения. Дозы фосфорных и калийных удобрений под эти культуры представлены в табл. 54.

Удобрение бобово-злаковых трав отличается от одновидовых травостоев бобовых трав тем, что необходимость внесения азота, а также его дозы зависят от долевого участия бобового компонента. Если долевое участие бобового компонента превышает 30 % (40 растений на

1 м²), то азотные удобрения не дают эффекта и применение их становится нецелесообразным.

При снижении участия бобовых трав в травостое азот в подкормку оправдан. Для поддержания доли бобового компонента в бобово-злаковом травостое азотные удобрения целесообразно вносить только под второй укос. В смешанных посевах бобово-злаковых трав рекомендуется вносить азот дробно под укосы в дозах (от 25 до 45 кг/га) в зависимости от планируемой урожайности.

Фосфорные и калийные удобрения применяются в один прием рано весной в период возобновления вегетации.

Удобрение злаковых трав. Органические удобрения под злаковые травы вносятся так же, как и под бобовые. Многолетние злаковые травы требуют внесения полного минерального удобрения. Фосфорные и калийные удобрения вносят в подкормку весной в начале возобновления вегетации растений, азотные – дробно под укосы. Под первый укос многолетних злаковых трав (весной в начале возобновления вегетации) применяют 2/3 от общей дозы азота и 1/3 дозы – под второй. Доза под второй укос составляет 30–40 кг/га.

Формы калийных и фосфорных удобрений могут быть любые. В качестве азотных лучше использовать КАС. Во избежание ожогов растений под второй укос КАС вносят сразу после скашивания первого.

Микроудобрения – сульфат меди, сульфат цинка можно внести при обработке семян в дозах 200–250 г/ц семян.

При возделывании многолетних трав на семенные цели (первый укос убирается на зеленую массу, второй – на семена) обязательно вносить органические удобрения (под покровную культуру или предшественник), проводить известкование и применять микроэлементы. Дозы микроудобрений для некорневой подкормки семенных посевов многолетних трав представлены в табл. 55.

Таблица 55. Дозы и сроки применения некорневых подкормок микроудобрениями многолетних трав

| Рекомендуемые дозы, г/га | Микроудобрения | Доза, г/га | Сроки применения |
|--|------------------|------------|------------------------|
| Семенники многолетних бобовых трав | | | |
| B ₅₀ Mo _{25–50} | Борная кислота | 300 | Бутонизация |
| | Молибдат аммония | 50–100 | |
| Семенники многолетних злаковых трав | | | |
| Cu _{50–100} Mn ₅₀ | Сульфат меди | 200–400 | Начало выхода в трубку |

6.13. Овощные культуры

Почвенно-климатические условия и особенности питания отдельных овощных культур имеют большое значение для разработки системы удобрений в овощеводческих хозяйствах.

Капустные растения. Овощные культуры капустной группы, к которым относятся капуста белокочанная ранних, средних, среднепоздних и поздних сортов, капуста краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби, имеют много общего в требованиях к условиям почвенного питания, но в то же время и существенно различаются между собой.

Капуста белокочанная потребляет большое количество питательных веществ и предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Если в первый месяц после высадки рассады она потребляет 7–10 % питательных элементов от общей потребности, то во время формирования листового аппарата и завязывания кочана (продолжается 40–50 дней) капуста поглощает основную (более 80 %) часть их.

По данным З. И. Журбицкого, вынос элементов питания капустой зависит от структуры урожая. При колебании содержания кочанов в урожае от 50 до 70 % потребление азота и фосфора на 100 ц кочанов различается в 1,5–2 раза. При нормальном соотношении товарной и нетоварной продукции (70 % кочанов в общей массе урожая) на 100 ц образования кочанов требуется 30–35 кг N, 12 кг P_2O_5 и 40–45 кг K_2O . Причем на 100 ц кочанов ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта потребляют примерно одинаковое количество азота, фосфора и калия.

Раннюю капусту лучше размещать на окультуренных дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах. Торфяники и заливаемые тяжелосуглинистые пойменные почвы для нее непригодны.

Среднепоздняя и поздняя капуста характеризуется очень высоким потреблением питательных веществ в течение длительного времени, поэтому она требует обильного удобрения на протяжении всего периода вегетации. Поздняя капуста потребляет много влаги, поэтому хорошо растет на суглинистых пойменных почвах и низинных торфяниках с хорошим увлажнением, а на легких почвах она может давать удовлетворительные урожаи только при орошении.

Капуста хорошо растет на почвах со слабокислой и нейтральной реакцией (рН 6,5–7,0). На кислых почвах капуста поражается килой. Причем ранняя капуста поражается более сильно, чем поздняя. Поэтому под капусту кислые почвы необходимо известковать. В сево-

оборотах с капустой нормы известковых удобрений увеличивают на 30 %. Известкование почвы при возделывании ранней капусты производят под предшественник.

Общие дозы удобрений под капусту в зависимости от типа почвы и обеспеченности питательными веществами и уровня планируемого урожая приведены в прил. 34. Ранняя капуста хорошо реагирует на внесение органических удобрений с осени. Под капусту средних, среднепоздних и поздних сортов навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят с осени или весной под перепашку ночвы. Азотные удобрения применяют незадолго перед высадкой рассады. Во избежание накопления нитратов общая доза азота под ранние сорта не должна превышать 135, а под среднепоздние и поздние сорта – 150 кг/га. Местное внесение при посадке по 15 кг NPK на 1 га в виде сложных удобрений (нитроаммофоска, нитрофоска и др.) позволяет дополнительно получить до 50 ц кочанов.

Одну–две подкормки средне- и позднеспелых сортов капусты (прил. 35) проводят перед формированием кочана при планировании высоких урожаев.

Под капусту из азотных удобрений применяют сульфат аммония, мочевины, аммиачную селитру, фосфорных – аммофос, суперфосфаты, калийных – хлористый калий и другие формы однокомпонентных и комплексных удобрений. Как и другие культуры семейства капустовых, капуста хорошо отзывается на серосодержащие удобрения.

Капуста цветная имеет высокую питательную ценность. Урожай этой культуры можно получать круглый год. Цветная капуста очень требовательна к условиям почвенного плодородия и минеральному питанию. Наиболее пригодными для нее являются окультуренные участки преимущественно легкого гранулометрического состава (супеси и легкие суглинки) с высоким содержанием органического вещества. На богатых азотом низинных торфяниках и тяжелосуглинистых лугово-болотных пойменных почвах цветная капуста развивает избыточную вегетативную массу, плохо завязывает головку, страдает от молибденового голодания.

Цветная капуста сильнее, чем белокочанная, поражается килой и ее целесообразно выращивать на нейтральных почвах. Известь следует вносить под предшественники или с осени. Непосредственное внесение больших доз извести может вызывать резкий недостаток бора и снизить урожай.

При недостатке молибдена на некоторых почвах цветная капуста не

образует соцветий, или они быстро рассыпаются. На таких почвах необходимо применять молибденовые удобрения.

Цветная капуста очень требовательна к влаге, и водообеспеченность этой культуры должна быть не ниже 70–80 % от полной влагоемкости. При выращивании рассады цветной капусты обязательный прием – опрыскивание ее в фазе 3–4 настоящих листочков 0,02%-ным раствором молибдата аммония.

Дозы органических и минеральных удобрений под цветную капусту зависят от уровня планируемого урожая и обеспеченности почвы подвижными формами питательных веществ (прил. 34). При высадке рассады вносят $N_{10}P_{10}K_{10}$.

Если почвы относятся к 3-й и 4-й группе по обеспеченности подвижными формами питательных веществ, то подкормки не проводят. На менее обеспеченных подвижными формами питательных веществ почвах в период образования 2–3 настоящих листьев проводят подкормку.

Капуста краснокочанная имеет хорошую лежкость кочанов на протяжении всего зимнего и весеннего периода и используется для приготовления салатов. Она отличается большим потреблением питательных веществ. На единицу продукции она потребляет почти в два раза больше питательных веществ, чем белокочанная. При урожайности в 500 ц/га она выносит 300 кг азота, 85 кг P_2O_5 , 350 кг K_2O и 300 кг CaO . Размещают краснокочанную капусту на тех же почвах, что и белокочанную.

Повышенная кислотность снижает урожай краснокочанной капусты. Известкование можно проводить непосредственно под эту культуру. Под краснокочанную капусту ориентировочно вносят 60–80 т/га органических удобрений и $N_{120-150}P_{90-120}K_{120-160}$. Целесообразно часть азотных удобрений вносить в 1–2 подкормки в дозе N_{30-40} .

Кольраби. По биологическим особенностям отличается от других видов капусты тем, что почти не отзывается на органические удобрения и под нее лучше вносить минеральные удобрения.

При урожае 200 ц с 1 га кольраби выносит 100 кг азота, 80 фосфора, 160 кг калия и 60 кг кальция, т. е. она требует несколько меньше питательных веществ, чем другие виды капусты. Под кольраби применяют $N_{90-120}P_{60-90}K_{120-150}$.

Столовые корнеплоды. Корнеплодные овощные растения предъявляют повышенные требования к почвенному плодородию. В первые периоды роста они очень чувствительны к фосфорному питанию. Дос-

таточное обеспечение растений фосфором в начальный период роста способствует усиленному росту корневой системы, что обеспечивает формирование корнеплодов правильной формы высоких товарных и вкусовых качеств.

Во время интенсивного нарастания вегетативной массы большинство столовых корнеплодов (морковь, петрушка, редис, пастернак) требуют умеренного азотного питания, однако некоторые корнеплоды (свекла, сельдерей, хрен) отзывчивы на повышенные дозы азота.

Большинство столовых корнеплодов хорошо используют последствие органических удобрений. Однако сельдерей, хрен и столовая свекла хорошо реагируют на непосредственное внесение органических удобрений.

Морковь столовая – наиболее ценное корнеплодное растение. Эта культура характеризуется холодостойкостью, медленным развитием в первый период роста и развития и затем интенсивным потреблением элементов питания. Морковь лучше удается на окультуренных легкосуглинистых и супесчаных почвах (дерново-подзолистых и пойменных) и низинных торфяниках. Тяжелосуглинистые и глинистые, заплывающие почвы для нее непригодны. На 100 ц корнеплодов выносятся 23 кг азота, 10 кг P_2O_5 и 38 кг K_2O , т. е. на единицу урожая усваивается больше всего калия.

Оптимальная реакция при выращивании моркови – pH 6,0–6,5. Однако непосредственное известкование под нее нежелательно, так как она не переносит избытка кальция. Поэтому известкуют ее под предшественники.

Особенность культуры состоит в том, что она отрицательно реагирует на повышенную концентрацию почвенного раствора в молодом возрасте. Морковь очень хорошо использует последствие органических удобрений. Внесение слабопрепавшего навоза под нее может привести к разветвлению корнеплодов и ухудшению их формы, ухудшает лежкость и товарную ценность продукции. В то же время морковь особенно на недостаточно окультуренных почвах хорошо отзывается на внесение перепревшего навоза

Дозы минеральных удобрений под морковь приведены в прил. 34. Система удобрения моркови складывается из основного удобрения, внесения небольших доз удобрений при посеве (прил. 34, 35). Через две-три недели после появления всходов морковь можно подкормить минеральными удобрениями (прил. 35). Морковь положительно реаги-

рует на натрий. Лучшей формой калийных удобрений для нее является калийная соль.

Свекла столовая – одна из важнейших овощных культур, уступающая по посевным площадям только капусте и моркови. Лучше всего она произрастает на суглинистых дерново-подзолистых и пойменных хорошо окультуренных почвах с реакцией, близкой к нейтральной (рН 6,2–7,5). Известкование можно проводить непосредственно под свеклу. Дозы извести в севооборотах со свеклой увеличивают на 30 %. Свекла лучше других овощных культур переносит повышенную концентрацию солей, вынося к избытку хлора. Для образования 100 ц корнеплодов она потребляет 27 кг азота, 15 кг P_2O_5 и 43 кг K_2O . В урожае соотношение $N:P_2O_5:K_2O$ составляет 1:0,56:1,6, т. е. столовая свекла – культура калиелюбивая. Период поглощения питательных веществ у свеклы растянут.

Свекла хорошо отзывается на внесение перепревшего навоза. Однако применение под нее слаборазложившегося навоза приводит к разветвлению корнеплода, что ухудшает товарные качества и снижает лежкость корнеплода. В севообороте свеклу обычно размещают на второй год после применения органических удобрений.

Система удобрения столовой свеклы складывается из основного (прил. 34), припосевного и подкормок (прил. 35). Под свеклу можно применять две подкормки. Первая подкормка проводится при появлении одного–двух настоящих листьев, вторая – в начале формирования корнеплода.

Во избежание накопления нитратов в продукции общая доза азота под эту культуру не должна превышать 120 кг/га (на торфяниках 40–70 кг), а последняя подкормка должна проводиться не позднее, чем за 1,5–2 месяца до уборки. Столовая свекла хорошо отзывается на натрий, поэтому лучшие формы удобрений для нее, которые содержат натрий (калийная соль, натриевая селитра и др.).

Столовая свекла требовательна к бору. При недостатке бора (особенно после известкования) снижается ее урожайность и может появиться сердцевинная и серая гниль. Это устраняется внесением 1–1,5 кг бора в форме борного суперфосфата и других удобрений. В первую очередь бор вносится на почвах 1-й группы по обеспеченности бором.

Редис – широко распространенная овощная культура. Отличительной его биологической особенностью является короткий вегетационный период. Редис требователен к плодородию почвы и минеральному питанию.

Редис весенних сортов хорошо удается на окультуренных дерново-подзолистых супесчаных, а осенних сортов – хорошо растет и на легкосуглинистых окультуренных почвах. Эта культура хорошо растет на слабокислых и нейтральных почвах (рН в КС1 5,5–7,3). Известкование непосредственно под эту культуру не проводят. Известкование, так же как и обогащение почвы органическими веществами, необходимо проводить под предшественники.

При получении высоких урожаев редиса корневая система за короткий период интенсивно поглощает питательные вещества. Поэтому они в достаточном количестве должны содержаться в почве. Как правило, под предшественники вносятся высокие дозы органических удобрений в сочетании с минеральными.

В первоначальный период развития редис требует усиленного фосфорного питания, поэтому хорошо отзывается на внесение P_{10} в форме гранулированного суперфосфата. Лучшей дозой под редис на дерново-подзолистой почве является $N_{60}P_{90}K_{90}$. Редис требователен к влаге и при отсутствии осадков необходимо проведение орошения.

Тыквенные растения. В Беларуси из тыквенных культур выращивают огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны. Это теплолюбивые растения, хорошо отзываются на органические удобрения. Органические удобрения не только улучшают агрофизические свойства почвы и обеспечивают растения питательными элементами, но и снабжают их углекислым газом, необходимым для этих культур в большом количестве.

Огурцы отличаются относительно невысоким потреблением питательных веществ. На 100 ц товарной продукции растения потребляют 35 кг N, 21 кг P_2O_5 , 44 кг K_2O и 33 кг CaO. Однако огурцы очень требовательны к плодородию почвы. Это связано с коротким вегетационным периодом (40–75 дней в зависимости от сорта), слаборазвитой корневой системой, которая по сравнению с другими культурами хуже использует питательные вещества из удобрений. Отсюда следует, что огурцы надо размещать на высокогумусных окультуренных почвах с обязательным внесением повышенных доз органических удобрений.

Для огурцов наиболее подходящими дерново-подзолистыми почвами являются супесчаные, легко- и среднесуглинистые. Торфяные почвы являются непригодными для выращивания этой культуры.

Огурец – теплолюбивая культура и в Беларуси в открытом грунте дает нестабильные урожаи. В связи с этим его лучше возделывать под временными пленочными укрытиями.

Огурцы чувствительны к кислой реакции и оптимальный интервал для них находится при pH в КС1 6,5–7,0. Однако известкование лучше проводить под предшественники или небольшими дозами непосредственно под эту культуру.

Высокие урожаи огурцов в полевых условиях можно получить при внесении органических удобрений в сочетании с минеральными при хорошем водоснабжении. Огурцы отзывчивы на внесение повышенных доз органических удобрений. Навоз улучшает тепловой режим, усиливает микробиологическую активность почвы, повышает питание огурцов углекислотой, которая хорошо усваивается его стелющимися листьями. Это усиливает фотосинтетические процессы и повышает урожай. Органические удобрения можно использовать непосредственно перед севом, а свежий навоз лучше вносить заранее или с осени.

Огурцы очень чувствительны к концентрации почвенного раствора, и поэтому удобрения лучше применять дробно. Система удобрения этой культуры складывается из основного (прил. 34), припосевного и подкормок (прил. 35). Первую подкормку проводят через 15–20 дней после посадки, вторую – в начале цветения. Под огурцы лучше использовать концентрированные формы удобрений. Во избежание накопления нитратов в продукции доза азота под огурцы не должна превышать 90 кг/га. Отмечено положительное действие на урожай обработки семян огурцов 0,1%-ным раствором бора.

Кабачки и патиссоны широко используются в консервной промышленности. Это культуры большого биологического потенциала, которые в открытом фунте могут давать урожай до 500–700 ц/га. Кабачки и патиссоны по своим требованиям к почвенному плодородию близки к огурцам, но лучше усваивают питательные вещества из почвы и труднорастворимых форм фосфорных удобрений, менее чувствительны к повышенной концентрации солей и требуют более высоких доз удобрений. Для получения высоких урожаев кабачков и патиссонов их целесообразно размещать на одном поле. Система удобрения кабачков и патиссонов состоит из внесения 60–80 т/га навоза на дерново-подзолистых и 50–60 т/га па пойменных почвах, применения минеральных удобрений в дозах $N_{90}P_{90-120}K_{120-150}$. Кабачки и патиссоны отзывчивы на подкормки, особенно азотными удобрениями, поэтому половину удобрений целесообразно внести в одну–две подкормки. Первую подкормку производят в период цветения, вторую – в начале плодоношения.

На торфяных почвах под кабачки и патиссоны применяют $P_{120}K_{140-160}$.

Своевременный сбор урожая увеличивает урожайность этих культур.

Тыква занимает небольшие площади. Она лучше растет на богатых перегноем суглинистых почвах. Оптимальная реакция для нее слабокислая или близкая к нейтральной (рН в КС1 5,5–6,0). Тыква хорошо отзывается на органические удобрения, поэтому при выращивании ее на дерново-подзолистых почвах вносят 80–120 т/га навоза или торфо-навозного компоста в сочетании с $N_{120}P_{120-130}K_{140-150}$. Тыква требовательна к элементам минерального питания и особенно фосфору. Из форм азотных удобрений лучше использовать сульфат аммония и мочевины.

Нитратные, азотные удобрения снижают качество продукции. Часть азотных или азотно-калийных удобрений можно давать в одну–две подкормки ($N_{30}K_{30}$) в период цветения и в начале плодообразования.

Пасленовые культуры. К пасленовым культурам относятся томаты, перец, баклажаны, физалис. Из этой группы культур в Беларуси наиболее широкое распространение получили томаты.

Томат высаживают рассадой. Он лучше удается на окультуренных дерново-подзолистых почвах легкого и среднего гранулометрического состава, хорошо обеспеченных подвижным фосфором. Томат характеризуется средним потреблением питательных веществ. На 100 ц плодов и соответствующего количества вегетативной массы ранние сорта потребляют 20–35 кг азота, 7–9 кг P_2O_5 и 40–50 кг K_2O , среднеспелые соответственно 30–40, 8–12 и 50–60 кг.

Оптимальная реакция для томата слабокислая или близкая к нейтральной. На сильнонокислых почвах он положительно реагирует на известкование. Лучше известкование проводить доломитовой мукой. Однако томаты плохо переносят избыток кальция.

Томат очень требователен к фосфору. Корневая система у томата хорошо развитая мочковатая, проникает вглубь почвы на 1–1,2 м. Однако слабо усваивает фосфор из почвы, особенно в условиях пониженных температур, и поэтому он положительно отзывается на повышенные дозы фосфорных удобрений.

Потребление питательных веществ на протяжении вегетационного периода неравномерное. Максимальное потребление азота и калия происходит в период наибольшего накопления органических веществ. В первый период роста недопустим избыток азота, так как это приводит к разрастанию вегетативной массы и затягиванию на 15–20 дней созревания плодов, что в условиях Беларуси недопустимо. Поэтому к

установлению доз азота нужно подходить осторожно и лучше его вносить дробно, до посадки и в подкормку.

Сильному развитию вегетативной массы способствует и внесение навоза. Поэтому под томаты можно вносить только хорошо перепревший навоз или перегной в умеренных дозах.

Если азотные удобрения затягивают вегетацию, способствуют образованию многочисленных пасынков, то фосфорно-калийные удобрения на умеренном азотном фоне способствуют более дружному созреванию плодов и улучшению их качества. Налив плодов у томата осуществляется в основном за счет передвижения элементов питания из вегетативных органов.

Под томаты на дерново-подзолистых почвах применяют 30 т/га перегноя или 20–30 т/га перепревшего навоза (торфонавозного компоста). Если под предшественник вносились органические удобрения, то ограничиваются применением только минеральных удобрений.

Система удобрения для томатов складывается из внесения основного удобрения (прил. 34), небольших доз минеральных удобрений при посеве и подкормки (прил. 35).

На почвах с низким содержанием бора и цинка необходимо применять эти микроэлементы. Борные удобрения повышают сахаристость плодов и содержание в них витамина С. При основном внесении вносят 1,0–1,5 кг бора в форме борного суперфосфата или другого удобрения, а при некорневой подкормке – 500 г борной кислоты на 1 га.

Перец – очень ценная теплолюбивая культура с высоким содержанием витаминов. В последнее время в связи с выведением скороспелых сортов эта культура успешно продвигается в более северные районы.

Перец лучше удается на легких, прогреваемых, хорошо окультуренных почвах. На 100 ц продукции при выращивании на дерново-подзолистых почвах он выносит 100–110 кг азота, 16–17 кг P_2O_5 и 80–90 кг K_2O . На дерново-подзолистых почвах под перец применяют $K_{120}P_{60-120}K_{90-120}$.

Луковичные овощные растения. Репчатый лук, лук-порей, многолетние луки, чеснок очень требовательны к реакции среды и плодородию почв, а также к повышенной концентрации минеральных солей в почве. Их лучше выращивать на плодородных, слабокислых или нейтральных почвах (рН 6,5–7,0).

Репчатый лук выращивают отдельные овощеводческие хозяйства, которые располагают постройками для доработки, сушки, хранения

продукции и имеют определенный комплекс машин. Кроме того, лук в небольших количествах выращивают почти на всех индивидуальных участках.

Лучше репчатый лук удается на окультуренных дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с реакцией, близкой к нейтральной (рН в КС1 6,0–7,0). Хорошие урожаи лука получают и на низинных торфяниках, но в связи с избытком азота на этих почвах луковицы плохо хранятся в зимний период.

По сравнению с другими овощными культурами лук образует слабую корневую систему. Особенно плохо развита корневая система у лука, выращиваемого семенами на севок. Чтобы слабая корневая система в сравнительно короткий период (45–60 дней) смогла обеспечить растения для формирования высокого урожая, необходимо бесперебойное снабжение питательными веществами на протяжении всего периода вегетации.

Репчатый лук чувствителен к повышенной концентрации солей. Наиболее высокие урожаи он дает при внесении средних доз удобрений в сочетании с применением навоза под предшествующую культуру.

Имеются сортовые особенности в потреблении питательных веществ. Острые луки потребляют значительно больше азота, а сладкие – больше калия. В среднем острые луки, выращиваемые севком на репку, потребляют на 100 ц продукции 44 кг N, 12 кг P_2O_5 и 21 кг K_2O , а сладкий – 30 кг N, 11 кг P_2O_5 и 32 кг K_2O . Значительное преобладание потребления азота над калием у острых луков, по данным В. А. Борисова, связано с более высоким содержанием сахаров.

В настоящее время лук в основном выращивают из севка. На дерново-подзолистых почвах под репчатый лук минеральные удобрения следует вносить в дозах $N_{60-90}P_{60-90}K_{60-90}$. На почвах, хорошо окультуренных органическими удобрениями под предшествующие культуры, дозы удобрений при выращивании лука-севка не должны превышать $N_{45-60}P_{45-60}K_{45-60}$.

При выращивании лука всеми способами на недостаточно окультуренной почве эффективно внесение гранулированного суперфосфата при посеве в рядки (P_{10-20}).

Подкормки лука во время вегетации при сбалансированной основной заправке малоэффективны. Если удобрений недостаточно внесено в основное внесение, можно провести подкормку азотно-калийными удобрениями из расчета $N_{20}K_{30}$, через месяц при посадке севком и че-

рез два месяца после посева семенами.

Лук отличается повышенной требовательностью к сере, которая необходима для образования ароматических веществ. Поэтому под лук следует применять серосодержащие удобрения (сульфат аммония, сульфат калия и др.).

Лук-батун, лук-шалот, шнитт-лук – многолетние растения. Для выращивания лука-батуна более подходящими являются хорошо окультуренные, богатые органическим веществом дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы. Шнитт-лук лучше удается на гумусированных суглинистых почвах, а лук-шалот – на супесчаных хорошо окультуренных почвах. Хорошие урожаи этих культур можно получать при выращивании их на одном участке до четырех лет. Для названных многолетних луков оптимальной является нейтральная реакция почвы. Однако известкование следует проводить под предшественники.

Система удобрения многолетних луков складывается из внесения до посева 80–120 т/га перепревшего навоза или компоста хорошего приготовления и ранневесенних подкормок после схода снега в дозе $N_{60}P_{60}K_{90}$.

Чеснок – очень требовательная к плодородию почвы культура. Он лучше удается на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах с высоким содержанием органического вещества и нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7,0). Чеснок не выносит повышенной концентрации солей в почве. Он так же, как и репчатый лук, имеет слабо развитую корневую систему с малой всасывающей способностью.

Чеснок хорошо отзывается на органические удобрения, но их лучше вносить под предшественники в дозе 50–60 т/га. Перепревший навоз или перегной применяют осенью под зяблевую вспашку. Общие дозы минеральных удобрений в зависимости от обеспеченности почвы подвижными формами питательных веществ составляют $N_{60-70}P_{45-60}K_{60-90}$. В период начала образования луковиц проводят подкормку $N_{30}K_{30}$.

6.14. Плодовые и ягодные культуры

6.14.1. Подготовка почвы и внесение удобрений при посадке сада и ягодников

Если почва отводимого для сада участка недостаточно плодородна,

то лучше за два–три года до посадки провести на нем окультуривание почвы. Хотя в этом случае деревья будут посажены на несколько лет позже, они обгонят те, что посажены раньше в неокультуренную почву. Окультуривание почвы предполагает известкование, внесение органических удобрений, посев многолетних трав и сидеральных культур. Прежде всего, на участок вносят 80–120 т/га органических, 90–100 кг/га фосфорных и 100–120 кг/га д. в. калийных удобрений и глубоко вспахивают. Дозы известковых удобрений рассчитывают на весь пахотный горизонт. Лучше две трети дозы известки запахать, а остальное заделать культивацией в верхний слой почвы. Затем участок засевают многолетними бобовыми травами или бобово-злаковыми травосмесями. В год закладки сада зеленую массу последнего укоса запахивают в основную обработку почвы.

Участок со старопашотными, более плодородными почвами готовят за 3–5 месяцев до посадки. Весной или в начале лета высевают сидераты (люпин, горох, фацелию, сурепицу, рапс и т. д.) и в фазе бутонизации запахивают. Перед посевом сидератов вносят 70–90 кг/га азотных и по 90–120 кг/га д. в. – фосфорных и калийных удобрений. Под посевы бобовых культур (люпин, донник и сераделла) азотные удобрения не вносят.

При ускоренной закладке садов без предварительного окультурирования почвы удобрения вносят только при посадке в траншеи или посадочные ямы, а почву в междурядьях окультуривают в последующие годы.

Местное внесение удобрений при посадке обеспечивает питательными элементами деревца и кустарники в первые годы жизни. Особенно важен этот прием, если органические и минеральные удобрения не вносили при подготовке почвы. При механизированной посадке смородины, крыжовника, малины нередко ограничиваются только внесением удобрений перед посадкой при окультурировании почвы.

Ямы под яблони и груши копают шириной 1,0–1,2 м, глубиной – 0,6 м, для вишни и сливы – 0,8 и 0,6 м, для ягодных кустарников – диаметром 50–60 см, глубиной – 30–35 см. Под яблоню и грушу в яму вносят 30–40 кг перегноя или компостов, под вишню и сливу – 15–25, смородину – 8–10 и крыжовник – 10–12 кг. Слаборазложившийся навоз использовать нельзя, так как внесенный на большую глубину он разлагается в анаэробных условиях с образованием вредных недоокисленных соединений, это может ухудшить приживаемость саженцев. Если под яблоню и грушу внести 30–40 кг качественных органических

удобрений, минеральные можно не вносить, особенно на почвах с повышенной и высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия. Группировка почв по их содержанию приведена в табл. 56.

Таблица 56. Группировка обеспеченности дерново-подзолистых почв подвижными формами фосфора и калия для плодовых культур

| Степень обеспеченности почв | Наличие фосфора в почве, г/кг | Содержание калия в почве, г/кг |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Очень низкая | До 50 | До 60 |
| Низкая | 50–100 | 60–140 |
| Средняя | 101–150 | 141–200 |
| Повышенная | 151–200 | 201–250 |
| Высокая | 201–250 | 251–350 |
| Очень высокая | Более 250 | Более 350 |

Дозы фосфорных и калийных удобрений, вносимых в посадочную яму, зависят от обеспеченности почвы этими элементами. При средней обеспеченности под яблоню и грушу вносят по 40 г фосфора и калия, при низкой – до 60 г каждого элемента. Рекомендовавшиеся прежде дозы до 200 г фосфора в посадочную яму в ряде случаев себя не оправдали. По сравнению с дозой 60 г фосфора урожайность не возрастала, а на почвах с высоким его содержанием отмечались симптомы розеточности яблони (чаще – на слаборослых подвоях). Это заболевание развивается при недостатке цинка, который связан с внесением избыточных доз фосфора. Чрезмерный уровень фосфорного питания также неблагоприятно сказывается на доступности меди. Избыток калия тормозит поступление кальция, магния, железа и ряда микроэлементов. Поэтому дозы фосфорных и калийных удобрений следует дифференцировать в зависимости от их содержания в почве.

Дозы фосфорных и калийных удобрений под сливу и вишню вследствие меньшего размера посадочных ям по сравнению с семечковыми снижают в два раза. В первые годы жизни саженцы плодовых культур в достаточной мере обеспечиваются азотом из почвы и органических удобрений и азотные удобрения не вносят.

Для ягодных кустарников (смородины и крыжовника) в посадочную яму вносят 20–30 г фосфора и 10–15 г калия. Дозы дифференцируют в зависимости от содержания этих элементов в почве.

Для засыпки ям используется только верхний перегнойный слой почвы, почву подпахотных горизонтов разбрасывают в междурядьях.

Органические удобрения равномерно перемешивают со всей почвой, используемой для засыпки ямы. Две трети дозы фосфорных и калийных удобрений высыпают на дно ямы и перекапывают, а остальные перемешивают с почвой, которой засыпается нижняя половина ямы. Каждый саженец плодовых культур поливают 20–30 л воды, затем приствольные круги мульчируют торфом, компостом или перегноем.

В промышленных садах чаще используется траншейный способ посадки деревьев. Траншеи нарезаются плантажным плугом глубиной 45–60 см и шириной 40–50 см. На 100 м траншеи для семечковых культур вносят на дерново-подзолистых почвах 0,8–1,2 т органических удобрений, 4–6 кг фосфора и 2,0–2,5 д. в. – калия. Органические удобрения, как правило, укладывают перед нарезкой полосой по линии будущей траншеи, а фосфорные и калийные лучше высыпать на дно борозды. После засыпки траншеи бульдозером со специальным приспособлением сажают саженцы и делают лунки для полива.

Под смородину, крыжовник и особенно малину органические удобрения вносятся в борозды, нарезанные плугом. Посадку проводят машиной.

6.14.2. Удобрение молодого и плодоносящего сада

Хорошая предпосадочная заправка удобрениями гарантирует рост деревьев первые два-три года. Если рост замедляется, весной поверхностно под первое рыхление вносят азотные удобрения в дозе 4–5 г азота на 1 м² приствольного круга и заделывают на глубину 10–12 см.

Первые 4–5 лет удобрения в саду вносят в приствольный круг. Затем зону внесения увеличивают, разбрасывая их по проекции кроны. Междурядья в молодом саду можно использовать под картофель, корнеплоды и другие культуры. Система удобрения междурядных культур должна быть направлена на повышение плодородия почвы.

Для 4-летнего возраста приствольный круг (диаметр 2,0–2,5 м) примерно в два раза шире кроны, у 4–6-летнего дерева (диаметр 2,5–3,0 м) в полтора раза. Приствольные круги содержатся под чистым паром, еще лучше мульчировать их торфом или компостом.

Начиная с третьего–четвертого года жизни в молодом саду на почвах повышенного и среднего уровня плодородия в приствольные круги раз в 2–3 года, а на бедных почвах ежегодно вносят навоз или компост из расчета 6–8 кг на 1 м², или 25–30 кг на одно 3–4-летнее дерево и 40–50 кг на одно 7–8-летнее. Можно использовать сухой птичий помет в

дозе 100–250 г на 1 м². Дозы удобрений для молодых садов приведены в прил. 37.

Средние дозы азотных и калийных удобрений – 9 г, фосфорных – 6 г д. в. на 1 м². На почвах с низким содержанием подвижных форм фосфора и калия дозы этих удобрений увеличивают в 1,5 раза, а с высоким – уменьшают. Лучшим азотным удобрением является мочеви́на, фосфорсодержащим – аммонизированный суперфосфат, аммофос, из калийных могут применяться хлористый калий и другие формы. Многолетние исследования Украинского НИИ садоводства не подтвердили распространенное в литературе мнение, что плодовые культуры отрицательно реагируют на хлор. По данным этого института под влиянием хлора повышается морозостойкость деревьев.

Дозы удобрений на одно дерево с учетом возраста определяют следующим образом. Если дереву 6 лет, то диаметр приствольного круга примерно равен 3 м (6:2), а площадь – 7 м². При дозах удобрений на 1 м² приствольного круга – 6 кг навоза, по 9 г азота и калия, и 6 г фосфора. Под одно дерево вносят 42 кг навоза, по 54 г азота и калия, и 42 г д. в. фосфора.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью и заделывать около ствола на глубину 10–15 см и на периферии кроны на 18–20 см. Если удобрения не вносились осенью, можно сделать это весной. Из плодовых культур менее отзывчива на фосфорные удобрения груша, которая лучше других использует фосфор из запасов почвы. Дробное внесение азотных удобрений (две трети весной в фазе интенсивного роста корней и побегов и одна треть в середине лета) повышает их эффективность.

С началом плодоношения увеличивается вынос питательных элементов из сада. Если первые 4–5 лет после посадки саженцев в питании всех плодовых культур преобладает азот, то позднее яблони и груши выносят больше калия, поэтому дозы калия под семечковые увеличивают. В период массового плодоношения междурядные культуры лучше не возделывать. Система содержания почвы в плодоносящем саду может быть паровой, паросидеральной или газонной (дерново-перегнойной). В Беларуси чаще используется паровая система. Средние дозы удобрений для плодоносящих садов при паровой системе содержания почвы приведены в прил. 35. На почвах с низким содержанием фосфора и калия поправочный коэффициент к средней дозе равен 1,3, с повышенным содержанием – 0,75, высоким – 0,5 и очень высоким – 0,25. Фосфорные и калийные удобрения дают высокий эф-

фект при внесении в период покоя (с октября до начала вегетации). Поэтому, если фосфорные и калийные удобрения не были внесены осенью, это надо сделать рано весной. В приствольных кругах удобрения лучше заделывать на глубину 10–15 см, а в междурядьях – до 20 см. Особенно осторожно обрабатывают почву под яблонями на слаботорослых подвоях, корневая система которых расположена поверхностно.

Семечковые культуры на почвах, среднеобеспеченных фосфором, умеренно отзываются на фосфорные удобрения, а при высоком содержании калия – очень слабо и на калий. Фосфорные и калийные удобрения можно применять в запас на два–три года. В опытах БСХА на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах внесение в запас на два года осенью под вспашку 120 кг/га фосфора и 180 кг/га калия давало такой же эффект, как и ежегодное внесение 60 кг фосфора и 90 кг калия. Однако при внесении фосфорных и калийных удобрений в запас важно обеспечить растения магнием, бором и цинком.

Дозы азотных удобрений под семечковые культуры корректируют с учетом погодных условий: в холодный и влажный год их увеличивают на 20–30 %, в сухой и теплый – наполовину снижают. Многочисленные исследования подтверждают, что дозы азота более 120 кг/га себя не оправдывают. Избыток азота во второй половине вегетации может задержать вызревание побегов и снизить морозостойкость деревьев. Наилучшие результаты дает дробное внесение азота: 40 % дозы рано весной, 30 % – после цветения и 30 % – осенью. Очень важно обеспечить плодородное дерево питательными элементами во время второй волны активного роста корней (конец сентября – начало октября), когда накапливаются резервные питательные вещества, от чего зависит морозоустойчивость, рост и урожайность растений в следующем году. Удобрения, внесенные осенью, используются деревьями до наступления зимы, а в незамерзающих слоях почвы корни растут и используют питательные элементы и зимой. Поэтому в последнее время рекомендуют вносить примерно 30 % дозы азота осенью после уборки урожая. Дозы азотных, фосфорных, калийных и других удобрений можно корректировать, используя листовую диагностику.

При задернении сада фосфорные и калийные удобрения лучше вносить в запас на два–три года, так как внесенные поверхностно они из-за малой подвижности будут использоваться только травами. При задернении обязательны поливы и азотные подкормки, причем последние должны учитывать потребность многолетних трав.

При паросидеральной системе почву с весны обрабатывают по типу черного пара, а в середине лета на зеленое удобрение высевают однолетние травы (люпин, вико-овсяную смесь, фацелию и др.). Перед севом трав в почву вносят по 50–70 кг/га азота, фосфора и калия (под люпин азотные удобрения не вносят). Заделывают сидераты осенью или весной, внося для ускорения разложения 50–60 кг/га азота. Сидераты рекомендуется высевать раз в три года.

Чтобы увеличить доступность удобрений, их вносят очагами – в скважины, борозды в междурядьях, канавки. В молодых садах борозды (25–30 см) нарезают в 1–1,5 м от штамба, позже – чем старше деревья, тем дальше делается первая борозда; расстояние между бороздами – 0,8–1 м.

В промышленных садах интенсивного типа все шире используется глубокое очаговое внесение растворенных, эмульгированных или суспендированных удобрений гидробуром, шприцами и турбобурами. Этот способ особенно хорош для семечковых культур, выращиваемых на сильнорослых подвоях при задернении сада. Для удобрения одного 15–20-летнего дерева делают около 20 скважин глубиной 40–60 см. В них вносят сухие или растворенные удобрения. Для приготовления растворов пригодны все азотные и калийные удобрения, а из фосфорных – только аммонизированный суперфосфат, аммофос. Можно использовать и комплексные удобрения. Особенно хорош для этой цели кристаллин и другие удобрения, полностью растворимые в воде. Осенью раствор готовят 7–8%-ной концентрации, во время вегетации максимальная концентрация – 3–5 %. Недостаток кальция вызывает камедетечение слив, это устраняется известкованием.

Для оптимизации минерального питания плодовых культур проводят некорневые подкормки макро- и микроэлементами: раствором мочевины; солями кальция против горькой ямчатости; растворами микроэлементов при признаках недостатка последних. Лучшее время опрыскивания растений – утро или вечер, в пасмурную погоду также днем. Обработка раствором мочевины эффективна, когда ожидается очень высокий урожай и закладка цветочных почек из-за нехватки азота находится под угрозой. Опрыскивание проводят спустя 8–10 дней после цветения. Для яблони используют 0,4–0,5%-ный раствор мочевины, для груши вдвое слабее, сливы – 0,6–0,8%-ный и вишни – 0,4–0,8%-ный.

Против горькой ямчатости и бурой гнили плодов яблони и груши сад 6–8 раз обрабатывают 0,5–1%-ным раствором нитрата или хлорида

кальция. Первую подкормку проводят сразу после распускания листьев.

При слабом поражении яблони розеточностью из-за недостатка цинка эффективны двух-, трехкратные некорневые подкормки 0,3–0,5%-ным раствором сульфата цинка. При очень низком содержании в почве водорастворимого бора (менее 0,1 мг/кг) уменьшается завязывание плодов, появляется опробкование, это можно устранить некорневыми подкормками 0,05%-ным раствором борной кислоты. Расход раствора – 800 л/га.

Некорневые подкормки плодовых культур совмещают с обработкой против вредителей и болезней. При совместном применении нескольких микроэлементов доза каждого уменьшается в два раза.

6.14.3. Удобрение ягодных культур

На хорошо заправленных почвах черная смородина и крыжовник несколько лет не нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях, можно ограничиться внесением азотных. Для формирования сильных кустов весной до распускания почек на плодоносящей плантации вносят 60 кг/га азотных удобрений. Средние дозы удобрений на плодоносящих плантациях смородины и крыжовника приведены в прил. 36. Смородина более требовательна к уровню фосфорного питания, крыжовник – калийного. При низкой обеспеченности почвы фосфором и калием средние дозы фосфорных удобрений увеличивают на 25 %, при повышенной – наполовину снижают. В год внесения органических удобрений (их вносят раз в два года) минеральные удобрения не применяют.

Удобрения под смородину и крыжовник можно вносить в борозды. Для этого один раз в три-четыре года почву в междурядьях пахут всвал. В ближайшие к кустам борозды (25–30 см) заделывают навоз и фосфорно-калийные удобрения, закрывая их при пахоте вразвал. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить в запас на 2–3 года (под вспашку осенью), азотные – ежегодно, весной – под культивацию. При высоком урожае смородины и крыжовника последние вносят в два срока: рано весной и в фазе зеленой завязи (подкормка). Дозы удобрений под крыжовник и смородину приведены в прил. 40.

Малина очень отзывчива на внесение органических удобрений. Перед закладкой плантации малины осенью после уборки культуры, предшествовавшей черному пару, вносят 150 т/га органических удоб-

рений, 90–120 кг/га фосфорных и 120–150 кг/га калийных. Дозы фосфорных и калийных удобрений корректируют с учетом содержания этих элементов в почве. После внесения удобрений проводят глубокую вспашку с дискованием и выравниванием почвы планировщиком.

Траншейный способ подготовки почвы позволяет в 2–3 раза уменьшить расход органических удобрений по сравнению со сплошным окультуриванием почвы. Удобрения вносят в траншею при посадке растений осенью или весной. Для этого используют разбрасыватель РПТМ-2,ОА или переоборудованный кормораздатчик с боковым выбросом смеси удобрений. На 100 м траншеи вносят 3–5 т органических, 10 кг фосфорных и 20 кг калийных удобрений.

При хорошей предпосадочной заправке почвы в первые два-три года малину можно не удобрять. Только при слабом росте растений в первый и второй год весной их подкармливают азотом (60 кг/га). В дальнейшем внесение удобрений обязательно. В период полного плодоношения вносят 90 кг/га азота, 60–120 – фосфора и 90–150 кг/га калия. Конкретные дозы фосфорных и калийных удобрений зависят от содержания этих элементов в почве: при средней обеспеченности ими это 90 кг/га P_2O_5 и 120 кг/га K_2O , при низкой и повышенной выше или ниже средних на 30 % (прил. 39).

Лучшее время внесения азотных удобрений под малину – весна – до рыхления почвы после схода снега, органических (мульчирование) – после рыхления почвы, фосфорных и калийных – осень. Доза мульчи (торф, компост) – около 60 т/га. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные удобрения могут вноситься и весной, вместе с азотными. При заделке удобрений глубина обработки почвы в междурядьях малины – 12–15 см.

Малина очень восприимчива к недостатку магния, который особенно часто проявляется на легких почвах и при внесении повышенных доз калийных удобрений. Потребность в магнии будет удовлетворена, если до посадки малины было проведено известкование доломитовой мукой. Недостаток магния можно устранить внесением невысоких доз доломитовой муки (0,5 т/га) в том случае, когда не проводилось известкование или применялись известковые удобрения, не содержащие магния (мел и т. д.).

Землянику возделывают в специальных севооборотах. Высокие урожаи она дает на плодородных, хорошо окультуренных почвах, содержащих не менее 150–180 мг в 1 кг подвижного фосфора и 160–200 мг подвижного калия. Поэтому перед посадкой проводят глубокую

обработку почвы, вносят удобрения, очищают поле от сорняков, а кислые почвы (рН ниже 5,2) известкуют. В качестве органических удобрений лучше использовать полуперепревший навоз, перегной и хорошо вызревший компост в дозе 80–100 т/га. Их заделывают вспашкой не позднее, чем за 7–10 дней до посадки. Нельзя использовать свежий навоз, так как он плохо перемешивается с почвой, корни, соприкасаясь с ним, плохо приживаются и растения могут выпадать. Свежий навоз вносят только под предшественник.

Фосфорные и калийные удобрения можно внести в запас на три года вместе с органическими удобрениями, но можно вносить и ежегодно. В первом случае средние дозы фосфора 100–120 кг/га, калия – 110–120, во втором – по 40–50 кг/га. Дозы удобрений под землянику приведены в прил. 38.

При хорошей заправке почвы органическими и минеральными удобрениями на плантациях первого и второго года жизни удобрения обычно не вносят. Если растения отстают в росте, весной вносят 30–40 кг/га азота, однако при избытке последнего вегетативная масса может развиваться в ущерб плодоношению.

На второй год после сбора ягод проводят подкормку ($N_{30}P_{40}K_{90}$), на третий и последующий годы рано весной вносят 20–40 кг/га азота, а после сбора ягод и скашивания листьев 40 кг/га фосфора и 40–50 – калия.

Исследования показали, что двукратная обработка растений – в начале цветения и во время роста завязей – 0,01–0,02%-ным раствором сернокислого цинка повышает урожайность земляники на 15–20 %. Эффективны также в начале роста подкормки раствором из микроэлементов и мочевины (по 0,02 % перманганата калия, борной кислоты и молибденовокислого аммония и 0,2 % мочевины).

7. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ НА СЕНОКОСАХ И ПАСТБИЩАХ

Луговые травы характеризуются высокой потребностью в элементах питания, что обусловлено длительным вегетационным периодом и использованием травостоя в ранние фазы развития, когда травы поглощают наибольшее количество азота и калия [12]. По данным Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси из удобрений в год внесения используется 65 % азота, 20 фосфора и 60 % калия. Полное

минеральное удобрение проявляет самый высокий эффект на сенокосах и пастбищах.

На культурных сенокосах и пастбищах оплата удобрений выше, чем на природных кормовых угодьях. На пастбищах оплата удобрений урожаем выше, чем на сенокосах.

Эффективность азотных удобрений зависит от условий увлажнения почвы и ботанического состава травостоя. Наибольшая оплата азотных удобрений урожаем отмечается на лугах со злаковым и злаково-разнотравным травостоем. При содержании в травостое бобовых трав более 20 % эффективность азота уменьшается и возрастает эффективность фосфорных и калийных удобрений, особенно на угодьях с торфяно-болотными почвами.

Азотные удобрения способствуют повышению доли злаковых в травостое и снижают долю бобовых, а фосфорные и калийные удобрения, наоборот, увеличивают долю бобовых в травостое на минеральных почвах.

Следует различать удобрение сенокосов и пастбищ при их коренном улучшении и перезалужении, а также при их ежегодной эксплуатации.

При коренном улучшении и перезалужении лугопастбищных угодий при необходимости вначале проводят культуртехнические мероприятия (удаление кустарников, камней, выравнивание кочек и др.). Затем вносят фосфорные и калийные удобрения в дозе 90–120 кг/га д. в. После этого вносят органические удобрения. Навоз подстилочный, торфо-навозные компосты рекомендуется вносить в дозах 40–50 т/га на суглинистых и 50–60 т/га на супесчаных почвах. Можно использовать жидкий бесподстилочный навоз, увеличивая дозу до 70–80 м³/га. Внесенные фосфорные, калийные и органические удобрения заделывают плугом при вспашке.

Известковые удобрения рекомендуется вносить по вспаханной почве и заделывать культиватором или дисковой бороной. Доза известковых удобрений определяется с учетом значений pH, содержания гумуса, гранулометрического состава и типа почвы (прил. 55).

Перед посевом покровной культуры, под которую подсеивается травосмесь, следует вносить полное минеральное удобрение в дозах по 40–50 кг д. в. азота, фосфора и калия для нормального роста и развития покровной культуры.

Первые два года участок используется как сенокосное угодье, чтобы сформировалась дернина, устойчивая к вытаптыванию. После этого угодье можно использовать как пастбище.

При сенокосном использовании угодья минеральные удобрения проявляют максимальную эффективность при внесении их под укос. Дозы удобрений при сенокосном использовании луга приведены в прил. 27.

Максимальная доза азота под укос на сенокосах составляет 60–70 кг/га д. в. Азотные удобрения следует вносить весной под каждый укос. Фосфорные и калийные удобрения на сенокосах на связных почвах можно вносить как с осени, так и весной. Фосфорные удобрения обычно применяются в один прием, а калийные удобрения вносятся при средних дозах в один прием, а при высоких – дробно в два приема.

На лугах можно применять любые твердые формы удобрений, имеющиеся в хозяйстве. Из азотных удобрений предпочтение следует отдавать аммиачной селитре (меньше потерь азота в газообразной форме в сравнении с мочевиной).

Дозы минеральных удобрений на пастбищах зависят от типа луга, почвы состава травостоя (прил. 28). При пастбищном использовании луга азотные и калийные удобрения за один прием вносятся дозой не более 60 кг/га д. в. во избежание накопления избытка нитратов и калия в пастбищном корме. Азотные удобрения вносят рано весной и после каждого стравливания, калийные удобрения – весной и после второго стравливания. Фосфорные удобрения можно вносить за один прием всей дозой весной или осенью.

8. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ

В Республике Беларусь более 7 млн. га заболоченных земель. Из них более 3 млн. га торфяники. На долю низинных торфяников приходится 80 % от общей площади [12].

На торфяно-болотных почвах неуравновешенный почвенный раствор. На единицу азота приходится в 5–10 раз меньше фосфора и в 30–40 раз калия, чем на минеральных почвах.

При окультуривании торфяных почв количество подвижных элементов питания значительно изменяется. Изменения зависят от

свойств почвы, особенностей водного режима, уровня применения удобрений.

Основы земледелия на торфяных почвах – использование запасов азота с интенсивным применением калийных и фосфорных удобрений, а также микроудобрений (прежде всего медных и борных).

Около 70 % торфяных почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, занято многолетними травами и луговыми угодьями. От их продуктивности во многом зависит эффективность использования торфяных почв в целом.

Дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры приведены в прил. 29–32.

По данным Института почвоведения и агрохимии НАН РБ на торфяно-болотных почвах оптимальное соотношение между фосфором и калием для зерновых культур составляет 1:1, а для пропашных культур и многолетних – 1:2.

Следует иметь в виду, что под многолетние злаковые травы применение азотных удобрений является обязательным агроприемом. При оптимальном фосфорном и калийном питании за счет удобрений формируется урожайность до 65–70 ц/га сухого вещества. Окупаемость 1 кг азота удобрений составляет 20–28 кг сухого вещества. В год залужения азотные удобрения не вносятся, в последующие годы применяются дробно под каждый укос или стравливание. Первая весенняя подкормка осуществляется в начале активной вегетации трав после окончания внутрипочвенного стока влаги и под укос или стравливание. Наиболее эффективны для проведения поверхностных подкормок такие формы азотных удобрений, как КАС, аммиачная селитра и сульфат аммония. Эффективность карбамида снижается из-за газообразных потерь азота. При использовании КАС следует иметь в виду, что первая весенняя подкормка может проводиться без разбавления, но летом при температуре выше 16–18 °С необходимо разбавление исходного раствора КАС в соотношении 1:2 или 1:3–4 (при совместном внесении со средствами защиты).

На старопашотных торфяниках под многолетние злаковые травы рекомендуется вносить в зависимости от планируемого урожая 50–90 кг азота (прил. 31).

При наличии бобово-злакового травостоя, в составе которых наряду со злаковыми находятся бобовые травы, подкормки азотными удобрениями проводить не рекомендуется.

Фосфорные удобрения в год посева рассчитываются на планируемую урожайность и вносятся при подготовке почвы. В последующие годы эффективно ежегодное внесение фосфорных удобрений в один прием ранней весной или поздней осенью.

С учетом природной бедности торфяно-болотных почв калием и большого выноса его с урожаем продуктивность многолетних трав и качество травяных кормов во многом зависят от оптимизации калийного питания растений. Под многолетние травы калийные удобрения рекомендуется вносить дробно в 2–3 приема, которое обеспечивает более равномерное распределение калийного питания под укос и предотвращает его избыточное накопление в травах. Дозы калийных удобрений для первого укоса вносят весной или осенью. Остальное количество от годовой нормы следует вносить после первого и второго укосов. Доза калия под третий укос должна быть на 15–20 % ниже по сравнению с первым и вторым (прил. 31).

На торфяно-болотных почвах ощущается недостаток меди, особенно ее подвижных форм, поэтому хорошие результаты дает внесение медных удобрений (10–20 % прибавки урожая). Рациональным приемом являются некорневые подкормки меди в дозе 110–120 г сернокислой меди.

Дозы фосфорных и калийных удобрений под зерновые культуры определяются исходя из величин планируемого урожая, обеспеченности почвы этими элементами (прил. 29, 30). Для озимых зерновых культур фосфорные и калийные удобрения вносятся до посева под основную обработку почвы. Для яровых зерновых культур фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени под предпосевную обработку почвы.

Азотные удобрения под озимые зерновые культуры применяются в дозах 30–60 кг/га д. в. весной в начале активной вегетации и прекращении внутрипочвенного стока при слабом развитии. Под яровые зерновые культуры доза азота так же, как и для озимых, составляют 30–60 кг/га д. в. и осуществляется в один прием под предпосевную культивацию. Продуктивность зерновых культур на торфяно-болотных почвах зависят от обеспеченности медью, которая повышает устойчивость их к заболеваниям, урожайность и качество зерна. Лучший способ применения медных удобрений – некорневые подкормки в фазе конец кущения – начало выхода в трубку в дозе $100 \text{ г CuSO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ на гектар.

В структуре посевных площадей на торфяно-болотных почвах с мощностью торфяного горизонта более 1 м допускается возделывание

пропашных культур (картофель, корнеплоды) до 10 %. Урожаи получаются высокие, однако наблюдается их нестабильность из-за высокой вероятности заморозков в поздне-весенний, а иногда и в летний период.

Принципы применения фосфорных и калийных удобрений под пропашные культуры на торфяно-болотных почвах аналогичны яровым зерновым культурам. При благоприятном фосфорном и калийном питании рекомендуется внесение в основную заправку в зависимости от планируемой урожайности 30–90 кг/га д. в. азотных удобрений.

От недостатка бора на торфяно-болотных почвах чаще всего страдают кормовые корнеплоды. Под эту культуру рекомендуется использование борных удобрений в виде некорневых подкормок или обработок семенного материала при обеспеченности почвы микроэлементами в пределах 1-й и 2-й групп (табл. 8).

При разработке систем удобрения для сельскохозяйственных культур, возделываемых на осушенных торфяно-болотных почвах, где наблюдается сработка торфяного слоя, высокая степень минерализации с понижением содержания органического вещества до 15 % и ниже, следует придерживаться принципов расчета доз удобрения для аналогичных культур, принятых на минеральных почвах.

9. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Овощные культуры предъявляют повышенные требования к почвенному плодородию и дают хорошие урожаи на окультуренных дерново-подзолистых, пойменных и торфяно-болотных почвах низинного типа. Для них используется своя группировка почв по обеспеченности подвижными формами фосфора и калия (табл. 57).

Таблица 57. Группировка почв по содержанию подвижных форм фосфора и калия для овощных культур, мг на 1 кг почвы (по Кирсанову в 0,2 М НСІ)

| Обеспеченность почвы элементами питания | Дерново-подзолистые | | Торфяные | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | P ₂ O ₅ | K ₂ O | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Низкая | 80–150 | 80–120 | До 200 | До 250 |
| Средняя | 160–200 | 130–170 | 200–400 | 260–350 |
| Повышенная | 210–300 | 180–250 | 410–600 | 360–500 |
| Высокая | Более 300 | Более 250 | Более 600 | Более 500 |

Содержание гумуса в почве должно составлять не менее 2,5 %. Все овощные культуры выносят много питательных элементов. Коэффициенты использования элементов питания из почвы и удобрений овощными культурами приведены в прил. 44.

Разные овощные растения требуют разной концентрации солей в почве. Самые чувствительные к концентрации солей – лук, чеснок, морковь и огурцы, более выносливые – свекла, капуста, томаты. Под лук и чеснок лучше всего вносить хорошо разложившийся навоз. Столовая свекла, томаты, морковь хорошо реагируют только на минеральные удобрения, а органические удобрения нужно вносить под предшественник.

Большинство овощных культур предпочитает слабокислую или нейтральную реакцию почвы. На кислых почвах могут расти томаты, редька, репа; плохо переносят кислотность капуста, свекла, огурцы, морковь, бобы, сельдерей, лук. Салат, фасоль, шпинат и чеснок хорошо растут только на нейтральных почвах. Почвы с повышенной кислотностью необходимо известковать.

Основное количество органических, фосфорных и калийных удобрений вносят под осеннюю вспашку, а азотные – весной. Дозы удобрений под овощные культуры приведены в прил. 33, 34.

Для мелкосемянных и ранних культур возможно также внесение удобрений при посеве (прил. 35).

При рядковом внесении во избежание отрицательного влияния на растения удобрения должны располагаться в 2–3 см от семян. При механизированной посадке рассады удобрения вносят с водой (концентрация раствора до 0,2 %).

Если в основную заправку внесены не все удобрения, растения подкармливают азотными, а при необходимости и полными удобрениями при междурядной обработке (прил. 35).

Первую подкормку проводят через 30–35 дней после посева (при появлении третьего настоящего листа) или через 10–15 дней после посадки рассады, вторую – в период интенсивного роста. Удобрения вносят культиватором – растениепитателем: при первой подкормке на расстояние 6–8 см от растений на глубину 5–8 см, при второй – в середину междурядий на глубину 10–12 см. Как правило, подкормки заканчиваются за 20–30 дней до сбора урожая.

10. БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ГУМУСА В ПОЧВЕ

После определения доз удобрений производится расчет баланса элементов питания и гумуса в почве, который дает возможность оценить разработанную систему удобрения и в случае необходимости внести в нее коррективы. Он является научной основой планирования применения удобрений, позволяет целенаправленно регулировать плодородие почвы, защиту ее и окружающую среду от загрязнения агрохимикатами. Оценка состояния баланса элементов питания в системе почва – растение – удобрение является важной характеристикой эффективности использования удобрений в сельскохозяйственном производстве [2].

Баланс основных питательных элементов в системе удобрение – почва – растение является математическим выражением круговорота питательных элементов в земледелии и оценивается по разности между их приходом и расходом.

Используются различные виды баланса питательных элементов в земледелии: биологический, хозяйственный, дифференцированный и эффективный.

Биологический баланс дает наиболее полное представление о круговороте питательных веществ. В приходные статьи биологического баланса включаются поступления питательных элементов с органическими и минеральными удобрениями, осадками, семенами, симбиотическая и несимбиотическая азотфиксация, в расходные – содержание питательных элементов в основной и побочной продукции, отчуждаемой с поля, а также в корневых и послеуборочных остатках.

Хозяйственный баланс определяется по валовому поступлению и отчуждению элементов питания. При расчете хозяйственного баланса учитываются все приходные и расходные статьи, в том числе и непродуцируемые расходы.

Хозяйственный баланс характеризует не только долю участия удобрений в малом биологическом круговороте, обеспеченность сельскохозяйственных культур элементами питания, но и характер их изменения в почве. Он позволяет количественно прогнозировать тенденции изменения плодородия почв. В то же время хозяйственный баланс не дает полного представления об условиях питания отдельных культур или севооборота в целом, так как растения используют только часть элементов питания из внесенных удобрений.

Дифференцированный баланс. При расчетах этого вида баланса количество минеральных удобрений относится не на всю площадь земель, а только на площадь первоочередного использования, т. е. на почвах, недостаточно обеспеченных элементами питания.

Эффективный баланс определяется с учетом возможных коэффициентов использования питательных веществ из удобрений в год их внесения или за ротацию севооборота. Баланс питательных элементов оценивается показателями дефицита или их избытком, интенсивностью, структурой.

Дефицит или избыток элементов питания представляет разницу между всеми источниками их поступления и расхода и выражается в абсолютных (кг, тонны) или относительных (%) величинах на всю площадь или единицу площади.

Интенсивность баланса – отношение поступления элементов питания к выносу их урожаем. Выражается в виде процентов или коэффициентов. Величина интенсивности баланса менее 100 % характеризует дефицитный баланс, более 100 % – положительный.

Емкость баланса – сумма выноса из почвы и всех статей возмещения питательных элементов. Она характеризует мощность круговорота веществ. Чем больше емкость баланса, тем интенсивнее земледелие в исследуемом регионе, области, хозяйстве.

Структура баланса – характеризует долевые участия отдельных статей прихода и расхода элементов питания. Анализ структуры баланса позволяет оценить источники поступления, затраты на производство единицы продукции.

Для разработанной системы удобрения в севообороте наиболее часто используется хозяйственный и эффективный баланс питательных элементов. Ниже мы приводим методику их расчета.

11. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО (ОБЩЕГО) БАЛАНСА ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ

Определение баланса питательных элементов является научной основой планирования и прогнозирования применения минеральных удобрений, распределения их между районами и хозяйствами, позволяет целенаправленно регулировать плодородие, предохранять окружающую среду от загрязнения удобрениями. Баланс основных элемен-

тов питания отражает степень интенсификации сельскохозяйственного производства.

Баланс элементов питания в системе «удобрение – почва – растение» оценивается по разности между суммарным их количеством, поступившим в почву и отчуждаемым из нее. Таким образом, баланс питательных элементов в почве состоит из приходной и расходной частей. В *приходную часть* баланса входит поступление *питательных элементов в почву с удобрениями, семенами, из атмосферы*, в том числе азот, *продуцируемый клубеньковыми бактериями* бобовых культур (симбиотический) и свободноживущими бактериями – азотфиксаторами (несимбиотический азот). *Расходная часть* баланса включает хозяйственный вынос *питательных элементов* (с отчуждаемой с поля частью урожая), *потери элементов питания* из почвы и удобрений с поверхностными водами от вымывания, эрозии, испарения и газообразные потери (азота).

В результате сельскохозяйственного использования почвы претерпевают существенные изменения, при этом изменяется интенсивность процессов превращения и миграции элементов питания, потребления и вынос их растениями. Величина потребления и потерь элементов питания зависит от гранулометрического состава и степени окультуренности почвы, характера ее сельскохозяйственного использования, вида, доз и сроков использования удобрений, агротехнических приемов и других условий. Это делает необходимым периодическое уточнение приходных и расходных статей баланса элементов питания. Для объективной характеристики степени обеспеченности планируемых урожаев элементами питания целесообразно иметь балансовые расчеты не менее, чем за 5 лет.

Различают несколько видов баланса питательных элементов: *полный* (или биологический, или экологический), *внешнехозяйственный*, *хозяйственный* и *эффективный*.

Полный баланс дает полное представление о кругообороте элементов, так как учитывает все источники поступления питательных элементов в почву (с удобрениями, семенами, из атмосферы, биологический азот) и все статьи расхода элементов питания (вынос с основной и побочной продукцией, отчуждаемой с поля, содержание в корневых и послеуборочных остатках, поверхностный сток, вымывание и газообразные потери).

При *внешнехозяйственном балансе* сопоставляются количество питательных элементов, отчуждаемое с территории хозяйства с товарной

продукцией растениеводства и животноводства, и поступление их с минеральными удобрениями, комбикормами, органическими удобрениями, приобретаемыми хозяйством (торф, сапропели, лигнин, торфо-навозные компосты и др.). На внешнехозяйственный баланс влияет специализация хозяйства. Так, в хозяйствах, специализирующихся на производстве продукции животноводства и использующих собственные корма, с органическими удобрениями в почву возвращается 80–90 % калия, 60–70 – фосфора и 40–50 % азота, вынесенных с кормами. В хозяйствах зернового направления с территории хозяйства отчуждается 60–80 % азота, 70–85 – фосфора и 15–35 % калия от вынесенных урожаем.

Для характеристики баланса используется показатель *интенсивности баланса* – отношение поступления элементов питания к их расходу. Интенсивность баланса выражается в процентах или коэффициентами. Величина интенсивности баланса менее 100 % характеризует дефицитный, 100 % – бездефицитный и более 100 % – положительный баланс. Интенсивность баланса по азоту, фосфору и калию на пашне в Беларуси за 2011–2013 годы была по азоту – 122,7, фосфору – 194,7, калию – 166,3 %.

Дефицитный баланс питательных элементов (превышение расхода над поступлением) предупреждает о том, что происходит истощение почв, снижение их плодородия.

Отчуждение из сферы сельскохозяйственного производства азота, фосфора и калия с товарной продукцией растениеводства и животноводства необходимо в полной мере компенсировать внесением минеральных удобрений.

Хозяйственный баланс питательных элементов составляется для оценки системы применения удобрений. Приведем *методику* его расчета, разработанную Институтом почвоведения и агрохимии. *Приходные статьи баланса*: поступление питательных элементов с минеральными удобрениями; с органическими удобрениями; симбиотический азот; с семенами; с атмосферными осадками; несимбиотический азот. *Расходные статьи баланса* элементов питания: вынос планируемыми урожаями; потери от вымывания (выщелачивания); потери от эрозии почв; газообразные потери азота.

Количество *питательных элементов, поступающих с минеральными удобрениями*, определяют по дозам для культур и находят *среднее значение на 1 га севооборотной площади*. Поступление с органиче-

скими удобрениями находят по насыщенности севооборота органическими удобрениями.

Пример 1. Насыщенность органическими удобрениями в севообороте – 12 т/га. С 1 т навоза крупного рогатого скота на соломенной подстилке поступает в почву 5,0 кг азота (табл. 58), а с 12 т – 60,0 кг, фосфора – 30,0 кг ($2,5 \cdot 12$), калия – 72,0 кг ($6,0 \cdot 12$).

Таблица 58. Поступление питательных элементов с органическими удобрениями, кг/т

| Вид органических удобрений | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | CaO | MgO | SO ₄ * |
|------------------------------------|------|-------------------------------|------------------|------|-----|-------------------|
| Навоз крупного рогатого скота: | | | | | | |
| на соломенной подстилке | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 1,1 | 0,2 |
| на торфяной подстилке | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 |
| Компост торфонавозный: | | | | | | |
| 1:1 | 5,0 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 0,6 | 0,3 |
| 1:2 | 5,5 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 0,8 | 0,4 |
| Солома (зерновые) | 4,0 | 1,5 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| Навоз: | | | | | | |
| крупного рогатого скота жидкий | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| свиной жидкий | 2,5 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| крупного рогатого скота полужидкий | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 1,3 | 0,9 | 0,3 |
| Помет птичий (подстилочный) | 20,0 | 16,5 | 8,5 | 18,0 | 6,0 | 3,5 |
| Компост торфопометный: | | | | | | |
| 1:1 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 1,5 |
| 1:2 | 12,5 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 |

* Приведены расчетные значения.

Для определения количества биологического азота используют данные о величинах фиксированного из атмосферы азота, остающегося в почве после бобовых растений. Так, в расчете на 1 ц зеленой массы в почве остается симбиотического азота, сверх усвоенного растениями: после многолетних бобовых трав (кроме люцерны) – 0,35 кг, люцерны – 0,40, после многолетних бобово-злаковых смесей – 0,20 кг, после однолетних бобовых трав – 0,25 кг, однолетние бобово-злаковые травосмеси – 0,20 кг. Бобово-злаковые травы сенокосов и пастбищ на 1 ц зеленой массы оставляют в почве 0,15 кг азота. На 1 ц зерна люпин в чистом виде фиксирует 5,0 кг, кормовые бобы – 3,0, горох, пелюшка, вика, соя в чистом виде – 2,5, люпин в смеси с зерновыми культурами – 4,5, горох, пелюшка и вика в смеси с зерновыми культурами – 2,0 кг азота.

Пример 2. В севообороте площадью 900 га люпин занимает 100 га, клевер – 100 га. Урожайность зеленой массы люпина – 200 ц/га, клевера (зеленой массы) – 200 ц/га. После люпина в почве остается на 1 га 50 кг азота ($200 \cdot 0,25$), а на 100 га – 5000 кг. После клевера на 1 га остается 70 кг азота, на 100 га – 7000 кг. Сумму остающегося после люпина и клевера азота делят на площадь пашни в севообороте и находят среднее количество симбиотического азота на 1 га: $(5000 \text{ кг} + 7000 \text{ кг}) : 900 = 13,3 \text{ кг}$.

С семенами по данным Института почвоведения и агрохимии в среднем поступает 3 кг/га N, 1,3 – P_2O_5 , 1,5 – K_2O , 0,3 – CaO, 0,1 – MgO, 0,2 кг/га S. С атмосферными осадками поступает 9,4 кг/га N, 0,5 – P_2O_5 , 10,3 – K_2O , 25,3 – CaO, 5,0 – MgO и 36 кг/га S (SO_4). Поступление азота, фиксированного свободноживущими бактериями, при расчете баланса на пахотных и лугопастбищных угодьях принимается на уровне 15 кг/га в год.

При расчете расходных статей баланса вначале определяют *вынос питательных элементов планируемыми урожаями*, используя данные прил. 6, затем определяют значения выноса основных питательных элементов в среднем на 1 га севооборотной площади. Потери элементов питания от вымывания (выщелачивания) и от эрозии почв приведены в табл. 59.

Таблица 59. Потери элементов питания от вымывания и эрозии на пахотных почвах, кг/га

| Почвы | N | P_2O_5 | K_2O | CaO | MgO | SO_4 |
|-------------------------------|----|----------|--------|-----|-----|--------|
| Потери от вымывания | | | | | | |
| Дерново-подзолистые: | | | | | | |
| суглинистые | 16 | 0,2 | 11 | 64 | 13 | 24 |
| супесчаные на морене | 18 | 0,1 | 20 | 65 | 14 | 25 |
| супесчаные на песке | 20 | 0,1 | 26 | 69 | 15 | 26 |
| песчаные | 39 | 0,1 | 33 | 78 | 25 | 34 |
| Торфяные | 39 | 0,1 | 10 | 122 | 17 | 37 |
| Потери от эрозии | | | | | | |
| Степень эродированности почв: | | | | | | |
| слабая | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,05 |
| средняя | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0,10 |
| сильная | 15 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0,15 |
| очень сильная | 20 | 10 | 15 | 25 | 12 | 0,20 |

Газообразные *потери азота* на пахотных и лугопастбищных угодьях колеблются в пределах от 10 до 50 % от внесенного с удобре-

ниями. В атмосферу выделяются молекулярный азот, закись, окись и двуокись азота, аммиак. По данным Института почвоведения и агрохимии в Беларуси в среднем улетучивается 25 % азота, внесенного с минеральными и органическими удобрениями. По каждому элементу рассчитывается средневзвешенный показатель потерь с учетом количества эродированных почв в хозяйстве.

Пример 3. Из 2850 га пашни хозяйства 201 га – слабоэродированные почвы, 105 – средне- и 98 га – сильноэродированные почвы. Средневзвешенный показатель потерь азота от эрозии в расчете на 1 га пашни будет равен $(5 \cdot 201 + 10 \cdot 105 + 15 \cdot 98) : 2850 = 1,2$ (кг/га). На сенокосах и пастбищах потери элементов питания от вымывания и эрозии не учитываются. Сумма по статьям расхода показывает расход элементов питания в среднем на 1 га севооборотной площади.

Сопоставив приход с расходом, находят общий баланс и его интенсивность. Например, приход по азоту на 1 га равен 115 кг, а расход – 90 кг, т. е. общий баланс будет +25 кг/га $(115 - 90)$, а интенсивность баланса составит 127 % $[(115 : 90) \cdot 100]$.

Общий баланс основных питательных элементов (азот, фосфор, калий) принято считать удовлетворительным, когда его интенсивность приблизительно равна: по азоту – 110–120 %, по фосфору – 130–150, по калию – 120–150 %. По данным Института почвоведения и агрохимии такие значения интенсивности баланса в производственных условиях обеспечивают продуктивность пашни на уровне 50–60 ц/га к. ед.

Оптимальные значения интенсивности баланса азота в зависимости от продуктивности пашни приведены в табл. 60.

Таблица 60. **Оптимальная интенсивность баланса азота в зависимости от продуктивности, %**

| Продуктивность, ц/га к. ед. | Почвы | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | суглинистые и супесчаные на морене | супесчаные на песках и песчаные |
| | Интенсивность баланса азота, % | |
| Более 60 | 130–140 | – |
| 51–60 | 120–130 | – |
| 41–50 | 110–120 | 120–130 |
| 20–40 | 100–110 | 100–110 |

По результатам длительных стационарных полевых опытов Институт агрохимии и почвоведения рекомендует оптимальные параметры интенсивности баланса фосфора и калия в зависимости от содержания

их в почвах (табл. 61). По данным Института почвоведения и агрохимии и других научных учреждений фосфор из почвы практически не вымывается и не загрязняет грунтовые воды. Поэтому при расчетах баланса потери фосфатов не учитываются.

Таблица 61. **Оптимальная интенсивность баланса в зависимости от обеспеченности почв фосфором и калием**

| P ₂ O ₅ | | K ₂ O | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Содержание в почве, мг/кг | Интенсивность баланса, % | Содержание в почве, мг/кг | Интенсивность баланса, % |
| 100 | 150–180 | 80 | 180–200 |
| 101–150 | 130–150 | 81–140 | 150–180 |
| 151–200 | 100–120 | 141–200 | 120–150 |
| 201–300 | 50–70 | 201–300 | 80–100 |
| 301–400 | 40–50 | 300 | 50–60 |

Наряду с общим рассчитывается и *эффективный баланс*, который характеризует отношение между выносом растениями элементов питания и возможным их усвоением из поступивших в почву. Применяв коэффициенты использования питательных элементов из удобрений, находят величины возможного их усвоения. Сопоставив величины возможного усвоения питательных элементов с выносом урожаем, получим характеристику эффективного баланса.

Пример 4. На 1 га севооборотной площади внесено 56 кг азота с минеральными удобрениями, с атмосферными осадками поступило 9 кг, всего – 65 кг, из них усвоится 60 %, т. е. 39 кг. С органическими удобрениями поступит 70 кг азота и еще 20 кг биологического (5 кг симбиотического и 15 кг несимбиотического), всего 90 кг/га азота. В первый год будет усвоено 25 % органического и биологического азота, или 22,5 кг ($90 \cdot 0,25$), вместе с минеральными формами – 61,5 кг ($39 + 22,5$). Растения на создание урожая используют 101 кг азота. Эффективный баланс характеризуется минусовым значением: $61,5 - 101,0 = -39,5$ (кг/га). Интенсивность эффективного баланса по азоту будет равна 60 % ($61,5 : 101 \cdot 100$).

Аналогично рассчитываются эффективные балансы по фосфору и калию.

Для оценки системы применения удобрений по эффективному балансу проводится расчет возможного усвоения азота, фосфора и калия из почвенных запасов. Систему применения удобрений можно считать разработанной правильно в том случае, если дефицит элементов пита-

ния по эффективному балансу будет компенсироваться за счет возможного усвоения из почвы.

Пример 5. Для определения возможного усвоения элементов питания из почвенных запасов предварительно рассчитывают средневзвешенные значения содержания в почве гумуса, фосфора и калия по севообороту. Пусть в почве содержится 2 % гумуса и по 100 мг/кг почвы фосфора и калия. По данным Института почвоведения и агрохимии растения могут усвоить из запасов почвы по 20–25 кг азота на каждый процент гумуса в почве. В нашем примере это составит 40–50 кг/га азота. Фосфор растения усваивают на уровне 6–8 % от запасов подвижных форм в почве, калий – 10–15 %. Запасы их в почве определяют умножением средневзвешенных значений их содержания на коэффициент 3. В нашем примере запасы фосфора и калия будут равны 300 кг/га ($100 \cdot 3$) каждого элемента. Таким образом, усвоится 18–24 кг/га фосфора ($300 \cdot 0,06...0,08$) и 30–45 кг/га калия ($300 \cdot 0,1...0,15$). Если принять эффективный баланс предыдущего примера 39,5 кг азота, т. е. из почвы может быть усвоено 40–50 кг азота, то планируемые величины урожаев будут обеспечены питательными элементами и систему удобрений можно считать разработанной правильно.

При оценке системы применения удобрений по балансу питательных элементов прогнозируется изменение содержания в почве за ротацию севооборота подвижных форм фосфора и обменного калия. Поступление фосфора и калия за ротацию севооборота сверх расхода делят на норматив (табл. 62, 63) и определяют увеличение их содержания в почве. Результат суммируют с исходным содержанием и получают прогноз.

Таблица 62. Нормативы затрат фосфорных удобрений сверх выноса с урожаем для увеличения содержания подвижного фосфора на 10 мг/кг почвы, кг/га P_2O_5

| Гранулометрический состав | pH_{KCl} | Исходное содержание P_2O_5 , мг/кг почвы | | | |
|---------------------------|------------|--|--------|---------|---------|
| | | Менее 60 | 61–100 | 101–150 | 151–250 |
| Суглинистые | 4,5–5,0 | 75 | 69 | 65 | 69 |
| | 5,1–5,5 | 70 | 63 | 57 | 58 |
| | 5,6–6,0 | 65 | 56 | 49 | 47 |
| Супесчаные | 4,5–5,0 | 70 | 64 | 60 | 64 |
| | 5,1–5,5 | 65 | 58 | 52 | 52 |
| | 5,6–6,0 | 60 | 51 | 44 | 42 |
| Песчаные | 4,5–5,0 | 65 | 59 | 55 | 59 |
| | 5,1–5,5 | 60 | 53 | 47 | 48 |
| Торфяные | В среднем | – | 18 | – | – |

Таблица 63. Нормативы затрат калийных удобрений сверх выноса с урожаем для увеличения содержания подвижного калия на 10 мг/кг почвы, кг/га K_2O

| Гранулометрический состав | Интенсивность баланса, % | Исходное содержание P_2O_5 , мг/кг почвы | | |
|---------------------------|--------------------------|--|--------|---------|
| | | Менее 80 | 81–140 | 141–200 |
| Суглинистые | 130 | 30 | 42 | 55 |
| | 170 | 40 | 52 | 65 |
| | 210 | 50 | 62 | 75 |
| Супесчаные | 130 | 47 | 58 | 72 |
| | 170 | 57 | 68 | 82 |
| | 210 | 67 | 78 | 92 |
| Песчаные | 130 | 58 | 70 | 83 |
| | 170 | 68 | 80 | 93 |
| | 210 | 78 | 90 | 103 |
| Торфяные | 130 | В среднем | 13 | |

Пример 6. Допустим, что ежегодно сверх выносимого урожаем в почве остается 65 кг/га P_2O_5 , т. е. за ротацию девятипольного севооборота поступит 585 кг/га P_2O_5 . В первые 4 года содержание в почве P_2O_5 увеличивается до 147 мг/кг при исходном содержании на суглинистой почве 100 мг/кг и нормативе возмещения 51 кг/га на 10 мг/кг почвы (табл. 61). В последующие 5 лет норматив возмещения возрастает до 65 кг/га и содержание P_2O_5 в почве увеличивается еще на 50 мг/кг, достигнув к концу ротации севооборота 200 мг/кг почвы. Таким образом, через девять лет содержание P_2O_5 в почве должно составить 197 мг/кг. Аналогично прогнозируется содержание K_2O .

Расчет баланса кальция, магния и серы. В *приходной части* баланса учитывается поступление этих элементов с известковыми, органическими и минеральными удобрениями, а также с осадками и семенами, в *расходной части* – вынос урожаем и потери от фильтрации и эрозии. Поступление кальция и магния с известковыми удобрениями рассчитывают по количеству известковых удобрений на 1 га. Например, в среднем на 1 га севооборотной площади будет ежегодно вноситься 1,1 т доломитовой муки, или 0,935 т $CaCO_3$ (содержание $CaCO_3$ – 85 %). Из табл. 64 находим количество CaO и MgO на 1 га, вносимое с известковыми удобрениями. С 935 кг $CaCO_3$ поступает 280,5 кг CaO ($30 \cdot 9,35$) и 187 кг MgO ($20 \cdot 9,35$).

По количеству минеральных удобрений на 1 га в д. в. определяют поступление CaO , MgO и S в почву. Например, на 1 га планируется внести 65 кг P_2O_5 в виде двойного суперфосфата. С этим количеством P_2O_5 поступает 20 кг CaO ($65 \cdot 31/100$). В случае применения сульфата аммония и сульфата калия определяют количество действующего ве-

щества, поступающее с этими видами удобрений на 1 га, и рассчитывают поступление серы, используя данные табл. 64.

Поступление кальция, магния и серы с органическими удобрениями рассчитывают с учетом насыщенности почвы последними и поступления этих элементов с удобрениями (табл. 64). Например, при насыщенности органическими удобрениями в севообороте 12 т/га в почву поступит 48 кг/га CaO ($4 \cdot 12$), 13,2 кг/га MgO ($1,1 \cdot 12$) и около 2,4 кг/га SO₄ ($0,2 \cdot 12$). С атмосферными осадками в почву поступает 25,3 кг/га CaO, 3,6 – MgO, 3,6 кг/га S, с семенами – соответственно 0,3; 0,1 и 0,2 кг/га. Суммируя результаты по статьям приходной части баланса, получим поступление кальция, магния и серы на 1 га севооборотной площади.

Таблица 64. Содержание кальция, магния и серы в минеральных и известковых удобрениях в расчете на 100 кг д.в. (N, P₂O₅, K₂O, CaCO₃), кг

| Удобрения | CaO | MgO | S, % |
|---|-----|-----|-----------|
| Простой суперфосфат | 117 | – | 13 |
| Двойной суперфосфат | 31 | – | – |
| Сульфат аммония | – | – | 24,2 |
| Сульфат калия | – | – | 33 |
| Молотый известняк | 56 | – | – |
| Молотый доломит | 30 | 20 | – |
| Молотый доломитизированный известняк | 50 | 5,0 | – |
| Мел | 56 | – | – |
| Гашеная известь | 56 | – | – |
| Доломитовая мука | 30 | 20 | – |
| Дефекат | 56 | – | – |
| Цементная пыль | 58 | 1,0 | 1,0 |
| Сланцевая зола | 58 | 5 | – |
| Фосфогипс (40%-ной влажности, на 100 кг физической массы) | 23 | – | 17,7–20,6 |
| Сульфат калия | | | 18,0 |
| Сульфат магния | | | 18,6 |
| Сульфат натрия | | | 22,6 |

Вынос урожая кальция, магния и серы рассчитывают аналогично тому, как это делается для азота, фосфора и кальция. Используя данные, приведенные в прил. 52, 66, рассчитывают показатели выноса по каждой культуре и вычисляют средние значения на 1 га. Потери от вымывания и эрозии находят по табл. 59.

При известковании потери кальция за счет вымывания возрастают, особенно на легких почвах. По данным Института почвоведения и аг-

рохимии на почвах с pH (КС1) более 6 потери кальция возрастают в среднем на 40 % по сравнению со средними данными на почвах без известкования. На кислых почвах (pH менее 5) вымывание кальция примерно на 20 % ниже. Поэтому при расчете баланса кальция средний нормативный показатель потерь (табл. 59) на почвах с pH более 6 следует умножить на 1,4, а на почвах с pH менее 5 – на 0,8.

Влияние известкования на вымывание магния неоднозначно, так как в одних случаях катионы кальция ускоряют его вымывание из почвы, что обусловлено вытеснением магния из поглощающего комплекса, а в других – могут уменьшить вымывание магния, нейтрализуя кислотность почвы, которая способствует потерям магния за счет вымывания. В связи с этим при расчетах баланса магния используют нормативы потерь от вымывания, приведенные в табл. 59. Определяют расход на 1 га.

Сопоставив показатели по приходу и расходу, находят значения баланса и его интенсивность.

Расчет баланса гумуса

Расчет баланса гумуса в почве производится по форме табл. 65 путем сопоставления проектируемого внесения органических удобрений на 1 га севооборотной площади с требуемым для поддержания бездефицитного баланса гумуса в почве.

Таблица 65. Баланс гумуса в пахотном слое почвы в севообороте

| Почва, процент пропашных культур в севообороте | Содержание гумуса до разработки системы удобрения, % | Требуемая насыщенность органическими удобрениями для бездефицитного баланса гумуса, т/га | Проектируется вносить органических удобрений, т/га | Баланс гумуса в почве за год, кг/га | Прогнозируемое содержание гумуса через ротацию севооборота, % |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|
| Суглинистая, 10 % | 1,55 | 10 | 12 | 100 | 1,58 |

Например, почва в севообороте дерново-подзолистая легкосуглинистая, содержит гумуса 1,55 %. В структуре посевных площадей 10 % пропашных культур и 15 % многолетних трав. По нормативам для бездефицитного баланса гумуса необходима насыщенность органическими удобрениями 10 т/га (см. табл. 2). Проектируется вносить их

12 т/га, т. е. сверх норматива будет вноситься 2 т/га, из которых образуется 100 кг/га гумуса в год ($50 \cdot 2 = 100$).

С 1 т органических удобрений в год образуется гумуса: на суглинистых почвах 50 кг, супесчаных, подстилаемой мореной – 45, супесчаных, подстилаемых песком – 40 и песчаных 35 кг. В 9-польном севообороте за ротацию прирост гумуса будет равен 900 кг/га (или 0,03 % к массе почвы):

$$\frac{\text{Масса гумуса } 900 \text{ кг} \cdot 100}{\text{Масса почвы } 3000000 \text{ кг}} = 0,03 \%$$

Исходное содержание гумуса в почве – 1,55 %. За ротацию севооборота оно возрастет до 1,58 %.

12. СОСТАВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ

После определения доз органических и минеральных удобрений и оценки их по балансу питательных элементов и гумуса в почве разрабатывается многолетний план известкования почв в севооборотах и других угодьях. При увеличении уровня применения удобрений роль известкования усиливается.

Необходимость известкования почв зависит от степени кислотности и насыщенности ее основаниями с учетом гранулометрического состава и типа почвы. В Республике Беларусь на основе обобщения результатов многочисленных опытов необходимость известкования почв принято определять по величине обменной кислотности (pH_{KCl}).

В соответствии с «Инструкцией по известкованию кислых почв сельскохозяйственных угодий Республики Беларусь» известкованию подлежат:

1. Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные почвы пашни, сенокосов и пастбищ, имеющие показатель кислотности пахотного горизонта pH_{KCl} 5,50 и ниже.
2. Дерново-подзолистые суглинистые и глинистые почвы с pH_{KCl} 6,0 и ниже.
3. Торфяно-болотные почвы с pH_{KCl} 5,0 и ниже.
4. Почвы рекультивируемых земель (выработанные торфяники, карьерные участки и др.), если кислотность подготавливаемого в качестве пахотного или гумусового горизонта имеет pH_{KCl} 5,5 и ниже.

5. В севооборотах со льном, картофелем и люпином известкование проводится при pH_{KCl} 5,5 и ниже (на песчаных почвах – 5,25 и ниже).

6. Внесение известковых материалов (далее – мелиоранты) проводится после уборки основного и побочного урожая возделываемой культуры. Повторное известкование пахотных почв и перезалуженных земель разрешается не ранее, чем через 4 года проведения их агрохимического обследования.

7. Мелиоранты рекомендуется вносить под культивацию или боронование полей, которое проводят сельскохозяйственные организации.

8. Внесение пылевидных мелиорантов осуществляется при скорости ветра, не превышающей 6 м/с.

Оптимальные интервалы кислотности (pH_{KCl}), в которых обеспечивается наибольшая продуктивность принятых для Беларуси севооборотов представлены в табл. 66.

Таблица 66. Оптимальные интервалы кислотности (pH_{KCl}), в которых обеспечивается наибольшая продуктивность принятых в Беларуси севооборотов

| Почвы | В среднем | В том числе по типам севооборотов | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|--|
| | | со льном, картофелем, люпином, овсом, озимой рожью | зерно-травянопропашные с кукурузой, корнеплодами | зерно-свекловичные, прифермерские (клевер, люцерна, овощекормовые) |
| Дерново-подзолистые: | | | | |
| песчаные | 5,3–5,8 | 5,3–5,5 | 5,5–5,5 | 5,5–5,8 |
| супесчаные | 5,5–6,2 | 5,5–5,8 | 5,5–5,8 | 5,8–6,2 |
| суглинистые | 5,5–6,7 | 5,5–6,0 | 5,5–6,0 | 6,5–6,7 |
| Торфяно-болотные | 5,0–5,3 | – | – | – |
| Минеральные почвы сенокосов и пастбищ | 5,8–6,2 | – | – | – |

При проведении работ по известкованию выделяется мелиоративное (основное) – на почвах 1-й и 2-й групп кислотности и поддерживающее известкование, рассчитанное на компенсацию подкисляющих факторов на почву при относительно благоприятном исходном уровне кислотности, – на почвах 3-й и 4-й групп по типам севооборотов в зависимости от их насыщенности кальциефобными и кальциефильными культурами.

В зимних условиях проводится лишь поддерживающее известкование (почвы 3-й–4-й группы). Почвы 1-й и 2-й групп кислотности зимой не известкуются. В зимних условиях известкование проводится на

площадах с уклоном не более 3°, глубине снежного покрова не более 25 см, отсутствии снежного наста, на незатопляемых весенними паводками землях. Запрещается внесение мелиорантов на замерзшие и не покрытые снегом пахотные земли с наличием ледяной корки.

Почвы 1-й и 2-й групп кислотности известкуются лишь в случаях, если в другое время года не представляется возможным проведение этих работ из-за непроходимости на данных полях специализированной техники.

Дозы извести (CaCO_3) устанавливаются на основании типа и гранулометрического состава почвы, исходного уровня кислотности (рН КСІ), содержания гумуса, плотности загрязнения территорий радионуклидами.

На минеральных почвах с утяжелением гранулометрического состава и увеличением содержания гумуса при одних и тех же значениях рН дозы извести (CaCO_3) будут возрастать. Средние дозы известковых удобрений (CaCO_3 , т/га) при известковании кислых почв приводятся в приложениях 54, 55.

Дозы известковых удобрений рассчитаны для пахотного горизонта глубиной 0–25 см. С увеличением глубины пахотного горизонта более 25 см дозы известковых удобрений повышают на 10 % против рекомендуемых.

На пахотных почвах с благоприятной кислотностью, но с низким содержанием обменного магния (менее 60 мг MgO в 1 кг почвы) рекомендуется вносить доломитовую муку в дозе 2 т/га один раз в три года. Этот прием позволит обеспечить растения необходимым количеством магния.

Физическая доза вносимых известковых удобрений определяется содержанием карбонатов кальция и магния с учетом влажности мелиоранта. Для расчета физической дозы применяют формулы.

При использовании твердых известковых пород (доломит, известняк):

$$D_{\text{ф}} = D_0 \cdot 10^6 : M : (100 - B) : (A_1 + 0,7 \cdot A_2 + 0,5 \cdot A_3 + 0,2 \cdot A_4),$$

где $D_{\text{ф}}$ – физический вес мелиоранта, т/га;

D_0 – расчетная доза CaCO_3 , т/га;

M – содержание кальция и магния в пересчете на CaCO_3 , % на сухое вещество;

B – влажность, %;

A_1 – доля частиц менее 1 мм, %;

A_2 – доля частиц 1–3 мм, %;

A_3 – доля частиц 3–5 мм, %;

A_4 – доля частиц более 5 мм, %;

0,7, 0,5, 0,2 – нейтрализующая способность частиц в сравнении с размером менее 1 мм.

Физическая доза доломитовой муки, у которой содержание частиц менее 1 мм приближается к 100 %, а влажность незначительна, можно применять формулу

$$D_{\phi} = D_o : 0,95.$$

При использовании дефеката, карбонатного сапропеля, мела применяется формула

$$D_{\phi} = D_o \cdot 10^4 : M : (100 - B) \cdot 0,8;$$

других мягких материалов:

$$D_{\phi} = D_o \cdot 10^4 : M : (100 - B).$$

Мелиоранты рекомендуется вносить под культивацию или боронование полей, которые проводят сельскохозяйственные организации.

12.1. Известкование почв в севооборотах, угодьях и на отдельных площадях

Известкование почв в Беларуси производится в соответствии с разработанной инструкцией [4].

Повторное известкование пахотных почв и перезалужаемых земель разрешается не ранее чем через 4 года после проведения их агрохимического обследования.

В полевых севооборотах с многолетними травами и зерновыми культурами известкование почв проводится полными дозами. Всю дозу известкового удобрения рекомендуется вносить под покровную культуру, под которую будут подсеиваться многолетние травы. Вносить удобрения лучше по вспаханной почве с заделкой культиватором. Это позволит обеспечить оптимальный интервал pH почвы для подсеиваемых многолетних трав.

Если под покровную культуру по значению pH не требуется вносить известковые удобрения, известкуют почву под другие культуры, наиболее чувствительные к кислотности почвы (яровая и озимая пшеница, ячмень, горох, кукуруза и др.).

В севооборотах с высоким уровнем насыщения картофелем, льном и люпином известкование следует проводить при $pH_{КС1}$ 5,5 и ниже (на песчаных почвах – 5,25 и ниже).

При создании культурных лугопастбищных угодий (коренное улучшение естественных и перезалужение улучшенных) известкование проводится полными дозами по вспаханной почве с заделкой культиватором. При этом известь заделывается в верхний слой пахотного горизонта, где находится основная масса корней многолетних трав. Предпочтение следует отдать доломитовой муке.

В многолетних насаждениях плодовых и ягодных культур известкование почвы следует проводить доломитовой мукой. Первое внесение извести производится полной дозой перед вспашкой при подготовке почвы под посадку сада и ягодников. Затем известковые удобрения вносятся в посадочные ямы, лунки, борозды в рекомендуемых дозах.

После посадки молодые сады и ягодники следует известковать, как правило, через 5–6 лет с обязательным проведением анализа почвы на кислотность.

В плодоносящих насаждениях известкование можно проводить с интервалом 5–6 лет, уточняя дозу извести по результатам анализа почвы на кислотность. Вносятся известковые удобрения вразброс на всю площадь междурядий по вспаханной почве и заделываются культиватором или дисковой бороной.

12.2. Особенности применения удобрений и известкования почв при загрязнении их радионуклидами

Применение удобрений и известкование почв на почвах загрязненных радионуклидами производится в соответствии с разработанной инструкцией [3] и правилами [14].

Органические удобрения. Систематическое применение органических удобрений приводит к существенному изменению агрохимических свойств почв, повышению содержания гумуса и уменьшению перехода радионуклидов в сельскохозяйственные культуры. Необходимо использовать все имеющиеся источники обогащения почв органическим веществом – навоз, солому, зеленые удобрения, а при небольшом радиусе перевозок (до 30–40 км) – торф и нейтрализованный лигнин Речицкого и Бобруйского гидролизных заводов. В опытах установлено, что внесение под картофель подстилочного навоза, торфо-навозных и лигнино-навозных компостов снижает содержание Cs в клубнях на 17–23 %. Применение минеральных удобрений на фоне органических увеличивает эффективность их воздействия до 30 %. Влияние торфо-

навозных и лигнино-навозных компостов более значительно проявляется на зерновых культурах и, в частности, на ячмене, особенно при внесении минеральных удобрений. Так, последствие от применения только органических удобрений приводит к снижению загрязнения зерна ячменя как ^{137}Cs , так и ^{90}Sr на 19–27 %, а при внесении НПК содержание ^{137}Cs снижается на 35–58 %, ^{90}Sr – 32 % с одновременным увеличением урожая зерна в 1,5 раза [14].

Под сельскохозяйственные культуры рекомендуются те же дозы органических удобрений, что и на не загрязненных радионуклидами землях.

Фосфорные удобрения. Установлено снижение поступления радионуклидов из почвы в растительную продукцию при внесении фосфорных удобрений, особенно на почвах с низким содержанием фосфатов. Фосфорные удобрения не только способствуют повышению урожая возделываемых культур, но и закреплению ^{90}Sr за счет осаждения его фосфатами. Учитывая дефицит фосфорных удобрений и их высокую стоимость, рекомендовано на загрязненной территории обеспечить минимум фосфорных удобрений, необходимый для сбалансированного питания сельскохозяйственных культур с учетом содержания подвижных фосфатов в почве [14].

Основные и дополнительные дозы фосфорных удобрений дифференцируются по типам почв, содержанию подвижного фосфора в почве и трем уровням плотности загрязнения радионуклидами: первый – содержание ^{137}Cs в почвах от 37 до 185 кБк/м² (1–5 Ки/км²) или ^{90}Sr от 6 до 11 кБк/м² (0,2–0,3 Ки/км²); второй – содержание ^{137}Cs в почвах от 185 до 555 кБк/м² (5–15 Ки/км²) или ^{90}Sr от 11 до 74 кБк/м² (0,3–2,0 Ки/км²); третий – содержание ^{137}Cs в почвах от 555 до 1480 кБк/м² (15–40 Ки/км²) или ^{90}Sr от 74 до 111 кБк/м² (2,0–3,0 Ки/км²). Общая потребность в фосфорных удобрениях на загрязненных радионуклидами землях (тонн действующего вещества) определяется путем умножения площади пахотных или кормовых угодий (в гектарах) с данной плотностью загрязнения и содержанием фосфора в почве на нормативную дозу P_2O_5 [14].

Калийные удобрения. Существенное влияние на снижение поступления ^{137}Cs в растения оказывают калийные удобрения. Это обусловлено как антагонизмом катионов цезия и калия в почвенном растворе, так и значительной прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, особенно на бедных калием дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах. Например, в опытах на дерново-подзолистых супесча-

ных почвах прибавка от калийных удобрений в форме гранулированного хлористого калия на посевах яровых и озимых зерновых культур в различные по степени увлажнения годы находилась в пределах: на ячмене – 0,9–4,0 ц/га, овсе – 1,5–2,0 ц/га, озимой ржи – 1,1–2,9 ц/га.

По мере повышения степени загрязнения почв радионуклидами потребность в дополнительных дозах калия увеличивается. Установлено, что внесение калийных удобрений при сбалансированном азотно-фосфорном питании приводит не только к существенному уменьшению поступления из почвы в растения ^{137}Cs , но и ^{90}Sr . Особенно эффективны повышенные дозы калийных удобрений под многолетние травы, корнеплоды и картофель. Так, в опытах на супесчаных почвах с плотностью загрязнения ^{90}Sr 11–18,5 кБк/м² (0,3–0,5 Ки/км²) повышение дозы калия со 120 до 180 кг/га сопровождалось снижением накопления ^{90}Sr в клубнях различных сортов картофеля на 33–57 % при одновременном повышении урожая на 20–50 ц/га.

Учитывая сравнительно низкую стоимость калийных удобрений, рекомендованы повышенные дозы, дифференцированные в зависимости от типов почв и содержания в них подвижного калия. Предусмотрен приоритет почв с высокой плотностью загрязнения радионуклидами, где повышение обеспеченности почв калием должно идти более быстрыми темпами [14].

Основные и дополнительные дозы калийных удобрений на загрязненных радионуклидами почвах дифференцируются аналогично фосфорным удобрениям и рассчитывается умножением соответствующих площадей (по типу почв, содержанию подвижного калия в почве, плотности загрязнения) на нормативные дозы K_2O .

Для предотвращения избыточных доз калийных удобрений и ухудшения качества продукции введены ограничения. На почвах с высоким содержанием обменного калия (содержание K_2O более 300 мг/кг на минеральных и 1000 мг/кг на торфяно-болотных почвах) внесение калийных удобрений не предусматривается до очередного агрохимического обследования почв.

Азотные удобрения. Важная роль отводится регулированию азотного питания растений. Недостаток доступного азота в почве приводит к снижению урожая, а повышенные дозы азотных удобрений усиливают накопление радионуклидов в растениях. Расчет доз азотных удобрений необходимо вести исходя из потребности растений на планируемый урожай. Чтобы избежать превышения оптимальных доз азотных удобрений на загрязненных землях, рекомендуется проведе-

ние почвенной и растительной диагностики для подкормок озимых и яровых зерновых культур. Предусмотрено также ограничение максимально допустимых доз азотных удобрений с учетом биологических особенностей культур [14].

Снижению накопления нитратов в картофеле, овощах и кормовых культурах при одновременном уменьшении содержания радионуклидов на 15–30 % способствуют новые формы медленнодействующих карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и других биологически активных компонентов, выпускаемых Гродненским ПО «Азот» на основе совместных разработок Института почвоведения и агрохимии, Института проблем использования природных ресурсов и экологии и Белорусского государственного технологического университета.

Карбамид медленнодействующий с гуматсодержащими добавками рекомендуется к применению на почвах разного гранулометрического состава, но в первую очередь на рыхлых почвообразующих породах под все полевые и овощные культуры. Вносится под яровые культуры весной в основную заправку, под озимые и многолетние травы – весной в первую подкормку, под остальные сельскохозяйственные культуры – в виде основного внесения в почву.

Сульфат аммония медленнодействующий рекомендуется под картофель, крестоцветные, однолетние и многолетние травы. Вносится в основную заправку почвы, под многолетние травы – под каждый укос трав.

Комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение марки N:P:K = 5:16:35 с «Гидрогуматом» рекомендуется под озимые зерновые культуры с осени. Весной проводится подкормка только азотными удобрениями.

Комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение марки N:P:K = 16:12:20 с «Феномеланом» рекомендуется в основное внесение в почву под яровые зерновые культуры, картофель, овощные и другие культуры.

Экономическая окупаемость новых форм удобрений прибавкой урожая повышается в среднем на 25 %.

Биологические препараты. На посевах злаковых многолетних трав эффективно применение препаратов на основе ассоциативных штаммов азотфиксирующих бактерий, позволяющих получать прибавку урожая, равноценную внесению на гектаре посева 20–40 кг азота минеральных удобрений, и снизить загрязнение урожая на 20–30 %. За-

траты на биологические препараты окупаются с рентабельностью не менее 200 % [14].

Известкование. Известкование кислых почв является весьма эффективным способом снижения поступления радионуклидов из почвы в растения. Установлено, что от внесения известковых удобрений в дозах, рассчитанных по гидролитической кислотности, содержание стронция-90 и цезия-137 в растениеводческой продукции снижается на 60–80 %, а в ряде случаев – в 1,5 раза и более. Дальнейшее повышение доз извести в меньшей степени влияет на снижение поступления радионуклидов в растения. При оптимальных значениях реакции почвенной среды отмечается минимальное накопление радионуклидов в продукции растениеводства. Поэтому основной целью известкования кислых почв в зоне радиоактивного загрязнения является нейтрализация кислотности почвы и насыщение поглощающего комплекса кальцием и магнием [14].

При проведении известкования кислых почв следует учитывать уровень загрязнения их радионуклидами.

На почвах загрязненных радионуклидами установлено положительное действие известкования при внесении азотных удобрений, что очень важно при возделывании культур, для роста и развития которых требуются достаточно высокие дозы азотных удобрений. Например, внесение азотных удобрений в дозе 100 кг/га д. в. на фоне известкования (рН 6,0) под яровой рапс не увеличивало переход радионуклидов в семена.

На основании экспериментальных исследований для достижения оптимального уровня кислотности почвы предложены уточненные дозы извести, дифференцированные по плотности радиоактивного загрязнения и гранулометрическому составу почв (прил. 55).

К загрязненным радионуклидами почвам, на которых требуется дополнительное внесение известковых удобрений, относятся почвы с уровнем загрязнения 37–1480 кБк/м² (1–40 Ки/км²) по ¹³⁷Cs и 6–11 кБк/м² (0,2–3,0 Ки/км²) по ⁹⁰Sr. При уровне загрязнения 37–185 кБк/м² (1–5 Ки/км²) по ¹³⁷Cs и 6–11 кБк/м² (0,2–0,3 Ки/км²) по ⁹⁰Sr дозы известковых мелиорантов увеличиваются только на торфяных почвах и дополнительно известкуются рыхлосупесчаные почвы с рН_{KCl} 5,51–5,75, связано супесчаные – с рН_{KCl} 5,51–6,00. При уровне загрязнения 185–1480 кБк/м² (5–40 Ки/км²) по ¹³⁷Cs или 11–111 кБк/м² (0,3–3,0 Ки/км²) по ⁹⁰Sr дозы известковых удобрений повышаются из

расчета доведения реакции почвенной среды до оптимального уровня за один прием.

Почвы 1-й–2-й групп кислотности подлежат первоочередному известкованию в связи с высоким переходом радионуклидов в растения. В случае, когда разовая доза превышает 8 т/га, известь вносится в два приема: 0,5 дозы под вспашку и 0,5 дозы под культивацию при перепахивании или коренном улучшении [14].

Следует предусмотреть в виде исключения поверхностное известкование кислых пойменных почв. Опыты, проведенные в пойме р. Сож (Кормянский район), показали высокую эффективность небольших доз известковых мелиорантов. Рекомендуется внесение доломитовой муки в дозах 2–3 т/га раз в 2–3 года.

Работы по известкованию супесчаных почв с pH 5,51–6,0 и торфоболотных с pH 5,0 и ниже при плотности загрязнения земель по ^{90}Sr 37–185 кБк/м² (1–5 Ки/км²) или 6–11 кБк/м² (0,2–0,3 Ки/км²) по ^{90}Sr , а также на всех кислых почвах с плотностью загрязнения 185–1480 кБк/м² (5–40 Ки/км²) или 11–111 кБк/м² (0,3–3,0 Ки/км²) по ^{90}Sr финансируются за счет средств, направляемых на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС [14].

13. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

13.1. Расчет энергетической эффективности удобрений

Производство продукции растениеводства в земледелии связано с затратами невозобновляемой энергии, в том числе и за счет применения удобрений. Поэтому важно разрабатывать и использовать энергосберегающие технологии, при которых меньше затрачивается энергии на производство растениеводческой продукции. Это требует знаний по основам расчета энергетической эффективности применения удобрений в прогрессивных технологиях.

Расчеты энергетической эффективности дают более объективное и долгосрочное представление об эффективности удобрений, чем экономическая оценка эффективности удобрений. Это связано с тем, что стоимостные показатели ценности меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры, поэтому их можно использовать только для краткосрочного планирования. Суть энергетического анализа состоит в том, что все количественные показатели – фактическая прибавка урожая

сельскохозяйственных культур от удобрений и затраты на применение удобрений – выражаются в энергетическом эквиваленте – джоулях. Джоуль (Дж) – это единица энергии, работы и количества теплоты в Международной системе единиц, 1 Дж = 0,2388 кал. Более крупные единицы измерения энергии: 1 килоджоуль (КДж) = 10^3 джоулей, 1 гигаджоуль (ГДж) = 10^9 джоулей.

Основными показателями энергетической эффективности применения удобрений являются коэффициент энергетической эффективности и удельные энергетические затраты. Энергетический коэффициент (энергоотдача) – это отношение энергии, содержащейся в прибавке урожая от удобрений, к количеству энергии, затраченной на их применение. Его расчет производится по формуле

$$q = \frac{\mathcal{E}_n}{\mathcal{E}_o},$$

где q – коэффициент энергетической эффективности;

\mathcal{E}_n – количество энергии, полученной в прибавке основной продукции от удобрений, МДж;

\mathcal{E}_o – общие энергетические затраты на производство, доставку, хранение, подготовку, транспортировку и внесение минеральных и органических удобрений, уборку, доработку и реализацию дополнительного урожая за счет удобрений, МДж.

Коэффициент энергетической эффективности больше единицы указывает на то, что удобрения используются эффективно.

Накапливаемая в основной и побочной продукции растениеводства энергия оценивается в джоулях. Содержание энергии в основной (хозяйственно ценной) продукции растениеводства с учетом побочной рассчитывается по формуле

$$\mathcal{E}_n = P \cdot K \cdot 100,$$

где \mathcal{E}_n – содержание энергии в основной продукции растениеводства, МДж/га;

P – прибавка урожая от удобрений, ц/га;

K – количество энергии в 1 кг основной продукции в натуре (прил. 56), МДж;

100 – коэффициент пересчета ц в кг.

Энергозатраты на минеральные удобрения под культуры, связанные с их производством, рассчитываются по формуле

$$\mathcal{E}_y = (D_N \cdot \mathcal{E}_N) + (D_P \cdot \mathcal{E}_P) + (D_K \cdot \mathcal{E}_K) \text{ МДж/га},$$

где D_N , D_P , D_K – фактическая доза внесения соответственно азотных, фосфорных и калийных удобрений по д. в. кг/га,

$\mathcal{E}_N, \mathcal{E}_P, \mathcal{E}_K$ – энергетические затраты на 1 кг д. в. азотных, фосфорных и калийных удобрений (прил. 57), МДж/га.

Затраты, связанные с подготовкой, погрузкой, транспортировкой и внесением минеральных удобрений:

$$\mathcal{E}_B = 171,4 + (8,0974D) + (1,2954P) + (2,804DP) - (0,1553 \cdot P^2),$$

где \mathcal{E}_B – общие энергозатраты на подготовку, погрузку, транспортировку и внесение удобрений, МДж/га;

D – доза удобрений в физической массе, ц;

P – расстояние перевозки удобрений от склада хозяйства до поля, км.

Затраты на доставку удобрений от прирельсовой базы в хозяйство в среднем в РБ составляют 22 МДж на 1 т/км, на хранение в складах хозяйства 38,8 МДж/т. Средние энергозатраты на хранение, транспортировку и внесение 1 ц минеральных удобрений в зависимости от дальности перевозки приведены в прил. 60.

Энергозатраты на погрузку, транспортировку и внесение органических удобрений приводятся в прил. 58, а на уборку, доработку и реализацию дополнительного урожая за счет удобрений – в прил. 59. Общие затраты энергии при применении удобрений складываются из энергозатрат на производство удобрений, их транспортировку, погрузку и внесение, а также на уборку, доработку и реализацию дополнительного урожая.

Например, требуется рассчитать энергетическую эффективность применения удобрений под озимую рожь. От хозяйства до базы 15 км. Под озимую рожь внесены минеральные удобрения в дозе $N_{80}P_{50}K_{60}$ (аммиачная селитра – 2, аммофоса – 1, хлористого калия – 1 ц/га) в физической массе.

У нас под озимую рожь внесено 190 кг NPK. В прил. 1 находим, что окупаемость 1 кг NPK у озимой ржи составляет 5,1 кг зерна. Следовательно, прибавка урожая зерна этой культуры от применения удобрений составит 9,7 ц ($190 \cdot 5,1 = 969$ кг).

Зная, сколько содержится энергии в кг продукции в натуре (прил. 56), находим количество энергии накопленное в прибавке урожая: $\mathcal{E}_n = P \cdot K \cdot 100 = 9,7 \cdot 16,76 \cdot 100 = 16257$ МДж.

Рассчитываем по вышеприведенной формуле энергозатраты, связанные с производством минеральных удобрений.

$$\mathcal{E}_y = 80 \cdot 80,6 + 50 \cdot 12,6 + 60 \cdot 8,3 = 8055 \text{ МДж/га.}$$

Энергозатраты на доставку удобрений в хозяйство с базы

$$\mathcal{E}_d = 0,4 \cdot 15 \cdot 22 = 132 \text{ МДж/га.}$$

Энергозатраты, связанные с хранением удобрений в хозяйстве

$$\mathcal{E}_x = 38,8 \cdot 0,4 = 15,52 \text{ МДж/га.}$$

Энергозатраты на подготовку, погрузку, транспортировку (на 5 км) и внесение минеральных удобрений

$$\mathcal{E}_b = 171,4 + (8,0974 \cdot 4) + (1,2954 \cdot 5) + 2,804 \cdot 445 - (0,1553 \cdot 25) = 262,467 \text{ МДж/га.}$$

Общие энергозатраты \mathcal{E}_o , связанные с применением удобрений

$$\mathcal{E}_o = \mathcal{E}_y + \mathcal{E}_d + \mathcal{E}_x + \mathcal{E}_b = 8055 + 132 + 15,52 + 262,467 = 8465,0 \text{ МДж/га.}$$

Рассчитываем также энергозатраты, связанные с уборкой, доработкой и реализацией прибавки урожая. Нормативы энергозатрат на уборку, доработку и реализацию прибавки урожая, полученного за счет применения удобрений, приведены в прил. 59. Энергозатраты на уборку, доработку и реализацию 1 ц прибавки урожая зерна составляют 328 МДж, а на всю прибавку: $\mathcal{E}_n = 328 \cdot 9,7 = 3\,183 \text{ МДж.}$

Общие энергозатраты (\mathcal{E}_o) на применение удобрений, уборку, доработку и реализацию прибавки урожая составят:

$$\mathcal{E}_o = \mathcal{E}_y + \mathcal{E}_n = 8464 + 3187 = 11652 \text{ МДж.}$$

Находим энергетический коэффициент (q), который представляет собой частное от деления выхода энергии с прибавкой урожая на общие энергозатраты, связанные с применением удобрений, уборкой, доработкой и реализацией прибавки урожая, полученной от применения удобрений.

$$q = \frac{\mathcal{E}_n}{\mathcal{E}_o} = \frac{16257}{11652} = 1,4.$$

Поскольку биоэнергетический коэффициент получился больше единицы, применение удобрений под озимую рожь является оправданным с энергетической точки зрения.

Важным показателем являются также удельные энергозатраты на производство 1 ц сельскохозяйственной продукции [6].

Они определяются делением общих энергозатрат на прибавку урожая. В нашем примере удельные энергозатраты на производство 1 ц зерна озимой ржи составляет: $11652 : 9,7 = 1201 \text{ МДж.}$

Все расчеты приведены в табл. 67.

При расчете затрат на производство, хранение, погрузку, транспортировку и внесение органических удобрений под культуру с учетом их действия и последствия на последующие культуры севооборота 60 % из них необходимо относить на первый год, 25 % – на второй и 15 % – на третий. С учетом этого затраты на производство, хранение, погрузку, транспортировку и внесение навоза составят:

$$B = A_1 + X_1 + Y_1,$$

где A_1 – затраты на производство органических удобрений, МДж/т физической массы (прил. 22);

X_1 – затраты на хранение органических удобрений, МДж/т физической массы (прил. 22);

Y_1 – затраты на погрузку, транспортировку и внесение органических удобрений, МДж/т (расстояние 5 км) (прил. 73).

Таблица 67. Энергетическая эффективность применения удобрений

| Сельскохозяйственные культуры | Прибавка урожая, ц/га | Энергозатраты на удобрения, уборку, доработку и реализацию урожая, МДж | Содержание энергии в прибавке урожая, МДж | Удельные энергозатраты, МДж/ц | Биоэнергетический коэффициент |
|-------------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Озимая рожь | 9,7 | 11652 | 162257 | 1201 | 1,4 |

13.2. Расчет экономической эффективности удобрений

Очень важное значение имеет экономическая оценка применения удобрений. Однако цены на удобрения и сельскохозяйственную продукцию меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры, поэтому их можно планировать только для краткосрочного планирования.

На основании полученных данных: расчетной прибавки продукции на 1 кг NPK, прибавки урожая на гектар посева за счет удобрений и нормативов затрат, связанных с применением удобрений, определяются экономические показатели. Прибавка урожая за счет удобрений рассчитывается умножением дозы удобрений, вносимых под культуру на нормативную окупаемость (1 кг NPK или 1 т органических удобрений (табл. 68, 69). Основными показателями экономической эффективности удобрений являются: прибыль (чистый доход) на гектар посева от применения удобрений и его производные – рентабельность, или прибыль на единицу произведенных затрат (один рубль, один долл. США, один Евро), на единицу внесенных удобрений (на 1 т NPK, на 1 т навоза).

Для определения прибыли предварительно рассчитывается стоимость прибавки урожая, полученного за счет удобрений, и затраты на получение прибавки урожая от удобрений.

Стоимость прибавки продукции, полученной за счет удобрений, может быть определена по закупочным ценам или усредненным ценам реализации продукции.

**Таблица 68. Цена балла плодородия почв Беларуси
(урожайность культур без удобрений)**

| Культуры | Вид продукции | Цена балла почв, кг продукции |
|--|------------------|-------------------------------|
| Зерновые и зернобобовые | Зерно | 60 |
| Озимая рожь | Зерно | 57 |
| Озимая пшеница | Зерно | 65 |
| Озимая тритикале | Зерно | 68 |
| Яровая пшеница | Зерно | 60 |
| Ячмень | Зерно | 60 |
| Овес | Зерно | 60 |
| Гречиха | Зерно | 30 |
| Кукуруза | Зерно | 73 |
| Зернобобовые (горох) | Зерно | 37 |
| Озимый рапс | Семена | 35 |
| Яровой рапс | Семена | 25 |
| Лен-долгунец | Волокно | 20 |
| Сахарная свекла | Корнеплоды | 600 |
| Картофель | Клубни | 340 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 470 |
| Многолетние бобово-злаковые травосмеси | Зеленая масса | 365 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 265 |
| Все с.-х. культуры на пахотных землях | Зормовые единицы | 80 |
| Улучшенные сенокосы и пастбища | Зеленая масса | 350 |

Ориентировочная оценочная средневзвешенная стоимость урожая всех сельскохозяйственных культур на пашне в эквиваленте кормовых единиц, 1 т к. ед. – 112,3 долл. США. Ориентировочная стоимость кормовых культур (зеленая масса кукурузы, однолетних трав, многолетних трав на пашне и улучшенных сенокосах и пастбищах по эквиваленту закупочной цены 1 т фуражного зерна ячменя и овса) 1 т к. ед. – 76,0 долл. США.

Определение затрат на прибавку урожая от удобрений рассчитывается по формуле

$$З_{\text{НПК}} = З_{\text{уд}} + З_{\text{вн}} + З_{\text{уб}},$$

где $З_{\text{уд}}$ – затраты на приобретение минеральных удобрений в ассортименте с доставкой в хозяйство (цена + наценка Агросервиса);

$З_{\text{вн}}$ – затраты на разгрузку, хранение, подготовку, погрузку, перевозку в поле и внесение удобрений;

$З_{\text{уб}}$ – затраты на уборку, перевозку, доработку и реализацию прибавки урожая, полученной за счет удобрений.

Нормативы затрат на внесение минеральных и органических удобрений представлены в табл. 70, 71. Нормативы включают затраты на

внесение минеральных удобрений при транспортировке их от базы Агросервиса до хозяйственного склада на расстояние от 20 до 50 км, а далее от склада до поля от 5 до 15 км по прямоточной технологии. Нормативы разработаны по видам удобрений (NPK) и по формам (твердые / жидкие).

Таблица 69. Нормативы окупаемости удобрений прибавкой урожая сельскохозяйственных культур

| Культуры, продукция | Дозы удобрений | | Прибавка, кг продукции | | |
|---|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------|--|
| | Органических, т/га | NPK, кг/га | на 1 т органических удобрений | на 1 кг NPK, в среднем | на 1 кг NPK, по баллу плодородия $O_{NPK} = 1,07 + 0,190 x$, где x – балл |
| Зерновые и зернобобовые, зерно | | 250–400 | 25 | 7,0 | $1,07 + 0,190 x$ |
| Озимая рожь, зерно | 30–50 | 220–280 | 30 | 6,5 | $1,09 + 0,173 x$ |
| Озимая пшеница, зерно | 30–50 | 300–400 | 30 | 7,8 | $1,30 + 0,208 x$ |
| Озимая тритикале, зерно | 30–50 | 300–400 | 30 | 8,0 | $1,34 + 0,213 x$ |
| Яровая пшеница, зерно | 30–40 | 250–300 | 20 | 7,3 | $1,22 + 0,195 x$ |
| Яровой ячмень, зерно | | 250–300 | 20 | 6,7 | $1,12 + 0,179 x$ |
| Овес, зерно | | 220–280 | 20 | 6,3 | $1,00 + 0,160 x$ |
| Гречиха, зерно | | 140–190 | | 3,5 | |
| Кукуруза, зерно | 40–60 | 300–400 | 33 | 9,4 | $1,57 + 0,250 x$ |
| Зернобобовые (горох) | | 180–240 | | 5,5 | $0,95 + 0,152 x$ |
| Озимый рапс, семена | | 300–400 | | 4,0 | $0,67 + 0,107 x$ |
| Яровой рапс, семена | | 280–360 | | 3,0 | $0,50 + 0,080 x$ |
| Лен-долгунец, волокно | | 180–230 | | 2,7 | $0,45 + 0,072 x$ |
| Сахарная свекла, корни | 60–70 | 400–500 | 150 | 55 | $9,20 + 1,466 x$ |
| Картофель, клубни | 40–60 | 200–300 | 105 | 27 | $4,52 + 0,720 x$ |
| Кукуруза, з. масса | 60–80 | 300–450 | 190 | 60 | $10,0 + 1,60 x$ |
| Многолетние травы на пашне, зеленая масса | | 200–300 | | 70 | $11,72 + 1,866 x$ |
| Однолетние травы, зеленая масса | | 150–200 | | 48 | $8,03 + 1,280 x$ |
| Все культуры на пашне, к. ед. | | 250–350 | 35 | 9,0 | $1,51 + 0,240 x$ |
| Улучшенные сенокосы и пастбища, зеленая масса | | 150–300 | | 62 | $11,72 + 1,866 x$ |

Нормативы затрат на уборку, перевозку, доработку и реализацию прибавки урожая, полученного за счет удобрений, приводятся в табл. 71. Они разработаны с учетом современных технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур (технологических карт).

Таблица 70. Нормативы затрат на внесение минеральных удобрений («франко-почва») на 1 т ф. в. и 1 т д. в.

| Расстояние от базы СХХ до хоз- склада, км | Расстояние от склада до поля, км | Форма удобрения | Затрат на 1 т ф. в., эквива- лент в долл. США | Затраты на 1 т д. в., эквивалент в долл. США | | |
|--|--|---------------------|--|---|-------------------------------|------------------|
| | | | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Прямоточная технология | | | | | | |
| 20 | 5 | твердые / жидкие | 24,3 / 53,0 | 65,8 / 176,9 | 46,0 | 31,5 |
| | 10 | | 26,4 / 60,2 | 71,5 / 200,8 | 64,5 | 44,1 |
| | 15 | | 28,5 / 68,8 | 77,2 / 229,7 | 69,6 | 47,6 |
| 30 | 5 | твердые / жидкие | 26,7 / 60,0 | 72,4 / 199,9 | 65,4 | 44,7 |
| | 10 | | 28,9 / 67,2 | 78,0 / 224,0 | 70,3 | 48,1 |
| | 15 | | 30,9 / 75,8 | 83,7 / 252,6 | 71,2 | 51,6 |
| 40 | 5 | твердые / жидкие | 29,2 / 67,0 | 79,0 / 223,4 | 71,3 | 48,7 |
| | 10 | | 31,3 / 74,1 | 84,7 / 247,3 | 76,3 | 52,1 |
| | 15 | | 33,4 / 82,8 | 90,2 / 276,1 | 81,5 | 55,6 |
| 50 | 5 | твердые/ жидкие | 31,9 / 74,8 | 86,3 / 249,3 | 77,8 | 53,2 |
| | 10 | | 34,0 / 82,0 | 91,9 / 273,5 | 82,9 | 56,7 |
| | 15 | | 36,1 / 90,6 | 97,5 / 244,8 | 90,1 | 60,2 |
| Перегрузочная технология | | | | | | |
| 20 | 5 | твердые / жидкие | 32,4 / 62,7 | 87,8 / 177,2 | 79,2 | 54,1 |
| 30 | | | 34,1 / 60,0 | 92,2 / 200,0 | 83,3 | 56,9 |
| 40 | | | 36,6 / 67,1 | 98,9 / 210,5 | 89,2 | 61,9 |
| 50 | | | 39,3 / 74,8 | 106,2 / 302,0 | 95,8 | 65,4 |

Прибыль от применения удобрений (П) на один гектар посева определяется по разности между стоимостью прибавки урожая (C_n) от удобрений и затратами ($З_n$) на получение прибавки урожая от удобрений по формуле

$$П = C_n - З_n.$$

Важным информативным показателем является удельная прибыль на единицу затрат ($П_p$), которая определяется делением прибыли, полученной от применения удобрений на гектаре посева, на сумму затрат на получение прибавки урожая от удобрений по формуле

$$П_p = П / З_n.$$

Рентабельность – это прибыль на один рубль, затраченный на применение удобрений, выраженная в процентах. Рентабельность определяется как произведение прибыли на рубль затрат ($П_p$), умноженной на 100, и выражается в процентах (%).

Прибыль на 1 т действующего вещества ($П_{НРК}$) определяется делением величины прибыли на гектар посева на дозу удобрений ($Д_{НРК}$) и умножением на 1000 по формуле

$$П_{НРК} = П / Д_{НРК}.$$

Таблица 71. Нормативы затрат на уборку, доработку и реализацию прибавки урожая, полученного за счет применения удобрений

| Культуры | Продукция | Затраты на 1 т, эквивалент в долл. США |
|---|-------------------|--|
| Озимые зерновые | Зерно | 31,6 |
| Яровые зерновые | Зерно | 33,0 |
| Рапс яровой | Семена | 52,0 |
| Рапс озимый | Семена | 50,0 |
| Картофель | Клубни | 14,1 |
| Сахарная свекла | Корнеплоды | 11,7 |
| Кукуруза | Силос | 6,3; 15,5 (упаковка в рукав) |
| Лен-долгунец | Семена | 141,0 |
| | Льнотреста | 33,5 |
| | Льноволокно | 152,2 |
| Многолетние травы, 1 улучшенные сенокосы | Зеленая масса | 4,6 |
| | Сенаж | 9,8 |
| | Прессованное сено | 11,0 |
| Морковь | Корни | 27,9 |
| Капуста белокочанная | Кочаны | 14,0 |
| Лук репка | Лук | 28,8 |
| Стоимость уборки 1 т к. ед. | | 25,0 |

Пример расчета экономической эффективности применения удобрений под ячмень (в эквиваленте долл. США).

Исходные данные:

- прибавка урожая за счет действия минеральных удобрений – 19,9 ц/га;

- внесено NPK, кг/га – 292;

- внесено N, кг/га – 117;

- внесено P, кг/га – 46;

- внесено K, кг/га – 129.

Стоимость прибавки урожая за счет минеральных удобрений – $(19,9 \cdot 151,5) : 10 = 301,5$ долл. США. Цена пивоваренного ячменя 3-го класса 151,5 долл. США).

Затраты на приобретение удобрений –

$[(117 \times 518) + (46 \times 932) + (129 \times 107)] : 1000 = 106,6$ долл. США.

Затраты 518, 932, 107.

Затраты на транспортировку и внесение удобрений –

$[(117 \times 71,5) + (46 \times 64,5) + (129 \times 44,1)] : 1000 = 17,0$ долл. США.

Затраты 71,5, 64,5, 44,1 – табл. 70.

Затраты на уборку прибавки дополнительного урожая –

$(17,8 \times 33,0) : 10 = 58,7$. Затраты 33,0 – табл. 71.

Всего затрат, связанных с применением удобрений – $106,6 + 17,0 + 58,7 = 182,3$ долл. США,

Прибыль от применения минеральных удобрений составит – $301,5 - 182,3 = 119,2$ долл. США.

Прибыль на единицу затрат составит – $119,2 : 182,3 = 0,65$ долл. США.

Рентабельность применения минеральных удобрений – $0,65 \cdot 100 = 65 \%$.

Для определения экономической эффективности удобрений необходимо ежегодно обновлять исходные данные по стоимости удобрений и стоимости прибавки урожая. Поскольку цены на минеральные удобрения, закупочные цены или цены реализации продукции различных сельскохозяйственных культур ежегодно меняются. Использование усредненных нормативов затрат на уборку, доработку и реализацию прибавки урожая за счет удобрений (табл. 71) позволяет наиболее объективно сравнивать эффективность использования удобрений между крупными территориальными подразделениями (районами, областями). В отдельных хозяйствах, где имеются квалифицированные экономисты, предпочтительно использовать фактические затраты на уборку каждой культуры. Методическое сопровождение оценки эффективности удобрений по хозяйствам, районам и областям Беларуси, периодическое обновление нормативной базы для расчетов, обобщение и анализ полученных результатов проводит РУП «Институт почвоведения и агрохимии». В табл. 72, 73 приведены формы для расчета агрономической и экономической эффективности удобрений.

Таблица 72. Нормативы затрат на внесение твердых органических удобрений (навоз/ТНК) («франко-почва») на 1 т

| Состав агрегата | Расстояние, км | Затраты на 1 т, эквивалент в USD |
|--|----------------|----------------------------------|
| Прямоточная технология | | |
| МТЗ-1522 + ПРТ-11 МТЗ-1522 + ПРТ-7А | 5 км 60 т/га | 2,53 / 2,86 |
| | 5 км 25 т/га | 3,73 / 4,06 |
| | 10 км 60 т/га | 3,33 / 3,66 |
| | 10 км 25 т/га | 5,03 / 5,36 |
| Перегрузочная технология | | |
| МТЗ-1522 + ПРТ-11 МТЗ-1522 + ПРТ-7А | 5 км 60 т/га | 3,47 / 3,80 |
| | 5 км 25 т/га | 4,54 / 4,87 |
| | 10 км 60 т/га | 4,27 / 4,60 |
| | 10 км 25 т/га | 5,84 / 6,17 |
| Затраты на приготовление и хранение: | | |
| соломистого навоза | | 1,02 |
| ТНК | | 1,69 |

Таблица 73. **Экономическая эффективность минеральных и органических удобрений (форма для расчета)**

| Наименование хозяйства | Балл пашни | Урожай за счет плодородия | Внесено на 1 га | | Прибавка за счет удобрений, ц/га | Урожай, ц/га | | Окупаемость, кг продукции | |
|------------------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | | | кг NPK | т органических | | расчетный | фактический | кг NPK | т органических |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

14. ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Твердые минеральные удобрения. В зависимости от расстояния перевозки удобрений, наличия машин, доз удобрений, организации работ по подготовке, погрузке, транспортировке и внесению удобрений используют все три технологические схемы: прямоточную, перевалочную, перегрузочную.

При *прямоточной* схеме машины для внесения удобрений транспортируют и разбрасывают удобрения. Она эффективна при небольшой удаленности полей от склада, а также при использовании автомобильных разбрасывателей.

Перегрузочная и перевалочная схемы предполагает использование для перевозки транспортных средств, а для внесения – специализированных машин для внесения удобрений. Перевалочная технология к тому же требует мест перевалки (оборудованные площадки или временные площадки на поле).

При *перегрузочной* технологии загруженные на складе удобрения доставляются на поле транспортными средствами (автосамосвалами, тракторными прицепами, автопогрузчиками и т. д.), затем их перегружают в машины для внесения (разбрасыватели, комбинированные сеялки и т. д.).

При *перевалочной* технологии удобрения загружают в транспортные средства, перевозят к местам внесения, там выгружают на временные площадки, а затем с помощью транспортных и других погрузчиков или вручную загружают в используемые для внесения агрегаты.

Для внесения удобрений используют прицепные и навесные тракторные центробежные разбрасыватели, автомобильные разбрасыватели, туковые сеялки. Выбор комплекса машин определяется приемом и способом внесения твердых минеральных удобрений.

Основное (разбросное) внесение твердых минеральных удобрений может осуществляться любыми машинами, представленными в табл. 74, 75. Основными техническими средствами для внесения твердых минеральных удобрений в республике являются машины с центробежными дисковыми распределяющими рабочими органами. Более перспективны для внесения таких удобрений штанговые (шнековые) машины типа СУ-12, РШУ-12 отечественного производства, которые более равномерно вносят удобрения по сравнению с центробежными разбрасывателями. В последнее время Бобруйскагромаш выпускает распределитель минеральных удобрений РУ-7000А.

Для внесения твердых минеральных удобрений целесообразно использовать современные разбрасыватели ведущих мировых производителей RAUCH (модели МДС 935, Аксис 30,1, TBC 5000), GASPARDO (модели ZENO-18, XPL 800 и др.), AGREX (модели MAXI 4000), SIPMA, UNIA и др., которые позволяют вносить удобрения с неравномерностью не более 15 %.

В настоящее время отечественными производителями сельскохозяйственной техники созданы зернотуковые сеялки, осуществляющие припосевное внесение твердых минеральных удобрений (С-6-Т, СТВ-8КУ, СТВ-12У, СЗ-3,6). Для внесения минеральных удобрений можно использовать машины для внесения удобрений, комбинированные сеялки и агрегаты зарубежного производства.

Не менее перспективно использование современных посевов комплексов, которые одновременно с посевом сельскохозяйственных культур вносят минеральные удобрения (LEMKEN и др.).

Поверхностная подкормка сельскохозяйственных культур доводится машинами, используемыми для основного внесения. При этом лучшей техникой, обеспечивающей более равномерное точное внесение твердых минеральных удобрений, являются туковые сеялки СУ-12, РШУ-12.

Жидкие минеральные удобрения. Работы по внесению жидких комплексных удобрений (ЖКУ) и карбамид-аммиачной селитры (КАС) также могут быть организованы по прямоточной, перегрузочной и перевалочной технологическим схемам. При этом прямоточная технология рациональна, если расстояние перевозки не превышает 25 км. Перегрузочная технология предполагает транспортировку жидких минеральных удобрений транспортными средствами, в частности, автомобилями-цистернами АЦ-4,2, и заправки из них техники для внесения жидких минеральных удобрений. Для перевалочной технологии нужны полевые стационарные хранилища, из которых заправляются машины для внесения удобрений.

Таблица 74. Машины для внесения твердых минеральных и известковых удобрений

| Показатели | Марка машины | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 1-РМТ-4А | МВУ-6 | МВУ-8 | МВУ-16 | СТТ-10 | КСА-3 | МХА-7 |
| Агрегируется | МТЗ-80/82 | МТЗ-80/82 | Т-150 | К-701 | МТЗ-80/82 | ЗИЛ-555 | Урал-5557 |
| Грузоподъемность | 4 | 6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 |
| Ширина распределения удобрений, м | 7–12 | 8–16 | 14,5–19,0 | 10,0–21,5 | 10,5–17,5 | 8,5–13,0 | 13,5–21,5 |
| Доза внесения удобрений, кг/га | 100–1000 | 150–10000 | 100–9700 | 100–1660 | 60–1320 | 100–8800 | 450–11010 |
| Неравномерность внесения по ширине, ± % | 25 | 20–22 | 25 | 20–22 | 11–17 | 25 | 25 |

Таблица 75. Машины для внесения удобрений белорусского производства

| Машина | Марка машины | Объем бункера, л | Грузо-подъемность, т | Ширина распределения удобрений, л | Рабочая скорость, км/ч | Неравномерность \pm внесения, % | Доза внесения удобрений, кг/га | Производительность, га/ч | Трактор, кл. т. с. |
|---|--------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Известковые удобрения | | | | | | | | | |
| Машина для внесения химмелиорантов | МШХ-9 | | 12 | 6,5 | 6–12 | 15 | 3–6 | 9 | |
| Машина химизации самоходная | МСХ-10 | | 12 | 10,8–22* | 6–12 | 15 | 2000–6000, 150–100* | 2,5, 6–12* | |
| Минеральные удобрения | | | | | | | | | |
| Рассеиватель минеральных удобрений | РУ-1600 | 1380 | 1,6 | 12–28 | 8–12 | 10–16 | 40–1100 | 25 | 0,9–1,4 |
| – // – | РУ-3000 | 2470 | 3,0 | 12–28 | 8–12 | 10–16 | 40–1100 | 25 | 2,0 |
| – // – | РУ-7000 | | 7,0 | | | | | | |
| Машина для внесения твердых минеральных удобрений | МТТ-4У | 3900 | 4,5 | 16–24 | 8–12 | 10 | 60–2500 | 9–21 | 0,9–1,4 |
| – // – | АВУ-0,8 | 800 | 0,8 | 10–24 | 3–12 | 10 | 40–1000 | 25 | 0,9–2,0 |
| – // – | АВУ-1,5 | 1500 | 1,5 | 10–24 | 3–12 | 10 | 40–1000 | 25 | 1,4–2,0 |
| Машина штанговая для внесения минеральных удобрений | МШВУ-18 | 9 | 9 | 18 | 8–12 | 3,7 | 100–700 | 18–20 | 2,0–3,0 |
| Разбрасыватель минеральных удобрений (дисковый) | РДУ-1,5 | 1100 | 1,5 | 10–24 | 3–12 | 10–16 | 50–500 | 12–16 | 1,4–2,0 |
| – // – | РДУ-3,6 | | 3,6 | 10–20 | 8–12 | 10–16 | 50–500 | 12–16 | 1,4–2,0 |
| – // – | РДУ-8,5 | | 8,5 | 10–28 | 8–12 | 10–16 | 50–500 | 16–20 | 1,4–2,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------|---------|-------|------|-----------|-------|---------|
| Разбрасыватель минеральных удобрений | РПУ «РОСА» | 0,8 | 1,0 | 14–18 | 18–22 | 20 | 40–300 | 10–22 | |
| Машина для подкормки с.-х. культур | РМУ-1,6 | | 1,6 | 10–12 | 8–12 | 10 | 40–1000 | | |
| Рассеиватель минеральных удобрений | РМУ-8000 | | 8,0 | | | | | | |
| Разбрасыватель минеральных удобрений | Л-116 | | | 8–24 | 6–15 | 10 | 40–1000 | 8–16 | 0,9–2,0 |
| Сеялка для внесения минеральных удобрений | СУ-12-01 | 850 | | 12 | 10–12 | 4 | 10–240 | 7–12 | 1,4–2,0 |
| Подкормщик штанговый навесной | РШУ-12 | | 0,55 | 10–12 | 10–11 | 8–11 | 60–300 | 7 | 1,4 |
| Машина для внесения удобрений и семян многолетних трав | РУС-07А | 580 | | 12,5 | | | 45–1000 | 13 | 1,4 |
| Минеральные удобрения (при посеве) | | | | | | | | | |
| Сеялка зернотуковая универсальная | С6-Т | 240 | | 6 | 15 | | | | 1,4–2,0 |
| Сеялка точного высева с внесением удобрений | СТВ-8КУ | 280 | | 4,8–6,0 | | | 40–400 | 2,2 | 1,4 |
| Сеялка точного высева с внесением удобрений | СТВ-12У | 80 и 160 | | 5,4–6,0 | | | 60–600 | 3,2 | 1,4–2,0 |
| Жидкие минеральные удобрения | | | | | | | | | |
| Машина для внесения жидких минеральных удобрений | АПЖ-12 | | | 12 | | 5 | 80–300 | 10 | 1,4 |
| Самоходный опрыскиватель | «РОСА-05» | 0,6 | | 10,5 | 20–40 | 0 | 10–60 (л) | 60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------|---|------|------|------|---|-------|---|---------|
| Твердые органические удобрения | | | | | | | | | |
| Машина для внесения твердых органических удобрений | МТТ-4 | | 4,5 | 4–8 | | | 10–40 | | 0,9 |
| – // – | МТТ-9 | | 9 | 4–8 | | | 20–60 | | 0,9–1,4 |
| Прицеп-разбрасыватель органических удобрений | ПРТ-7А | | 7,3 | 5–8 | | | 10–60 | | 1,4 |
| – // – | ПРТ-11 | | 11,0 | 5–8 | | | 20–60 | | 3,0 |
| Жидкие органические удобрения | | | | | | | | | |
| Машина для внесения жидких органических удобрений | МЖТ-Ф6 | | 6 | 6–12 | 7–12 | | 10–60 | | 1,4 |
| – // – | МЖТ-Ф8 | | 8 | 6–12 | 7–12 | | 10–60 | | 1,4–2,0 |
| – // – | МЖТ-Ф11 | | 11 | 6–12 | 7–12 | | 10–60 | | 2,0–3,0 |
| – // – | МЖТ-Ф19 | | 20 | 6–12 | 7–12 | | 20–60 | | 2,0–3,0 |

Поверхностное внесение жидких минеральных удобрений может выполняться машиной для внесения жидких минеральных удобрений АПЖ-12 и ее аналогами (ПОМ-2000, Микосан и др.). Для внутрипочвенного внесения ЖКУ используется машина ОВЖ-2000, которая одновременно проводит чизелевание почвы. Ее целесообразно использовать на склоновых землях.

Твердые органические удобрения от мест накопления к месту внесения доставляют по прямоточной (ферма – поле) и перевалочной (ферма – бурт – поле) технологическим схемам. При *прямоточной* технологии удобрение транспортируют и вносят на поле одними и теми же машинами для внесения органических удобрений. Такую схему используют только при небольших объемах работ и малом расстоянии перевозки (до 8 км от места накопления до поля).

Перевалочную технологию применяют на крупных животноводческих комплексах с большим выходом органических удобрений. По этой технологии удобрения от фермы вывозят на поле в течение всего года, укладывают в штабеля и в последующем распределяют по полю. Перевалочная технология сокращает расстояние проездов машин для внесения удобрений. Для транспортировки удобрений применяют универсальные тракторные прицепы или автомобили-самосвалы. На погрузке органических удобрений используют фронтально-перекидные и грейферные погрузчики.

Основными машинами для внесения твердых органических удобрений являются ПРТ-7А, ПРТ-11; МТТ-4, МТТ-9, МТУ-18.

При использовании гидросмыва на животноводческих комплексах получают жидкий навоз влажностью больше 90 %. В качестве жидкого удобрения используют и навозную жижу.

Жидкие органические удобрения вносят поверхностным способом до посева с последующей заделкой в почву почвообрабатывающими орудиями и в подкормку. Различают несколько технологических схем внесения жидких органических удобрений.

1. *Прямоточная (прифермерское навозохранилище – жижезабрасыватель – поле)*. Удобрение из навозохранилища транспортируют и вносят прицепными цистернами-жижезабрасывателями, оборудованными для самозагрузки и поверхностного внесения. Экономически выгодно использование этой технологии на расстоянии не более 2–10 км.

2. *Перегрузочная технология (навозохранилище – транспортное средство – разбрасыватель на поле)*. В отличие от прямоточной эта

технология предусматривает необходимость перегрузки навоза из транспортной машины в технологическую. Она включает загрузку удобрения из прифермерского навозохранилища в транспортную машину и доставку его до поля, перегрузку удобрения в полевой тракторный жижеразбрасыватель и внесении жидкого навоза в поле.

3. *Перевалочная (прифермерское навозохранилище – транспортное средство – полевое хранилище – жижеразбрасыватель – поле)*. Удобрение из навозохранилища транспортируют машинами для внесения жидкого навоза в полевое хранилище, из которого в установленные сроки внесения навоза загружают в цистерны разбрасыватели, с помощью которых распределяют его по полю.

4. *Комбинированная (прифермерское навозохранилище – трубопровод – жижеразбрасыватель – поле)* включает выгрузку навоза из навозохранилища насосными установками и транспортировку его по трубопроводу, загрузку машин для внесения жидких органических удобрений через заправочные гидранты, транспортировку и внесение органических удобрений на поле. Для транспортировки навоза в поле используют разборные трубопроводы из комплектов поливных установок.

Для внесения жидких органических удобрений по этим схемам используют тракторные прицепы цистерны-жижеразбрасыватели МЖТ-Ф6, Ф8, Ф11, Ф19, МЖУ-20 и их аналоги. Эти машины оборудованы вакуумными заправочными устройствами, осуществляющими самозагрузку цистерны.

Внутрипочвенное внесение жидкого навоза может осуществляться инжекторами с различными системами заделки культиваторного типа на глубину 13–15 см (Terraflax), дискового типа на глубину 3–5 см (Solodisc). Перспективно на холмистых землях использовать инжектор ABONO “DI”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Стоимость 1 тонны минеральных удобрений

| Форма удобрений | Без НДС | | | С НДС (18 %) |
|---|------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| | Содержание д. в., % | \$ | | \$ 1 т д. в. |
| | | 1 т ф. в. | 1 т д. в. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азотные удобрения | | | | |
| Карбамид, высший сорт | 46,2 | 181,2 | 392,2 | 463 |
| Карбамид, первый сорт | 46,2 | 181,2 | 392,1 | 463 |
| Карбамид, второй сорт | 46,2 | 181,1 | 392,0 | 463 |
| Карбамид с гуматами | 46,2 | 205,7 | 445,2 | 525 |
| Среднее по карбамиду | | | 392,1 | 463 |
| Сульфат аммония, кристаллический | 21 | 89,7 | 427,1 | 504 |
| Сульфат аммония, защ. покрытие | 21 | 94,0 | 447,4 | 528 |
| Среднее по сульфату аммония | | | 437,3 | 516 |
| КАС | 32 | 132,5 | 414,1 | 489 |
| КАС | 30 | 124,2 | 414,1 | 489 |
| КАС | 28 | 116,0 | 414,1 | 489 |
| Среднее по КАС | | | 414,1 | 489 |
| Карбамид с гуматами | 46,2 | 183,4 | 396,9 | 468 |
| Поступает: карбамида | | | | |
| сульфата аммония | | | | |
| КАС | | | | |
| Усредненный норматив без наценки СХХ | | | 406,8 | 480 |
| Усредненный норматив с наценкой СХХ 8 % | | | 439,3 | 518 |
| Среднее содержание азота | | | | |
| Калийные удобрения | | | | |
| Калий хлористый, гранулированный | 60 | 49,2 | 82,0 | 97 |
| Калий хлористый, мелкокристаллический | 60 | 41,2 | 68,7 | 81 |
| Поступает: гранулированный мелко- кристаллический | | | | |
| Усредненный норматив без наценки СХХ | | | 78,7 | 93 |
| Усредненный норматив с наценкой СХХ 15 % | | | 90,5 | 107 |
| Среднее содержание калия | | | | |
| Фосфорные удобрения | | | | |
| Аммофос – всего NP | 64 | 425,2 | 664,4 | 784 |
| В т. ч.: N | 12 | | | |
| P ₂ O ₅ | 52 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 723,9 | 854 |
| Аммофос – всего NP | 62 | 412,4 | 665,1 | 785 |
| В т. ч.: N | 12 | | | |
| P ₂ O ₅ | 50 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|-------|--------------|-------------|
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 727,1 | 858 |
| Аммофос – всего NP | 62 | 412,4 | 865,1 | 785 |
| В т. ч.: N | 12 | | | |
| P ₂ O ₅ | 50 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 805,0 | 950 |
| Аммофос – всего NP | 56 | 380,3 | 679,1 | 801 |
| В т. ч.: N | 10 | | | |
| P ₂ O ₅ | 46 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 738,3 | 871 |
| Аммофос – всего NP | 58 | 380,3 | 655,7 | 774 |
| В т. ч.: N | 10 | | | |
| P ₂ O ₅ | 48 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 707,5 | 835 |
| Среднее по аммофосу | | | 740,0 | 874 |
| Суперфосфат аммонизированный – всего NP | 38 | 269,6 | 709,4 | 837 |
| В т. ч.: N | 8 | | | |
| P ₂ O ₅ | 30 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 790,1 | 932 |
| Суперфосфат аммонизированный – всего NP | 32 | 227,3 | 710,4 | 838 |
| В т. ч.: N | 7 | | | |
| P ₂ O ₅ | 25 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 795,4 | 939 |
| Суперфосфат аммонизированный – всего NP | 29 | 204,6 | 705,7 | 833 |
| В т. ч.: N | 7 | | | |
| P ₂ O ₅ | 22 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 800,8 | 945 |
| Суперфосфат аммонизированный – всего NP | 26 | 183,6 | 706,3 | 833 |
| В т. ч.: N | 7 | | | |
| P ₂ O ₅ | 19 | | | |
| Стоимость 1 т P ₂ O ₅ за вычетом доли азота | | | 816,7 | 964 |
| Среднее по суперфосфату | | | 788,2 | 930 |
| Среднее по АФК с учетом ассортимента | | | 967,2 | 1141 |
| Поступает (%): аммофоса | | | | |
| суперфосфата аммонизированного | | | | |
| АФК | | | | |
| Усредненный норматив без наценки СХХ | | | 766,6 | 905 |
| Усредненный норматив с наценкой СХХ 3 % | | | 789,6 | 932 |
| Среднее содержание фосфора | | | | |

Средние дозы органических удобрений под сельскохозяйственные культуры

| Культура | Подстилочный навоз, ком- пост, т/га | Жидкий навоз кг/га азота | |
|---|---|-----------------------------|---------|
| | | КРС | Свиньи |
| Картофель: столовый | 40–50 | – | – |
| фуражный | 50–70 | 140–200 | 110–150 |
| Сахарная свекла | 60–70 | – | – |
| Кормовые корнеплоды | 70–80 | 200–250 | 150–180 |
| Кукуруза | 70–80 | 200–250 | 150–180 |
| Овощные культуры | 20–80 | – | – |
| Озимые зерновые | 30–40 | – | – |
| Однолетние травы | 30–40 | 80–100 | 60–80 |
| Многолетние злаковые и бобово-злаковые травы: при перезалужении | 30–40 | 80–100 | 60–80 |
| подкормке | – | 150–250 | 130–180 |
| Луговые земли | – | 140–200 | 110–150 |

Размещение посевов и планируемая урожайность сельскохозяйственных культур на 20 ____ год
Хозяйство _____ Район _____ Область _____

Код формы 03529095

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------|--|--|
| Код хозяйства 0000000 | | | | Количество заполненных строк 000 | | | | | Площадь сельскохозяйственных угодий, га 000000,0 | | | | |
| Номер строки | Площадь поля (рабочего участка), га | Номера эле- ментарных участков, входящих в поле (рабо- чий участок) | Балл пло- дородия поля (рабо- чего участ- ка) | Код предше- ственника | Культура (1-я – основная, 2-я – повторная, 3-я – озимые урожая будущего года) | | | | | Плотность загрязнения, Ку/км² | | | |
| | | | | | Код веге- тации | Код культуры | Планируемая урожайность, ц/га | Планируемое вне- сение органических удобрений | | Цезий | Стронций | | |
| | | | | | | | | Код удоб- рения | Доза, т/га | | | | |
| 000 | 000,0 | 000 | 00 | 000 | 0 | 000 | 0000,0 | 00 | 000 | 00,00 | 0,00 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

М.П.

Дата заполнения

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заполнил

Гл. агроном

Размещение посевов и планируемая урожайность сельскохозяйственных культур на 20 ____ год
Хозяйство _____ Район _____ Область _____

Код формы 03529095

| Код хозяйства 0000000 | | | | | Количество заполненных строк 000 | | | | | Площадь сельскохозяйственных угодий, га 000000,0 | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------|---|--|--------------------|---|---------------|--|
| Номер стро- ки | Площадь поля (рабоче- го участ- ка), га | РН _{ксл} | P ₂ O ₅ , мг/кг | K ₂ O, мг/кг | Гумус, % | Балл пло- дородия поля (ра- бочего участка) | Код предше- ственника | Культура (1-я – основная, 2-я – повторная, 3-я –озимые урожая будущего года) | | | | | Плотность загрязнения, Кг/км ² | | |
| | | | | | | | | Код веге- тации | Код культу- ры | Планируе- мая урожай- ность, ц/га | Планируемое внесение орга- нических удоб- рений | | Це- зий | Строн- ций | |
| | | | | | | | | | | | Код удобре- ния | До- за, т/га | | | |
| 000 | 000,0 | 0,0 0 | 00 0 | 00 0 | 0,0 0 | 00 | 000 | 0 | 000 | 0000,0 | 00 | 000 | 00,00 | 0,00 | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

М.П.

Дата заполнения

«_____» _____ 20 ____ г.

Заполнил

Гл. агроном

Количество и ассортимент минеральных удобрений, подлежащих распределению
Хозяйство _____ **Район** _____ **Область** _____

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Код хозяйства 0000000 | | Количество заполненных строк 000 | | Площадь сельскохозяйственных угодий, га 000000,0 | |
| Виды и формы удобрений | Код удобрений | Количество удобрений | | | |
| | | кг в действующем веществе | | кг в физической массе | |
| | 00 | 00000 | | 000000 | |
| Азотные (наличие) Формы: | | | | | |
| Фосфорные (наличие) Формы: | | | | | |
| Калийные (наличие) Формы: | | | | | |
| Микроудобрения | | | | | |
| Прочие удобрения | | | | | |

М.П.

Дата заполнения

« _____ » _____ 20 ____ г.

Заполнил

Гл. агроном

Классификатор сельскохозяйственных культур и удельный вынос элементов питания урожаем

| Культура | Основная продукция | Код | Вынос урожая, кг с 10 ц основной и соответствующего количества побочной продукции | | |
|--------------------------|--------------------|-----|---|-------------------------------|------------------|
| | | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Озимая пшеница | Зерно | 111 | 28,2 | 10,8 | 19,2 |
| Озимая рожь | - « - | 112 | 28,0 | 12,1 | 23,3 |
| Озимая тритикале | - « - | 113 | 26,0 | 11,5 | 21,0 |
| Озимый ячмень | - « - | 114 | 25,0 | 11,1 | 25,0 |
| Озимая пшеница + травы | - « - | 116 | 28,2 | 10,8 | 19,2 |
| Озимая рожь + травы | - « - | 117 | 28,0 | 12,1 | 23,3 |
| Озимая тритикале + травы | - « - | 118 | 26,0 | 11,5 | 21,0 |
| Озимый ячмень + травы | - « - | 119 | 25,0 | 11,1 | 25,0 |
| Озимые зерновые | Зеленая масса | 633 | 4,8 | 1,2 | 3,9 |
| Озимые зерновые + травы | Зеленая масса | 634 | 4,8 | 1,2 | 3,9 |
| Яровая пшеница | Зерно | 121 | 30,4 | 11,6 | 24,7 |
| Яровая тритикале | - « - | 123 | 26,0 | 11,5 | 21,0 |
| Яровой ячмень | - « - | 124 | 29,1 | 11,9 | 27,4 |
| Овес | - « - | 125 | 25,9 | 12,4 | 28,6 |
| Кукуруза | - « - | 126 | 29,5 | 11,5 | 32,9 |
| Просо | - « - | 127 | 30,0 | 12,0 | 30,0 |
| Гречиха | - « - | 128 | 37,5 | 19,8 | 48,2 |
| Яровая пшеница + травы | - « - | 131 | 30,4 | 11,6 | 24,7 |
| Яровая тритикале + травы | - « - | 133 | 26,0 | 11,5 | 21,0 |
| Яровой ячмень + травы | - « - | 134 | 29,1 | 11,9 | 27,4 |
| Овес + травы | - « - | 135 | 25,9 | 12,4 | 28,6 |
| Зерновые в среднем | - « - | 136 | 28,5 | 12,5 | 26,5 |
| Яровые зерновые | Зеленая масса | 635 | 4,2 | 1,2 | 3,6 |
| Яровые зерновые + травы | - « - | 636 | 4,2 | 1,2 | 3,6 |
| Кукуруза | - « - | 581 | 3,3 | 1,2 | 4,2 |
| Горох | Зерно | 211 | 58,9 | 14,0 | 29,0 |
| Пелюшка | - « - | 212 | 63,6 | 24,9 | 35,6 |
| Кормовые бобы | - « - | 213 | 60,0 | 18,0 | 38,0 |
| Фасоль | - « - | 214 | 45,0 | 10,7 | 37,9 |
| Вика яровая | - « - | 215 | 60,0 | 18,0 | 38,0 |
| Сераделла | - « - | 216 | 60,0 | 18,0 | 38,0 |
| Люпин | - « - | 217 | 84,3 | 19,9 | 44,0 |
| Зернобобовые в среднем | - « - | 218 | 61,7 | 17,6 | 37,2 |
| Горох | Зеленая масса | 611 | 6,5 | 1,5 | 5,0 |
| Пелюшка | - « - | 612 | 4,5 | 1,1 | 3,5 |
| Кормовые бобы | - « - | 613 | 3,2 | 1,0 | 3,5 |
| Вика | - « - | 614 | 4,5 | 1,1 | 3,5 |

Продолжение прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|---------------|-----|------|------|------|
| Сераделла | - « - | 615 | 4,7 | 1,2 | 4,0 |
| Люпин | - « - | 616 | 5,4 | 1,7 | 3,9 |
| Однолетние бобовые травы | - « - | 617 | 4,8 | 1,3 | 3,9 |
| Однолетние бобовые травы | Сено | 618 | 22,8 | 5,6 | 18,0 |
| Горохо-овсяная смесь | Зерно | 221 | 45,5 | 13,4 | 24,4 |
| Пелюшко-овсяная смесь | - « - | 222 | 42,5 | 17,8 | 28,2 |
| Вико-овсяная смесь | - « - | 223 | 43,1 | 15,4 | 30,9 |
| Смесь бобово-злаковых трав | - « - | 224 | 43,7 | 15,5 | 27,8 |
| Однолетние бобово-злаковые | Зеленая масса | 620 | 4,5 | 1,3 | 4,3 |
| Однолетние бобово-злаковые | Сено | 621 | 17,4 | 5,4 | 25,9 |
| Лен-долгунец | Волокно | 411 | 58,1 | 22,9 | 73,0 |
| Конопля | Волокно | 412 | 60,2 | 32,8 | 50,4 |
| Сахарная свекла | Корни | 413 | 4,0 | 1,6 | 6,5 |
| Картофель столовый | Клубни | 511 | 5,4 | 1,6 | 10,7 |
| Картофель семенной | Клубни | 512 | 5,4 | 2,2 | 9,8 |
| Картофель технический | Клубни | 513 | 5,4 | 2,0 | 9,5 |
| Кормовая свекла | Корни | 561 | 3,5 | 1,1 | 7,8 |
| Кормовая брюква | - « - | 562 | 3,0 | 1,0 | 4,3 |
| Кузунку | - « - | 563 | 3,4 | 1,3 | 4,5 |
| Турнепс | - « - | 564 | 2,7 | 1,0 | 3,7 |
| Кормовые корнеплоды | - « - | 565 | 3,0 | 1,1 | 5,1 |
| Кормовая морковь | - « - | 566 | 2,6 | 1,0 | 5,0 |
| Капуста кормовая | Зеленая масса | 567 | 3,9 | 1,6 | 5,3 |
| Капуста белокочанная | Овощи | 521 | 4,0 | 1,0 | 4,3 |
| Огурцы | - « - | 522 | 1,3 | 0,5 | 2,3 |
| Томаты | - « - | 523 | 1,6 | 0,5 | 2,8 |
| Свекла столовая | Корни | 524 | 5,0 | 1,6 | 7,4 |
| Морковь столовая | Корни | 525 | 3,4 | 1,1 | 4,5 |
| Лук-репка | Овощи | 526 | 3,0 | 1,2 | 4,0 |
| Зеленные овощи | - « - | 527 | 3,0 | 1,0 | 4,5 |
| Семенники капусты | Семена | 531 | 70,0 | 35,0 | 36,0 |
| Семенники свеклы | - « - | 532 | 80,0 | 40,0 | 41,0 |
| Семенники моркови | - « - | 533 | 70,0 | 35,0 | 42,0 |
| Семенники капустных | - « - | 534 | 70,0 | 35,0 | 36,0 |
| Озимый рапс | - « - | 431 | 58,0 | 29,0 | 26,0 |
| Яровой рапс | - « - | 432 | 55,0 | 30,0 | 30,0 |
| Сурепица | - « - | 433 | 53,0 | 20,0 | 21,0 |
| Горчица | - « - | 434 | 57,0 | 20,0 | 23,0 |
| Редька масличная | - « - | 435 | 50,0 | 20,0 | 32,0 |
| Крестоцветные в среднем | - « - | 436 | 54,6 | 23,8 | 26,4 |
| Сурепица | Зеленая масса | 641 | 3,4 | 0,7 | 4,6 |
| Горчица | - « - | 642 | 4,2 | 1,0 | 5,1 |
| Яровой рапс | - « - | 643 | 5,0 | 1,0 | 4,9 |
| Озимый рапс | - « - | 644 | 5,0 | 0,7 | 4,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| Редька масличная | - « - | 645 | 4,3 | 1,3 | 5,5 |
| Крестоцветные в среднем | - « - | 646 | 4,4 | 0,9 | 5,0 |
| Однолетние бобово-злаковые + многолетние травы | - « - | 651 | 4,5 | 1,3 | 4,3 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 652 | 13,9 | 5,5 | 25,4 |
| Райграс однолетний | Сено | 653 | 16,6 | 7,0 | 38,5 |
| Однолетние злаковые травы | Семена | 654 | 195,0 | 75,0 | 185,0 |
| Райграс однолетний | Семена | 655 | 195,0 | 75,0 | 185,0 |
| Амарант | Зеленая масса | 656 | 2,8 | 2,0 | 7,0 |
| Райграс однолетний + многолетние травы | - « - | 657 | 3,9 | 1,7 | 9,2 |
| Однолетние злаковые травы | - « - | 658 | 2,8 | 1,1 | 5,1 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 681 | 14,9 | 4,5 | 24,1 |
| Тимофеевка луговая | - « - | 682 | 17,6 | 7,0 | 24,0 |
| Ежа сборная | - « - | 683 | 23,3 | 8,0 | 25,6 |
| Овсяница луговая | - « - | 684 | 21,1 | 7,5 | 24,9 |
| Райграс пастбищный | - « - | 685 | 16,3 | 6,2 | 20,2 |
| Многолетние злаковые травы | Зеленая масса | 686 | 3,0 | 0,9 | 4,8 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | Сено | 687 | 17,3 | 5,4 | 25,7 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | Зеленая масса | 688 | 3,5 | 1,1 | 5,1 |
| Многолетние бобовые травы | Сено | 691 | 23,4 | 5,1 | 27,2 |
| Люцерна | - « - | 692 | 27,3 | 5,8 | 23,7 |
| Клевер луговой | - « - | 693 | 21,4 | 4,8 | 25,2 |
| Галега восточная (козлятник) | - « - | 694 | 29,7 | 3,8 | 13,1 |
| Многолетние бобовые травы | Зеленая масса | 695 | 4,3 | 1,0 | 4,4 |
| Многолетние злаковые травы | Семена | 696 | 195,0 | 75,0 | 185,0 |
| Многолетние бобовые травы | Семена | 698 | 260,0 | 65,0 | 200,0 |
| Сенокосы естественные | Сено | 711 | 16,8 | 2,6 | 20,7 |
| Сенокосы культурные | Сено | 712 | 16,1 | 4,9 | 22,0 |
| Сенокосы культурные | Зеленая масса | 713 | 3,2 | 1,0 | 4,4 |
| Пастбища естественные | - « - | 721 | 4,3 | 0,6 | 6,2 |
| Пастбища культурные | - « - | 722 | 5,3 | 0,8 | 4,9 |
| Пастбища культурные | Сено | 723 | 19,4 | 5,9 | 24,3 |
| Плодовые деревья | Фрукты | 813 | 5,0 | 1,6 | 5,5 |
| Ягодники | Ягоды | 814 | 9,1 | 2,9 | 9,5 |
| Растениеводческая продукция на 10 ц к. ед. | К. ед. | 815 | 21,0 | 8,0 | 22,0 |

**Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур,
коэффициенты возврата и поправочные величины к коэффициентам возврата
для расчета доз азотных удобрений на дерново-подзолистых суглинистых
и супесчаных почвах на морене***

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Базовая урожайность (Уб), ц/га | Коэффициент возврата (Кв), % | Поправочная величина к коэффициенту возврата (Пк) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| Озимая пшеница | Зерно | 20 | 71 | 0 |
| Озимая рожь | -«- | 20 | 71 | 0,275 |
| Озимая тритикале | -«- | 20 | 77 | 0 |
| Озимый ячмень | -«- | 20 | 80 | 0 |
| Яровая пшеница | -«- | 20 | 66 | 0,425 |
| Яровой ячмень | -«- | 20 | 69 | 0,425 |
| Яровая тритикале | -«- | 20 | 77 | 0,475 |
| Овес | -«- | 20 | 77 | 0,475 |
| Озимый рапс | Семена | 10 | 69 | 0,133 |
| Яровой рапс | Семена | 10 | 73 | 0,600 |
| Гречиха | Зерно | 5 | 133 | 1,760 |
| Лен-долгунец | Волокно | 3 | 86 | 3,875 |
| Картофель | Клубни | 150 | 62 | 0,024 |
| Сахарная свекла | Корни | 200 | 75 | 0,030 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 200 | 91 | 0,038 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 57 | 0 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 30 | 144 | 0,829 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | Зеленая масса | 100 | 67 | 0,068 |
| Однолетние крестоцветные | Зеленая масса | 100 | 91 | 0,103 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 30 | 134 | 0,471 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | -«- | 30 | 77 | 0,357 |
| Сенокосы | -«- | 20 | 124 | 0,310 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 94 | 0,074 |

* Наряду с культурами, приведенными в приложениях 3–10, указанные показатели базовой урожайности, коэффициентов возврата и поправочных величин к коэффициентам возврата действительны и для других групп культур согласно прил. 15.

**Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур,
коэффициенты возврата и поправочные величины к коэффициентам
возврата для расчета доз азотных удобрений на дерново-подзолистых
песчаных и супесчаных почвах на песках**

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Базовая урожайность (Уб), ц/га | Коэффициент возврата (Кв), % | Поправочная величина к коэффициенту возврата (Пк) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| Озимая рожь | Зерно | 15 | 83 | 0,480 |
| Озимая тритикале | -«- | 15 | 103 | 0,640 |
| Озимый ячмень | -«- | 15 | 107 | 0,680 |
| Яровой ячмень | -«- | 15 | 92 | 0,760 |
| Яровая тритикале | -«- | 15 | 103 | 0,840 |
| Овес | -«- | 15 | 103 | 0,840 |
| Озимый рапс | Семена | 10 | 78 | 0,400 |
| Яровой рапс | Семена | 10 | 82 | 0,870 |
| Гречиха | Зерно | 5 | 160 | 2,67 |
| Картофель | Клубни | 150 | 68 | 0,050 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 150 | 91 | 0 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 64 | 0,005 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 20 | 144 | 0,900 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | Зеленая масса | 100 | 78 | 0,095 |
| Однолетние крестоцветные | -«- | 100 | 102 | 0,205 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 20 | 151 | 0,975 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | -«- | 20 | 87 | 0,375 |
| Сенокосы | -«- | 20 | 140 | 0,650 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 94 | 0,125 |

**Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур,
коэффициенты возврата и поправочные величины к коэффициентам
возврата для расчета доз азотных удобрений на торфяно-болотных почвах**

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Базовая урожайность (Уб), ц/га | Коэффициент возврата (Кв), % | Поправочная величина к коэффициенту возврата (Пк) |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| Озимая пшеница | Зерно | 30 | 24 | 0 |
| Озимая рожь | -«- | 30 | 24 | 0 |
| Озимая тритикале | -«- | 30 | 26 | 0 |
| Озимый ячмень | -«- | 30 | 27 | 0 |
| Яровая пшеница | -«- | 30 | 27 | 0 |
| Яровой ячмень | -«- | 30 | 29 | 0 |
| Яровая тритикале | -«- | 30 | 32 | 0 |
| Овес | -«- | 30 | 32 | 0 |
| Картофель | Клубни | 150 | 25 | 0,008 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 29 | 0,010 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 30 | 72 | 0,414 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | Зеленая масса | 150 | 22 | 0,017 |
| Однолетние крестоцветные | Зеленая масса | 100 | 45 | 0,045 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 30 | 67 | 0,286 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | -«- | 30 | 39 | 0,271 |
| Сенокосы | -«- | 30 | 62 | 0,289 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 57 | 0,070 |

Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур, коэффициенты возврата и поправочные величины к коэффициентам возврата для расчета доз фосфорных удобрений на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Уб, ц/га | Содержание P_2O_5 (0,2 М НСl) в пахотном горизонте, мг/кг | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | < 100 | | 101–150 | | 151–200 | | 201–300 | | 301–400 | |
| | | | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк |
| Озимые зерновые | Зерно | 20 | 219 | 1,100 | 175 | 0,725 | 132 | 0,200 | 88 | –0,350 | 44 | –0,350 |
| Яровые зерновые | –«– | 20 | 210 | 1,400 | 168 | 1,050 | 126 | 0,350 | 84 | 0 | 42 | 0 |
| Зернобобовые | –«– | 15 | 189 | 0,400 | 152 | 0 | 114 | 0 | 76 | 0 | 38 | 0,433 |
| Озимый рапс | Семена | 10 | 172 | 1,700 | 138 | 1,167 | 103 | 0,400 | 69 | 0 | 34 | 0 |
| Яровой рапс | Семена | 10 | 167 | 1,967 | 133 | 1,367 | 100 | 0,700 | 67 | 0,433 | 33 | 0,133 |
| Гречиха | Зерно | 5 | 303 | 4,040 | 253 | 3,400 | 202 | 2,000 | 152 | 2,040 | 101 | 2,000 |
| Лен-долгунец | Волокно | 3 | 728 | 31,500 | 582 | 23,125 | 437 | 10,000 | 291 | 1,625 | 146 | 5,875 |
| Картофель | Клубни | 150 | 211 | 0,212 | 140 | 0,032 | 105 | 0 | 70 | –0,032 | 35 | –0,072 |
| Сахарная свекла | Корни | 200 | 219 | 0,158 | 188 | 0,133 | 156 | 0,078 | 94 | 0,028 | 31 | –0,028 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 200 | 250 | 0,140 | 208 | 0,138 | 167 | 0,070 | 83 | –0,035 | 42 | –0,035 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 227 | 0,064 | 136 | –0,023 | 91 | –0,043 | 68 | –0,019 | 45 | 0,007 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 100 | 231 | 0,155 | 192 | 0,095 | 154 | 0,078 | 115 | 0,095 | 77 | 0,115 |
| Многолетние травы | Сено | 30 | 333 | 0,757 | 300 | 0,857 | 267 | 0,957 | 200 | 0,857 | 67 | –0,186 |
| Сенокосы | Сено | 20 | 306 | 1,020 | 255 | 0,800 | 204 | 0,580 | 153 | 0,510 | 102 | 0,440 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 375 | 0,166 | 313 | 0,126 | 250 | 0,084 | 188 | 0,084 | 125 | 0,084 |

Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур, коэффициенты возврата и поправочные величины к коэффициентам возврата для расчета доз фосфорных удобрений на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах на песках

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Уб, ц/га | Содержание P_2O_5 (0,2 М НСl) в пахотном горизонте, мг/кг | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | | < 100 | | 101–150 | | 151–200 | | 201–300 | |
| | | | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк |
| Озимые зерновые | Зерно | 15 | 234 | 2,360 | 205 | 2,040 | 146 | 0,560 | 88 | 0 |
| Яровые зерновые | -«- | 15 | 224 | 3,080 | 196 | 2,800 | 140 | 1,400 | 84 | 0,840 |
| Зернобобовые | -«- | 10 | 227 | 3,300 | 199 | 2,850 | 170 | 3,300 | 114 | 2,400 |
| Озимый рапс | Семена | 10 | 155 | 2,067 | 121 | 1,200 | 86 | 0,667 | 69 | 1,400 |
| Яровой рапс | Семена | 10 | 133 | 2,200 | 100 | 1,333 | 67 | 0 | 50 | 0,667 |
| Гречиха | Зерно | 5 | 353 | 7,533 | 252 | 4,200 | 202 | 4,200 | 152 | 4,267 |
| Картофель | Клубни | 150 | 193 | 0,215 | 123 | 0,015 | 105 | 0,075 | 88 | 0,100 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 150 | 250 | 0,168 | 167 | 0,084 | 111 | 0,028 | 83 | 0,080 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 205 | 0,095 | 114 | 0 | 91 | 0 | 68 | 0,018 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 100 | 231 | 0,260 | 192 | 0,255 | 154 | 0,195 | 115 | 0,190 |
| Многолетние травы | Сено | 20 | 350 | 1,675 | 300 | 1,250 | 250 | 1,250 | 200 | 1,675 |
| Сенокосы | Сено | 20 | 306 | 1,275 | 255 | 0,850 | 204 | 1,275 | 153 | 1,275 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 375 | 0,310 | 313 | 0,210 | 250 | 0,310 | 188 | 0,315 |

**Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур, коэффициенты возврата и поправочные величины
к коэффициентам возврата для расчета доз фосфорных удобрений на торфяно-болотных почвах**

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Уб, ц/га | Содержание P ₂ O ₅ (0,2 М НСl) в пахотном горизонте, мг/кг | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|--|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|----------|-------|
| | | | < 200 | | 201–400 | | 401–600 | | 601–800 | | 801–1000 | |
| | | | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк |
| Озимые зерновые | Зерно | 30 | 234 | 1,467 | 190 | 0,967 | 146 | 0,467 | 102 | 0 | 58 | 0 |
| Яровые зерновые | -«- | 30 | 182 | 0,467 | 140 | 0 | 112 | 0 | 84 | 0 | 56 | 0 |
| Зернобобовые | -«- | 15 | 208 | 0,400 | 170 | 0,200 | 133 | 0,233 | 95 | 0,233 | 57 | 0,200 |
| Картофель | Клубни | 150 | 228 | 0,228 | 158 | 0,052 | 140 | 0,060 | 105 | 0,024 | 70 | 0,044 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 250 | 0,083 | 159 | –0,004 | 114 | –0,024 | 91 | 0,007 | 68 | 0,033 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 150 | 256 | 0,203 | 179 | 0,071 | 154 | 0,089 | 128 | 0,103 | 77 | 0,043 |
| Многолетние травы | Сено | 30 | 367 | 0,957 | 333 | 1,043 | 267 | 0,957 | 167 | 0,386 | 67 | 0 |
| Сенокосы | Сено | 20 | 306 | 0,680 | 255 | 0,510 | 204 | 0,510 | 153 | 0,510 | 102 | 0,420 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 375 | 0,166 | 313 | 0,126 | 250 | 0,124 | 188 | 0,126 | 125 | 0,104 |

**Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур, коэффициенты возврата и поправочные величины
к коэффициентам возврата для расчета доз калийных удобрений на дерново-подзолистых суглинистых
и супесчаных на морене почвах**

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Уб, ц/га | Содержание K ₂ O (0,2 М НСl) в пахотном горизонте, мг/кг | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | < 80 | | 81–140 | | 141–200 | | 201–300 | | 301–400 | |
| | | | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк |
| Озимые зерновые | Зерно | 20 | 136 | 0,750 | 102 | 0,100 | 68 | –0,375 | 45 | –0,575 | 34 | –0,275 |
| Яровые зерновые | –«– | 20 | 120 | 0,675 | 100 | 0,500 | 80 | 0,175 | 40 | –0,675 | 30 | –0,075 |
| Зернобобовые | –«– | 15 | 143 | 1,767 | 125 | 1,367 | 108 | 1,000 | 72 | 0 | 36 | 0,200 |
| Озимый рапс | Семена | 10 | 231 | 2,567 | 192 | 1,900 | 154 | 1,300 | 115 | 0,933 | 77 | 0,967 |
| Яровой рапс | Семена | 10 | 200 | 2,500 | 167 | 2,233 | 133 | 1,367 | 100 | 1,233 | 67 | 1,133 |
| Гречиха | Зерно | 5 | 207 | 4,120 | 166 | 3,320 | 124 | 2,200 | 83 | 1,520 | 62 | 1,240 |
| Лен-долгунец | Волокно | 3 | 274 | 10,875 | 228 | 6,750 | 183 | 2,625 | 137 | 0 | 68 | 0,750 |
| Картофель | Клубни | 150 | 47 | 0,028 | 33 | –0,008 | 27 | –0,012 | 20 | –0,020 | 13 | –0,008 |
| Сахарная свекла | Корни | 200 | 62 | 0,028 | 54 | 0,025 | 38 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 200 | 95 | 0,040 | 83 | 0,050 | 60 | 0,010 | 48 | 0 | 24 | 0 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 38 | –0,014 | 26 | –0,021 | 19 | –0,013 | 13 | –0,004 | 10 | 0,001 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 100 | 163 | 0,175 | 116 | 0,080 | 93 | 0,058 | 70 | 0,048 | 35 | 0,030 |
| Многолетние травы | Сено | 30 | 130 | 0,743 | 117 | 0,614 | 104 | 0,600 | 65 | 0,157 | 32 | 0,129 |
| Сенокосы | Сена | 20 | 159 | 0,760 | 136 | 0,600 | 114 | 0,500 | 68 | 0,150 | 45 | 0,220 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 143 | 0,136 | 122 | 0,108 | 102 | 0,088 | 61 | 0,026 | 41 | 0,042 |

**Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур, коэффициенты возврата и поправочные величины
к коэффициентам возврата для расчета доз калийных удобрений на дерново-подзолистых песчаных
и супесчаных почвах на песках**

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Уб, ц/га | Содержание K ₂ O (0,2 М НCl) в пахотном горизонте, мг/кг | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | | < 80 | | 81–140 | | 141–200 | | 201–300 | |
| | | | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк |
| Озимые зерновые | Зерно | 15 | 181 | 2,280 | 121 | 0,760 | 90 | 0,200 | 60 | –0,320 |
| Яровые зерновые | –«– | 15 | 160 | 1,600 | 107 | 0,280 | 80 | 0 | 53 | –0,480 |
| Зернобобовые | –«– | 10 | 175 | 2,500 | 148 | 1,600 | 121 | 0,650 | 81 | 0 |
| Озимый рапс | Семена | 10 | 250 | 4,333 | 173 | 1,267 | 135 | 0,800 | 77 | –1,000 |
| Яровой рапс | Семена | 10 | 217 | 2,933 | 150 | 0,200 | 117 | –0,200 | 67 | –0,867 |
| Гречиха | Зерно | 5 | 228 | 4,800 | 187 | 4,200 | 145 | 3,467 | 83 | 1,400 |
| Картофель | Клубни | 150 | 50 | 0,050 | 37 | 0,015 | 30 | 0,005 | 20 | –0,015 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 150 | 79 | –0,016 | 63 | –0,008 | 48 | 0 | 32 | 0,008 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 200 | 45 | –0,005 | 32 | –0,015 | 22 | –0,020 | 16 | –0,003 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 100 | 174 | 0,290 | 128 | 0,175 | 105 | 0,135 | 81 | 0,115 |
| Многолетние травы | Сено | 20 | 156 | 1,150 | 136 | 0,975 | 117 | 0,825 | 78 | 0,175 |
| Сенокосы | Сено | 20 | 182 | 1,325 | 159 | 1,125 | 125 | 0,675 | 80 | 0,100 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 163 | 0,235 | 143 | 0,205 | 112 | 0,120 | 71 | 0,015 |

Базовая (минимальная) урожайность сельскохозяйственных культур, коэффициенты возврата и поправочные величины к коэффициентам возврата для расчета доз калийных удобрений на торфяно-болотных почвах

| Сельскохозяйственная культура | Вид продукции | Уб, ц/га | Содержание K ₂ O (0,2 МНCl) в пахотном горизонте, мг/кг | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|--|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | | | < 200 | | 201–400 | | 401–600 | | 601–1000 | | 1001–1300 | |
| | | | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк | Кв, % | Пк |
| Озимые зерновые | Зерно | 30 | 136 | 0,767 | 98 | 0 | 83 | 0 | 53 | –0,467 | 38 | –0,233 |
| Яровые зерновые | –«– | 30 | 120 | 0,667 | 100 | 0,433 | 87 | 0,467 | 47 | –0,433 | 33 | –0,133 |
| Зернобобовые | –«– | 15 | 161 | 2,167 | 143 | 1,767 | 116 | 1,067 | 81 | 0,100 | 36 | 0 |
| Картофель | Клубни | 150 | 50 | 0,028 | 37 | 0 | 30 | –0,008 | 20 | –0,020 | 13 | –0,008 |
| Кормовые корнеплоды | Корнеплоды | 200 | 45 | –0,007 | 32 | –0,014 | 22 | –0,013 | 16 | –0,001 | 13 | 0,004 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 150 | 140 | 0,109 | 124 | 0,089 | 101 | 0,049 | 78 | 0,063 | 39 | 0,031 |
| Многолетние травы | Сено | 30 | 143 | 0,814 | 130 | 0,743 | 117 | 0,671 | 71 | 0,186 | 39 | 0,114 |
| Сенокосы | Сено | 20 | 182 | 0,910 | 159 | 0,790 | 125 | 0,530 | 80 | 0,230 | 57 | 0,270 |
| Пастбища | Зеленая масса | 100 | 163 | 0,162 | 143 | 0,144 | 112 | 0,094 | 71 | 0,040 | 51 | 0,048 |

Нормативы основной и дополнительной потребности в фосфорных удобрениях на загрязненных радионуклидами землях

| Почва | Содержание P ₂ O ₅ , мг/кг почвы | Основная потребность P ₂ O ₅ , кг/га | Дополнительная потребность P ₂ O ₅ (кг/га) при плотности загрязнения, Ки/км ² | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | ¹³⁷ Cs 1–4,9 ⁹⁰ Sr 0,15–0,29 | ¹³⁷ Cs 5–14,9 ⁹⁰ Sr 0,30–0,99 | ¹³⁷ Cs 15–40 ⁹⁰ Sr 1,00–3,00 |
| Пашня | | | | | |
| Дерново- подзолистая | Менее 60 | 45 | 15 | 30 | 45 |
| | 61–100 | 40 | 10 | 20 | 30 |
| | 101–150 | 35 | 5 | 10 | 15 |
| | 151–250 | 20 | – | 5 | 10 |
| | 251–400 | 10 | – | – | – |
| Торфяные | Менее 200 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| | 201–300 | 45 | 15 | 30 | 45 |
| | 301–500 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| | 501–800 | 20 | – | 5 | 10 |
| | 800–1200 | 10 | – | – | – |
| Луговые земли | | | | | |
| Дерново- подзолистые, дерновые | Менее 60 | 35 | 15 | 30 | 45 |
| | 61–100 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| | 101–150 | 25 | 5 | 10 | 15 |
| | 151–250 | 10 | – | 5 | 10 |
| | 251–400 | – | – | – | – |
| Торфяно- болотная | Менее 200 | 55 | 15 | 30 | 45 |
| | 201–300 | 40 | 10 | 20 | 30 |
| | 301–500 | 35 | 5 | 10 | 15 |
| | 501–800 | 20 | – | 5 | 10 |
| | 801–1200 | – | – | – | – |

Нормативы основной и дополнительной потребности в калийных удобрениях на загрязненных радионуклидами землях

| Почва | Содержание K ₂ O, мг/кг почвы | Основная потребность P ₂ O ₅ , кг/га | Дополнительная потребность K ₂ O (кг/га) при плотности загрязнения, Ки/км ² | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | ¹³⁷ Cs 1–54,9 ⁹⁰ Sr 0,15–0,29 | ¹³⁷ Cs 5–14,9 ⁹⁰ Sr 0,30–1,99 | ¹³⁷ Cs 15–40 ⁹⁰ Sr 2,00–3,00 |
| Пашня | | | | | |
| Дерново- подзолистая | Менее 80 | 100 | 50 | 100 | 150 |
| | 81–140 | 90 | 30 | 60 | 90 |
| | 141–200 | 80 | 20 | 40 | 60 |
| | 201–300 | 55 | 15 | 30 | 45 |
| | Более 300 | 25 | – | – | – |
| Торфяные | Менее 200 | 140 | 40 | 80 | 120 |
| | 201–400 | 120 | 30 | 60 | 90 |
| | 401–600 | 100 | 20 | 40 | 60 |
| | 601–1000 | 60 | 10 | 20 | 30 |
| | Более 1000 | 30 | – | – | – |
| Сенокосы и пастбища | | | | | |
| Дерново- подзолистые, дерновые | Менее 80 | 80 | 40 | 80 | 120 |
| | 81–140 | 70 | 30 | 60 | 90 |
| | 141–200 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| | 201–300 | 45 | 15 | 30 | 45 |
| | Более 300 | 20 | – | – | – |
| Торфяно- болотная | Менее 200 | 100 | 40 | 80 | 120 |
| | 201–400 | 90 | 30 | 60 | 90 |
| | 401–600 | 80 | 20 | 40 | 60 |
| | 601–1000 | 60 | 10 | 20 | 30 |
| | Более 1000 | 30 | – | – | – |

Классификатор органических удобрений и потребление из них элементов питания

| Вид удобрения | Код | Потребление из 1 т, первый год | | | | | | Потребление из 1 т, второй год | | |
|---|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | кг | | | г | | | кг | | |
| | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | B | Cu | Zn | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Навоз крупного рогатого скота: на соломенной подстилке | 11 | 0,90 | 0,50 | 2,00 | 0,5 | 0,7 | 5,4 | 0,50 | 0,15 | 0,48 |
| на торфяной подстилке | 12 | 0,68 | 0,41 | 1,60 | 0,6 | 0,5 | 3,6 | 0,42 | 0,11 | 0,38 |
| полужидкий | 13 | 0,80 | 0,42 | 2,00 | 0,6 | 0,7 | 3,0 | 0,40 | 0,11 | 0,34 |
| жидкий | 14 | 0,55 | 0,32 | 1,57 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | 0,27 | 0,10 | 0,26 |
| Навоз свиной: на соломенной подстилке | 31 | 0,84 | 0,70 | 2,24 | 0,9 | 0,9 | 7,8 | 0,42 | 0,30 | 0,53 |
| полужидкий жидкий | 33 | 0,72 | 0,25 | 1,65 | 0,9 | 1,2 | 12,8 | 0,35 | 0,11 | 0,25 |
| Торфо-навозный компост (1:1) | 34 | 0,60 | 0,22 | 1,00 | 0,6 | 0,7 | 8,0 | 0,29 | 0,10 | 0,15 |
| Торфо-навозный компост (1:2) | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
| Навоз лошадей | 71 | 0,70 | 0,35 | 1,80 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | 0,30 | 0,14 | 0,29 |
| Навоз овец | 72 | 0,40 | 0,27 | 0,74 | 0,9 | 0,7 | 2,0 | 0,30 | 0,14 | 0,29 |
| Птичий помет | 20 | 1,04 | 0,77 | 2,75 | — | — | — | 0,70 | 0,33 | 0,66 |
| Торфо-пометный компост (1:1) | 40 | 2,07 | 0,60 | 2,80 | 1,9 | 2,9 | 6,0 | 0,82 | 0,24 | 0,60 |
| Торфо-пометный компост (1:2) | 60 | 3,28 | 4,00 | 2,75 | 1,1 | 0,4 | 19,5 | 1,64 | 1,95 | 0,66 |
| Торфо-жижевый компост (2:1) | 74 | 2,04 | 2,05 | 1,50 | 1,2 | 0,5 | 10,8 | 1,02 | 0,98 | 0,30 |
| Сапропели органические | 75 | 2,44 | 2,50 | 1,50 | 1,1 | 0,5 | 13,8 | 1,22 | 1,20 | 0,30 |
| Зеленое удобрение | 73 | 0,95 | 0,15 | 0,50 | 1,0 | 0,5 | 4,1 | 0,40 | 0,05 | 0,20 |

Справочник контроля предельных доз минеральных удобрений

| Культура | Код | N | | P ₂ O ₅ | | K ₂ O | |
|---|---------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------------------|-----|
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Озимые зерновые (зерно) | 111–114, 136 | 20 | 120 | 10 | 150 | 20 | 180 |
| Озимые зерновые + травы | 116–119 | 20 | 90 | 10 | 180 | 20 | 180 |
| Озимые (зеленая масса) | 633 | 20 | 150 | 10 | 90 | 20 | 130 |
| Озимые (зеленая масса) + травы | 634 | 20 | 90 | 10 | 180 | 20 | 180 |
| Яровые зерновые (зерно) | 121, 127 123–125 | 20 | 120 | 10 | 150 | 20 | 180 |
| Яровые зерновые + травы | 131–135 | 20 | 60 | 10 | 180 | 20 | 180 |
| Яровые (зеленая масса) | 635 | 20 | 150 | 10 | 90 | 20 | 130 |
| Яровые (зеленая масса) + травы | 636 | 20 | 60 | 10 | 180 | 20 | 180 |
| Гречиха | 128 | 20 | 60 | 10 | 120 | 20 | 130 |
| Зернобобовые (зерно) | 211–216, 218 | 20 | 40 | 10 | 150 | 20 | 170 |
| Люпин (зерно) | 217 | 0 | 0 | 10 | 120 | 20 | 150 |
| Зернобобовые (зеленая масса) | 611–616 | 20 | 50 | 10 | 150 | 20 | 150 |
| Бобово-злаковые смеси (зерно) | 221–224 | 20 | 50 | 10 | 140 | 20 | 150 |
| Бобово-злаковые смеси (зеленая масса, сено) | 620–621, 651 | 20 | 60 | 10 | 140 | 20 | 150 |
| Лен-долгунец (волокно) | 411 | 10 | 40 | 20 | 140 | 20 | 150 |
| Конопля (волокно) | 412 | 10 | 60 | 20 | 140 | 20 | 120 |
| Сахарная свекла | 413 | 30 | 150 | 20 | 180 | 20 | 230 |
| Картофель | 511–513 | 30 | 120 | 20 | 180 | 20 | 210 |
| Кормовая свекла | 561, 565 | 30 | 180 | 20 | 180 | 20 | 300 |
| Кукуруза (зеленая масса) | 581 | 30 | 150 | 20 | 180 | 20 | 220 |
| Кукуруза (зерно) | 126 | 30 | 150 | 20 | 180 | 20 | 220 |
| Кормовая брюква | 562 | 20 | 120 | 20 | 160 | 20 | 180 |
| Турнепс, кузизуку | 563–564 | 20 | 120 | 20 | 160 | 20 | 220 |
| Кормовая морковь, капуста кормовая | 566–567 | 20 | 120 | 20 | 160 | 20 | 200 |
| Крестоцветные (семена) | 431–436 | 20 | 150 | 10 | 150 | 20 | 125 |
| Крестоцветные (зеленая масса) | 641–646 | 20 | 160 | 10 | 120 | 20 | 200 |
| Однолетние и многолетние злаковые травы (сено, зеленая масса) | 652–653, 656–658, 681–685 | 30 | 180 | 10 | 120 | 20 | 230 |

Окончание прил. 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------------------|----|-----|----|-----|----|-----|
| Однолетние и многолетние бобовые травы (сено, зеленая масса) | 617–618, 691–695 | 0 | 30 | 20 | 120 | 20 | 200 |
| Многолетние бобово-злаковые травы (сено, зеленая масса) | 687–688 | 20 | 60 | 10 | 120 | 20 | 200 |
| Сенокосы | 711–713 | 30 | 180 | 20 | 120 | 20 | 200 |
| Пастбища | 721–723 | 30 | 240 | 20 | 120 | 20 | 240 |
| Плодовые деревья, ягодники | 813–814 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 150 |
| Капуста | 521 | 20 | 150 | 20 | 160 | 20 | 220 |
| Свекла столовая | 524 | 20 | 120 | 20 | 180 | 20 | 200 |
| Морковь | 525, 528 | 20 | 90 | 20 | 160 | 20 | 220 |
| Томаты | 523 | 20 | 120 | 20 | 150 | 20 | 180 |
| Огурцы | 522 | 20 | 90 | 20 | 120 | 20 | 120 |
| Лук-репка | 526 | 20 | 90 | 20 | 120 | 20 | 150 |
| Зеленные овощи | 527 | 20 | 60 | 20 | 120 | 20 | 150 |

Примечание. На минеральных почвах с содержанием калия менее 200 мг/кг, торфяно-болотных почвах (менее 600 мг/кг), при плотности загрязнения радиоцезием более 5,0 Ки/км² или радиостронцием более 0,3 Ки/км² предельные дозы калийных удобрений увеличиваются на 30 %.

**Группы культур для определения базовой (минимальной) урожайности,
коэффициентов возврата и поправочных величин к коэффициентам возврата
(приложения 2–10)**

| Группа культур | Продукция | Коды согласно приложению 4 |
|-----------------------------------|---------------|--|
| Озимая пшеница | Зерно | 111, 116 |
| Озимая рожь | -«- | 112, 117, 136 |
| Озимая тритикале | -«- | 113, 118 |
| Озимый ячмень | -«- | 114, 119 |
| <i>Озимые зерновые*</i> | -«- | 111–114, 116–119, 136 |
| Яровая пшеница | -«- | 121, 131 |
| Яровой ячмень | -«- | 124, 127, 134 |
| Яровая тритикале | -«- | 123, 133 |
| Овес | -«- | 125, 126, 135, 221–224 |
| <i>Яровые зерновые**</i> | -«- | 121, 123–127, 131, 133–135 |
| <i>Зернобобовые</i> | -«- | 211–218 |
| Озимый рапс | Семена | 431 |
| Яровой рапс | -«- | 432–436 |
| Гречиха | Зерно | 128 |
| Лен-долгунец | Волокно | 411, 412 |
| Картофель*** | Клубни | 511–513, 521–528, 813–814 |
| Сахарная свекла | Корни | 413 |
| Кукуруза | Зеленая масса | 581 |
| Кормовые корнеплоды | Корни | 561–566 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 621, 652–653 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | Зеленая масса | 567, 620, 651, 688 |
| Однолетние крестоцветные | -«- | 633–636, 641–646, 656–658, 686 |
| <i>Однолетние травы</i> | -«- | 567, 611–617, 620, 633–636, 641–646, 651, 656–658, 686, 688, 695 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 681–685 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | -«- | 687 |
| <i>Многолетние травы</i> | -«- | 618, 621, 652–653, 681–685, 687, 691–694 |
| Сенокосы | -«- | 711, 712, 723 |
| Пастбища | Зеленая масса | 713, 721, 722 |

* На песчаных и супесчаных на песках почвах из группы озимых зерновых исключается озимая пшеница (коды 111, 116); из группы яровых – яровая пшеница (коды 121, 131);

** На торфяно-болотных почвах из группы картофеля исключаются овощи (коды 521–528), плодовые деревья (код 813), ягоды (код 814);

***Группы культур *озимые зерновые (зерно), яровые зерновые (зерно), зернобобовые (зерно), однолетние травы (зеленая масса), многолетние травы (сено)* действительны для расчета доз фосфорных и калийных удобрений; все остальные группы культур – для расчета доз азотных, фосфорных и калийных удобрений.

**Процентное содержание действующего вещества в минеральных удобрениях
и коэффициенты пересчета элементов питания на физическую массу**

| Вид и ассортимент удобрений | Действующее вещество | Содержание действующего вещества, % | Коэффициент пересчета элементов питания на физическую массу |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Азотные | | | |
| Аммиачная селитра | N | 34,5 | 2,90 |
| Карбамид (мочевина) | N | 46,2 | 2,16 |
| Карбамид с гуматными добавками | N | 46,2 | 2,16 |
| КАС | N | 28,0–30,0–32,0 | 3,57–3,33–3,12 |
| Сульфат аммония | N (S) | 20,5 (24) | 4,88 (4,16) |
| Сульфат аммония с защитным покрытием | N (S) | 20,5 (24) | 4,88 (4,16) |
| Аммиачная вода | N | 20,5 | 4,88 |
| Аммиак водный | N | 82,0 | 1,22 |
| Фосфорные | | | |
| Суперфосфат простой гранулированный | P ₂ O ₅ | 19,5 | 5,13 |
| Суперфосфат двойной | P ₂ O ₅ | 46,0 | 2,17 |
| Суперфос | P ₂ O ₅ | 38,0–41,0 | 2,63–2,44 |
| Калийные | | | |
| Хлористый калий | K ₂ O | 60,0 | 1,67 |
| Сульфат калия | K ₂ O | 48,0 | 2,08 |
| Калийная соль | K ₂ O | 40,0 | 2,50 |
| Сильвинит | K ₂ O | 14,0 | 7,14 |
| Сложные | | | |
| Нитрофоска | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 11,0:11,0:11,0 | 9,09 |
| | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 12,0:12,0:12,0 | 8,33 |
| | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 15,0:15,0:15,0 | 6,67 |
| Аммофос | N: P ₂ O ₅ | 12,0:52,0 | 8,33:1,92 |
| Аммонизированный суперфосфат | N: P ₂ O ₅ | 8,0:30,0 | 12,5:3,03 |
| | N: P ₂ O ₅ | 8,0:33,0 | 12,5:3,33 |
| | N: P ₂ O ₅ | 7,0:25,0 | 14,3:4,0 |
| | N: P ₂ O ₅ | 7,0:22,0 | 14,3:4,55 |
| | N: P ₂ O ₅ | 7,0:19,0 | 14,3:5,26 |
| Удобрения сложносмешанные гранулированные (АФК) | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 10,0:20,0:20,0 | 10,0:5,0 |
| | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 16,0:16,0:16,0 | 6,25 |
| | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 5,0:16,0:35,0 | 20,0:6,25:2,86 |
| | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 16,0:12:20 | 8,88:6,25:5 |
| Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) | N: P ₂ O ₅ | 10,0:34,0 | 10,0:2,94 |
| Кристаллин | N: P ₂ O ₅ : K ₂ O | 20,0:6:10 | 5,0:25:10,0 |

Приложение 22

Энергетические затраты на производство и хранение органических удобрений

| Виды органических удобрений | Энергетические затраты, МДж/т |
|--|-------------------------------|
| Подстилочный навоз на соломенной подстилке (соотношение соломы к полужидкому навозу 1:10) | 112 |
| Подстилочный навоз на торфяной подстилке (соотношение торфа к экскрементам 1:3) | 222 |
| Торфо-навозные компосты (соотношение торфа к навозу 1:3) | 283 |
| Торфо-соломенно-навозные компосты (на 1 т полужидкого навоза 50 кг соломы, 250 кг торфокрошки) | 286 |
| Усредненные затраты на хранение | 6,2 |

Приложение 23

Примерные дозы азотных удобрений в основном внесении под озимые зерновые культуры с учетом данных почвенной диагностики

| Обеспеченность почвы усвояемым азотом, кг/га | Дозы азота, кг/га | |
|--|--|--|
| | Суглинистые и супесчаные почвы на морене (рожь, пшеница) | Песчаные и супесчаные почвы на песках (рожь) |
| < 120 | 45–60 | 30 |
| 120–200 | 30–40 | – |
| > 200 | Удобрения не вносят | – |

Примечание. Более высокие дозы вносят под пшеницу.

Приложение 24

Примерные дозы азотных удобрений для ранневесенней подкормки озимых зерновых культур с учетом данных почвенной диагностики

| Обеспеченность почвы азотом, кг/га | | Доза азота, кг/га | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Азот усвояемый | Азот минеральный (нитратный + аммиачный) | Озимая рожь | Озимая пшеница |
| < 120 | <60 | 50–60 | 60–70 |
| 120–200 | 60–100 | 30–40 | 40–50 |
| 201–300 | 101–150 | 20–30 | 30–40 |
| > 300 | >150 | – | 0–20 |

Примечание. Более высокие дозы применяют при густоте стеблей менее 80 шт/м² озимой ржи и менее 90 – озимой пшеницы, а также при длительной холодной погоде.

**Дозы азота для ранневесенней подкормки озимых зерновых культур
на торфяно-болотных почвах по д. в., кг/га**

| Планируемый урожай, ц/га | Торфяно- и торфянисто- глеевые почвы | | Торфяно-болотные почвы с мощностью торфа более 0,5 м | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| | Предшественники | | | |
| | Небобовые культуры | Однолетние и многолетние бобово- злаковые травы | Небобовые культуры | Однолетние и многолетние бобово- злаковые травы |
| 21–30 | 35 | 30 | 20 | 20 |
| 31–40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 41–50 | 55 | 40 | 40 | 20 |

**Примерные дозы азотных удобрений для основного внесения под яровые зерновые
культуры (по данным почвенной диагностики)**

| Обеспеченность почв усвояемым азотом, кг/га | Дозы азота, кг/га | |
|--|---|--|
| | Суглинистые и супесча- ные почвы на морене | Песчаные и супесчаные почвы на песках |
| < 120 | 50–60 | 40–50 |
| 120–200 | 30–40 | 20–30 |
| 201–300 | 20–30 | — |
| > 300 | Удобрения не вносят | — |

П р и м е ч а н и е. Для формирования оптимальной густоты стеблестоя яровых зерновых культур в фазе кущения содержание легкоусвояемого (минерального) азота в слое почвы 0–40 см должно составлять для ячменя и овса на суглинистых и супесчаных почвах 100–120 кг/га, на песчаных – 90–100, а для яровой пшеницы – 110–130 кг/га.

**Дозы минеральных удобрений для сенокосов на дерново-подзолистых
суглинистых и супесчаных на морене почвах**

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зеленая масса), ц/га | | | | |
|---------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 20–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 |
| Азотные | – | 40–70 | 70–100 | 100–130 | 130–160 | 160–180 |
| Фосфорные | Менее 100 | 30–50 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 101–150 | 25–45 | 45–65 | 65–85 | × | × |
| | 151–200 | 20–35 | 35–50 | 50–65 | 65–80 | × |
| | 201–300 | 15–25 | 25–35 | 35–45 | 45–55 | 55–70 |
| | 301–400 | – | – | 20–25 | 25–30 | 30–40 |
| Калийные | Менее 80 | 70–00 | 100–130 | 130–160 | × | × |
| | 81–140 | 60–90 | 90–20 | 120–150 | × | × |
| | 141–200 | 50–75 | 75–00 | 100–125 | 125–150 | × |
| | 201–300 | 30–50 | 50–70 | 70–90 | 90–115 | 115–140 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |

**Дозы минеральных удобрений для пастбищ на дерново-подзолистых суглинистых
и супесчаных на морене почвах**

| Удобрения, кг/га д. в. | Содержание P_2O_5 и K_2O , мг/кг почвы | Планируемая урожайность (зеленая масса), ц/га | | | | |
|---------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 100–200 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 |
| Азотные | – | 50–75 | 75–100 | 100–125 | 125–150 | 150–180 |
| Фосфорные | Менее 100 | 30–50 | 50–70 | 70–90 | × | × |
| | 101–150 | 25–45 | 45–65 | 65–85 | × | × |
| | 151–200 | 20–35 | 35–50 | 50–65 | 65–80 | × |
| | 201–300 | 15–25 | 25–35 | 35–45 | 45–55 | 55–70 |
| | 301–400 | – | – | 20–25 | 25–30 | 30–40 |
| Калийные | Менее 80 | 70–100 | 100–130 | 130–160 | × | × |
| | 81–140 | 60–90 | 90–120 | 120–150 | × | × |
| | 141–200 | 50–75 | 75–100 | 100–125 | 125–150 | × |
| | 201–300 | 30–50 | 50–70 | 70–90 | 90–115 | 115–140 |
| | 301–400 | – | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–60 |

**Дозы фосфорных удобрений в зависимости от обеспеченности
торфяно-болотных почв фосфором**

| Содержание P_2O_5 мг/кг почвы | Обеспеченность почвы подвижными фосфатами | Дозы P_2O_5 , кг/га | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | под многолет- ние травы | под зерновые | под пропаш- ные |
| <300 | Очень низкая | 80–100 | 100–120 | 120–150 |
| 301–500 | Низкая | 80–90 | 80–100 | 120–150 |
| 501–600 | Средняя | 45–60 | 60–80 | 90–120 |
| 601–1000 | Повышенная | 30–45 | 40–60 | 60–90 |
| 1001–1200 | Высокая | 20–30 | 20–40* | 45–60** |
| >1200 | Очень высокая | — | 10* | 20** |

* В рядки; ** при посадке.

П р и м е ч а н и е. Фосфор из запасов почвы усваивается на уровне 10–20 %, из минеральных удобрений – 15–30 %.

Дозы калийных удобрений на торфяно-болотных почвах

| Содержание K_2O в почве, мг/кг | Обеспеченность почвы обменным калием | Дозы K_2O , кг/га | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------|
| | | под многолетние травы | под зерновые | под пропашные |
| <200 | Очень низкая | 140–160 | 140–160 | 210–140 |
| 201–400 | Низкая | 120–150 | 120–150 | 210–240 |
| 401–600 | Средняя | 90–120 | 90–120 | 170–200 |
| 601–1000 | Повышенная | 60–90 | 60–90 | 130–160 |
| 1001–1200 | Высокая | 45–60 | 45–60 | 90–120 |
| >1200 | Очень высокая | 30–45 | — | 30–45 |

П р и м е ч а н и е. Из запасов почвы усваивается 30–50 % подвижного калия, из минеральных удобрений – 50–70 %.

Приложение 31

**Расчетные дозы минеральных удобрений (д. в.) под многолетние травы
на торфяных почвах, кг/га**

| Содержание подвиж- ных форм фосфора и калия | На планируемый урожай (абс. сух. в-ва), ц/га | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| | 80 | | | 100 | | | 120 | | |
| | Азот | Фосфор | Калий | Азот | Фосфор | Калий | Азот | Фосфор | Калий |
| Многолетние травы 1-го года | | | | | | | | | |
| 200 | – | 90 | 140 | – | 120 | 210 | Не планируется | | |
| 300 | – | 60 | 90 | – | 90 | 160 | | | |
| 400 | – | 40 | 70 | – | 80 | 120 | | | |
| 500 | – | 30 | 40 | – | 60 | 100 | | | |
| Многолетние травы 2–3-го года | | | | | | | | | |
| 200 | 70 | 80 | 170 | 150 | 120 | 240 | 210 | 150 | 280 |
| 300 | 70 | 60 | 140 | 150 | 90 | 210 | 210 | 120 | 240 |
| 400 | 70 | 40 | 100 | 150 | 80 | 180 | 210 | 90 | 210 |
| 500 | 70 | 35 | 90 | 150 | 60 | 160 | 210 | 80 | 190 |
| Многолетние травы 3-летнего использования | | | | | | | | | |
| | 90 | 60 | 200 | 180 | 80 | 250 | 240 | 100 | 300 |

Приложение 32

**Примерные дозы минеральных удобрений (по д. в.) на выработанных
торфяных месторождениях, кг/га**

| Культура | Азот | Фосфор | Калий |
|----------------------|-------|---------|---------|
| Бобово-овсяные смеси | 50–60 | 90–100 | 120–140 |
| Зерновые | 70–80 | 100–110 | 120–140 |
| Картофель | 80–90 | 120–140 | 220–240 |

**Примерные дозы удобрений под овощные культуры
на дерново-подзолистых почвах**

| Культура | Урожайность, т/га | Органические удобрения, т/га | Дозы минеральных удобрений по д. в. кг/га | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|------|----------|---------|---------|------|
| | | | Азотные | Фосфорные | | | | Калийные | | | |
| | | | | Обеспеченность почвы, мг/кг | | | | | | | |
| | | | | <150 | 151–200 | 201–300 | >300 | <120 | 121–170 | 171–250 | >250 |
| Капуста белокочанная | 40 | 60 | 90 | 60 | 30 | – | – | 120 | 90 | 60 | 30 |
| | 60 | 70 | 140 | 120 | 90 | 60 | – | 150 | 140 | 120 | 90 |
| | 80 | 80 | 150 | – | 120 | 90 | 60 | – | 150 | 140 | 130 |
| Свекла столовая | 30 | 40 | 60 | 60 | 30 | – | – | 90 | 80 | 60 | 30 |
| | 40 | 50 | 90 | 90 | 60 | 30 | – | 100 | 90 | 80 | 60 |
| | 50 | 60 | 120 | 120 | 90 | 60 | 30 | – | 120 | 100 | 90 |
| Томаты | 20 | 30 | 40 | 90 | 60 | 30 | – | 80 | 60 | 30 | – |
| | 30 | 40 | 60 | 120 | 90 | 60 | 30 | 90 | 80 | 60 | 30 |
| | 40 | 50 | 90 | – | 120 | 90 | 60 | – | 110 | 90 | 60 |
| Морковь | 40 | – | 30 | 90 | 60 | 30 | – | 120 | 90 | 60 | – |
| | 50 | – | 40 | 120 | 90 | 60 | 30 | 150 | 120 | 90 | 60 |
| | 60 | – | 60 | – | 120 | 90 | 60 | – | 150 | 120 | 90 |
| Огурцы | 10 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | – | 90 | 60 | 30 | – |
| | 20 | 80 | 60 | 120 | 90 | 60 | 30 | 120 | 90 | 60 | 30 |
| | 30 | 100 | 90 | – | 120 | 90 | 60 | – | 120 | 90 | 60 |
| Лук на репку, чеснок | 10 | 40 | 50 | 90 | 60 | 30 | – | 100 | 80 | 60 | – |
| | 20 | 60 | 70 | 120 | 90 | 60 | 30 | 120 | 100 | 70 | 40 |
| | 30 | 80 | 90 | – | 120 | 90 | 60 | – | 120 | 100 | 70 |

Дозы удобрений под овощные культуры, кг/га д. в.

| Культура | Урожайность, ц/га | Доза азотных удобрений при степени окультурен- ности почв | | | Дозы фосфорных удобрений при обеспеченности почв Р ₂ О ₅ | | | | Дозы калия при обеспеченности почв К ₂ О | | | |
|---------------------------|----------------------|---|---------|---------|---|---------|------------|---------|--|---------|------------|---------|
| | | средней | хорошей | высокой | низкой | средней | повышенной | высокой | низкой | средней | повышенной | высокой |
| Дерново-подзолистые почвы | | | | | | | | | | | | |
| Капуста белокочанная* | 400 | 110 | 90 | 60 | 60 | 30 | – | – | 120 | 90 | 60 | 30 |
| | 600 | 120 | 110 | 100 | 120 | 90 | 60 | – | 150 | 140 | 120 | 90 |
| | 800 | – | 120 | 120 | – | 120 | 90 | 60 | – | 150 | 150 | 140 |
| Свекла столовая | 300 | 90 | 60 | 30 | 60 | 30 | – | – | – | 90 | 60 | 30 |
| | 400 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 30 | – | 100 | 100 | 90 | 60 |
| | 500 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 60 | 30 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Томат | 200 | 60 | 30 | – | 90 | 60 | 30 | – | – | 60 | 30 | – |
| | 300 | 90 | 60 | 30 | 120 | 90 | 60 | 30 | 90 | 90 | 60 | 30 |
| | 400 | 90 | 90 | 60 | – | 120 | 90 | 60 | 120 | 120 | 90 | 60 |
| Морковь | 400 | 30 | – | – | 90 | 60 | 30 | – | 120 | 90 | 60 | – |
| | 500 | 60 | 30 | – | 120 | 90 | 60 | 30 | 150 | 120 | 90 | 60 |
| | 600 | 90 | 60 | 30 | – | 120 | 90 | 60 | – | 150 | 120 | 90 |
| Огурец* | 100 | 30 | – | – | 90 | 60 | 30 | – | 90 | 60 | 30 | – |
| | 200 | 60 | 30 | – | 120 | 90 | 60 | 30 | 120 | 90 | 60 | 30 |
| | 300 | 90 | 60 | 30 | – | 120 | 90 | 60 | – | 120 | 90 | 60 |

| Минеральные почвы | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|----|--|-----|-----|-----|
| Капуста ранняя* | 300 | 60 | 30 | – | | 40 | 20 | 20 | | 90 | 60 | 30 |
| | 400 | 90 | 60 | 30 | | 60 | 40 | 20 | | 120 | 90 | 60 |
| | 500 | 120 | 90 | 60 | | 80 | 60 | 40 | | 150 | 120 | 90 |
| Капуста среднепоздняя* | 400 | 60 | 30 | 30 | | 40 | 20 | – | | 150 | 120 | 90 |
| | 600 | 110 | 90 | 60 | | 80 | 60 | 40 | | 180 | 180 | 150 |
| | 800 | 120 | 120 | 110 | | 110 | 100 | 80 | | 210 | 210 | 210 |
| Морковь | 300 | 30 | – | – | | 60 | 10 | 10 | | 90 | 60 | 30 |
| | 500 | 90 | 30 | 30 | | 80 | 60 | 10 | | 150 | 120 | 90 |
| Свекла Столовая | 300 | 30 | – | – | | 60 | 40 | 10 | | 90 | 60 | 30 |
| | 500 | 90 | 30 | 30 | | 80 | 60 | 10 | | 150 | 120 | 90 |
| Торфяные почвы | | | | | | | | | | | | |
| Морковь | 300 | 30 | | – | | 60 | 40 | 10 | | 90 | 60 | 30 |
| | 500 | 60 | 30 | – | | 100 | 80 | 60 | | 150 | 120 | 60 |
| Свекла столовая | 300 | 30 | – | – | | 60 | 40 | 10 | | 90 | 60 | 30 |
| | 500 | 60 | 30 | – | | 100 | 80 | 60 | | 150 | 120 | 90 |

* На дерново-подзолистых и пойменных почвах фон для капусты – 40 т/га, огурца – 60–80 т/га навоза.

**Примерные дозы удобрений по д. в. для припосевного внесения
и подкормок овощных культур, кг/га**

| Культура | В рядки при посеве (посадке) | | | Первая подкормка | | | Вторая подкормка | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | N | K ₂ O |
| Капуста белокочанная: | | | | | | | | |
| ранняя | 14 | 20 | 10 | 20 | — | 30 | — | — |
| среднепоздняя | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Морковь | — | 10 | — | 15 | 10 | 20 | — | — |
| Столовая свекла | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 60 |
| Огурец | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 |
| Томат | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 30 |
| Лук репчатый | — | 10 | — | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |

Примечание. Первая подкормка овощных проводится через 15–20 дней после посадки или через 30–35 дней после сева, вторая – в начале фазы плодообразования (завязывание кочана, формирования корнеплода).

**Дозы органических (т/га) и минеральных (кг/га д. в.) удобрений
для плодоносящих садов и ягодников**

| Удобрения | Семечковые | | Косточковые | | Смородина | | Крыжовник | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | начало плодо- ношения | полное плодо- ношение | начало плодо- ношения | полное плодо- ношение | начало плодо- ношения | полное плодо- ношение | начало плодо- ношения | полное плодо- ношение |
| Навоз* | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| N | 80 | 100 | 50 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 |
| P ₂ O ₅ | 60 | 90 | 50 | 60 | 80 | 120 | 60 | 90 |
| K ₂ O | 90 | 120 | 50 | 90 | 60 | 90 | 80 | 120 |

*Органические удобрения вносят в дозе 40–45 т/га раз в три года в плодовых и 30–40 т/га – в ягодных насаждениях.

**Рекомендуемые дозы удобрений в молодых садах
(в расчете на 1 дерево)**

| Год после посадки | Диаметр приствольно- го круга, м | Органиче- ские, кг | Минеральные (по д. в.), г | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| 1–2 | 1,5–2,0 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 3–4 | 2,0–2,5 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 5–6 | 2,5–3,0 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 7–8 | 3,0–3,5 | 40 | 50 | 60 | 50 |

**Рекомендуемые дозы удобрений под землянику при содержании
в почве P_2O_5 и K_2O по 160–200 мг/кг**

| Период внесения | Органические, т/га | Минеральные (по д. в.), кг | | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | N | P_2O_5 | K_2O |
| Под предшественник, за 2 года до посадки | 40–60 | 60–80 | 100–120 | 100–120 |
| Перед посадкой (пар) | 100–120 | – | 90–110 | 100–120 |
| Новая посадка | – | 30 | – | – |
| Год плодоношения: | | | | |
| 1-й | – | 40–50 | 30–40 | 30–40 |
| 2-й | – | 50 | 50 | 50 |
| 3-й | – | 50 | – | – |

**Примерные дозы удобрений под малину при содержании
в почве P_2O_5 и K_2O по 250–300 мг/кг**

| Период внесения | Органические, т/га | Минеральные (по д. в.), кг | | |
|---|-----------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | N | P_2O_5 | K_2O |
| Перед посадкой (пар) | 120–150 | – | 120–150 | 120–150 |
| При посадке (на 100 м траншеи) | 3–5 | – | 10–20 | 10–20 |
| До вступления в плодоношение (1–2-й годы жизни) | – | 60–70 | – | – |
| В период полного плодоношения | – | 80–90 | 80–90 | 100–120 |

**Примерные дозы удобрений под смородину и крыжовник при средней
обеспеченности подвижными фосфатами и обменным калием
(по 200–250 мг/кг почвы)**

| Период внесения | Органические, т/га | Минеральные (по д. в.), кг | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | N | P_2O_5 | K_2O |
| Перед посадкой (пар) | 100–120 | – | 120–150 | 120–150 |
| При посадке (на 100 м траншеи) | 3–5 | – | 20–25 | 10–15 |
| До вступления в плодоношение | – | 60 | – | – |
| В период начального плодоношения | – | 60–80 | 60–90 | 60–90 |
| В период полного плодоношения | – | 90 | 90–120 | 90–120 |

**Расчет доз минеральных удобрений под картофель методом
элементарного баланса на урожай клубней 25 т/га**

| Показатели | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|--|---------|-------------------------------|------------------|
| 1. Вынос питательных элементов урожаем, кг/га | 135 | 35 | 267 |
| 2. Содержание в почве питательных элементов в подвижной форме, мг/кг | 2* | 150 | 180 |
| 3. Запасы питательных элементов в почве, кг/га | — | 450 | 540 |
| 4. Коэффициенты использования питательных элементов из запасов почвы, % | 20–25** | 6 | 15 |
| 5. Количество питательных элементов, получаемых растением из почвы, кг/га | 40–50 | 27 | 81 |
| 6. Внесение навоза, т/га | | 50 т/га | |
| 6.1. Содержание в навозе питательных элементов, % | 0,42 | 0,21 | 0,50 |
| 6.2. Вносится с навозом в почву, кг/га | 210 | 105 | 250 |
| 6.3. Усваивается из навоза в 1-й год, % | 25 | 30 | 60 |
| 7. Будет усвоено из навоза, кг | 52 | 31 | 150 |
| 8. Следует довести питательных элементов с минеральными удобрениями, кг/га | 38 | — | 36 |
| 9. Коэффициенты использования питательных элементов из минеральных удобрений, % | 60 | 20 | 60 |
| 10. Необходимо внести с минеральными удобрениями с учетом коэффициентов использования, кг/га | 63 | — | 60 |

* Гумус, %; ** на 1 % гумуса в почве, кг/га.

**Средние коэффициенты использования питательных элементов
из запасов почвы и вносимых удобрений в 1-й год, %**

| Питательные элементы | Запасы почвы | Минеральные удобрения | Навоз | | | Торфо- навозный компост 1:2 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | подстилочный | жидкий | полужидкий | |
| Основные культуры севооборота | | | | | | |
| Азот | 20–25* | 60 | 25 | 40–50 | 30 | 20 |
| Фосфор | 5–7 | 20 | 30 | 35 | 30 | 25 |
| Калий | 10–15 | 60–65 | 65 | 65–70 | 60 | 45 |
| Промежуточные культуры | | | | | | |
| Азот | 10–15* | 50 | 20 | 30 | 25 | – |
| Фосфор | 4–5 | 15–20 | 15 | 20 | 20 | – |
| Калий | 8–10 | 50–55 | 50 | 50–60 | 50 | – |

* На 1 % гумуса, кг/га.

Коэффициенты использования питательных веществ сельскохозяйственными культурами из удобрений и почвы

| Культуры | Коэффициенты использования из почвы, % | | Коэффициенты использования из удобрений | | |
|----------------------|--|------------------|---|-------------------------------|------------------|
| | P ₂ O ₅ | K ₂ O | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Озимая пшеница | 4 | 10 | 40 | 32 | 44 |
| Озимая рожь | 6 | 12 | 41 | 25 | 33 |
| Озимые зерновые | 6 | 12 | 42 | 26 | 34 |
| Яровая пшеница | 4 | 8 | 59 | 21 | 59 |
| Ячмень | 6 | 13 | 54 | 24 | 47 |
| Овес | 6 | 16 | 40 | 18 | 44 |
| Яровые зерновые | 6 | 13 | 52 | 23 | 47 |
| Зерновые в среднем | 6 | 13 | 49 | 24 | 44 |
| Зернобобовые (люпин) | 4 | 8 | 45 | 18 | 39 |
| Картофель | 10 | 40 | 65 | 18 | 90 |
| Лен (соломка) | 4 | 12 | 44 | 11 | 44 |
| Кукуруза (з/м) | 8 | 21 | 73 | 48 | 80 |
| Кормовая свекла | 8 | 56 | 91 | 44 | 90 |
| Однолетние травы | 8 | 45 | 78 | 39 | 85 |
| Многолетние травы | 7 | 37 | 99 | 34 | 88 |
| В т. ч.: бобовые | 7 | 42 | 82 | 39 | 90 |
| злаковые | 6 | 43 | 49 | 42 | 90 |
| бобово-злаковые | 7 | 34 | 70 | 30 | 85 |

| Культура | Коэффициенты использования из почвы | | Коэффициенты использования из удобрений** | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------------|
| | P ₂ O ₅ | K ₂ O | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
| Капуста белокочанная: ранняя | 5–10 | 30–40 | $\frac{40-45}{20}$ | $\frac{10-15}{10}$ | $\frac{40-50}{30}$ |
| поздняя | 12–15 | 40–60 | $\frac{60-65}{35}$ | $\frac{15-18}{30}$ | $\frac{45-50}{50}$ |
| Капуста цветная | 5–10 | 30–40 | $\frac{50-60}{25}$ | $\frac{10-15}{20}$ | $\frac{45-55}{40}$ |
| Томат | 4 | 20 | $\frac{35}{25}$ | $\frac{8}{10}$ | $\frac{55}{40}$ |
| Морковь столовая | 8–17 | 45–50 | $\frac{50-55}{25}$ | $\frac{10-12}{15}$ | $\frac{50-55}{50}$ |
| Свекла столовая | 18–20 | 40–55 | $\frac{60-65}{35}$ | $\frac{25-27}{30}$ | $\frac{70-75}{60}$ |
| Лук на репку | 4 | 15 | $\frac{30}{20}$ | $\frac{5}{5-8}$ | $\frac{35}{30}$ |
| Редис | 1–2 | 5–6 | $\frac{5-6}{-}$ | $\frac{2-3}{-}$ | $\frac{8-10}{-}$ |

** в числителе – из минеральных удобрений, в знаменателе – из органических.

Поступление элементов питания с органическими удобрениями

| Вид органических удобрений | Содержание, кг/т | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------|------------------|------|-----|-----------------|
| | Органическое вещество | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | CaO | MgO | SO ₂ |
| Навоз КРС на соломистой подстилке | 210 | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 1,1 | 0,6 |
| Навоз КРС на торфяной подстилке | 220 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 |
| Навоз КРС полужидкий | 125 | 3,05 | 1,5 | 4,0 | 1,3 | 0,9 | 0,3 |
| Навоз КРС жидкий | 40 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Навозные стоки КРС | 18 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | — | — | — |
| Навоз свиной жидкий | 40 | 2,5 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| Компост (навоз : торф = 1:1) | 220 | 5,0 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 0,6 | 0,3 |
| Компост (навоз : торф = 2:1) | 220 | 5,5 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 0,8 | 0,4 |
| Компост (навоз : торф = 3:1) | 220 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 |
| Помет птичий смешанный | 320 | 15,0 | 14,0 | 7,0 | 17,0 | 5,0 | 3,0 |
| Помет птичий полужидкий | 110 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 2,0 |
| Компост торфопометный (1:1) | 250 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 1,5 |
| Компост торфопометный (1:2) | 250 | 12,5 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 |
| Смешанный (сборный) компост | 200 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 0,8 | 0,4 |
| Солома зерновых культур | 800 | 4,0 | 1,5 | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| Зеленое удобрение (смесь) | 140 | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
| Ботва сахарной свеклы | 120 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |

Потери элементов питания при выщелачивании из наиболее распространенных почв Республики Беларусь

| Почвы | N _{общ} | P ₂ O ₅ | K ₂ O | CaO | MgO | SO ₂ |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|
| | Потери при выщелачивании, кг/га в год | | | | | |
| Дерново-подзолистые суглинистые | 16 | 0,2 | 11 | 64 | 13 | 24 |
| Дерново-подзолистые супесчаные, развивающиеся на связных породах | 18 | 0,1 | 20 | 65 | 14 | 25 |
| Дерново-подзолистые супесчаные, развивающиеся на рыхлых породах | 20 | 0,1 | 26 | 69 | 15 | 26 |
| Дерново-подзолистые супесчаные, развивающиеся на песках | 39 | 0,1 | 33 | 78 | 25 | 34 |
| Торфяные | 39 | 0,1 | 10 | 122 | 17 | 37 |

Потери основных элементов питания с эрозией почвы

| Степень эродированности, величина смыва почвы, т/га в год | Доля эродированных почв, % от площади пахотных земель | Потери, кг/га | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|
| | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | CaO | MgO | SO ₂ |
| Слабая, 2,1–5,0 | 5,1–10,0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,05 |
| Средняя, 5,1–10,0 | 10,1–25,0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0,10 |
| Сильная, 10,1–20,0 | 25,1–50,0 | 15 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0,15 |
| Очень сильная, > 20,1 | >50,0 | 20 | 10 | 15 | 25 | 12 | 0,20 |

Оптимальная интенсивность баланса в зависимости от обеспеченности почв фосфором и калием

| P ₂ O ₅ | | K ₂ O | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Содержание в почве, мг/кг | Интенсивность баланса, % | Содержание в почве, мг/кг | Интенсивность баланса, % |
| менее 100 | 150–180 | менее 80 | 180–200 |
| 101–150 | 130–150 | 81–140 | 150–180 |
| 151–250 | 100–120 | 141–200 | 120–150 |
| 251–300 | 50–70 | 201–300 | 80–100 |
| 301–400 | 40–50 | более 300 | 30–60 |

Примерные нормативы баланса азота, фосфора и калия за севооборот (% к выносу) в зависимости от агрохимических свойств почвы в овощных севооборотах

| Класс почвы | Степень обеспеченности почвы питательными элементами | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|-------------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | Очень низкая | Не рекомендуется для возделывания овощных культур | | |
| 2 | Низкая | 130–145 | 265–280 | 130–150 |
| 3 | Средняя | 115–130 | 185–200 | 110–130 |
| 4 | Повышенная | 100–115 | 145–160 | 80–100 |
| 5 | Высокая | 85–100 | 100–130 | 60–80 |
| 6 | Очень высокая | 70–85 | 85–100* | 40–60 |

* В первые годы можно ограничиться внесением небольших количеств фосфора в рядки (при посеве).

**Нормативы затрат фосфорных удобрений сверх выноса их урожаем
для увеличения содержания подвижного фосфора
на 10 мг/кг почвы, кг/га P_2O_5**

| Почва | рНКСІ | Исходное содержание P_2O_5 , мг/кг почвы | | | |
|------------------|-----------|--|--------|---------|---------|
| | | Менее 60 | 61–100 | 101–150 | 151–250 |
| Суглинистая | 4,5–5,0 | 75 | 69 | 65 | 69 |
| | 5,1–5,5 | 70 | 63 | 57 | 58 |
| | 5,6–6,0 | 65 | 56 | 49 | 47 |
| Супесчаные | 4,5–5,0 | 70 | 64 | 60 | 64 |
| | 5,1–5,5 | 65 | 58 | 52 | 52 |
| | 5,6–6,0 | 60 | 51 | 44 | 42 |
| Песчаные | 4,5–5,0 | 65 | 59 | 55 | 59 |
| | 5,1–5,5 | 60 | 53 | 47 | 48 |
| Торфяно-болотные | В среднем | | 18 | | |

**Нормативные затраты калийных удобрений сверх выноса с урожаем для
увеличения содержания подвижного калия на 10 мг/кг почвы, кг/га K_2O**

| Гранулометрический состав почвы | Интенсивность баланса, % | Исходное содержание K_2O , мг/кг почвы | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------|
| | | Менее 80 | 81–140 | 141–200 |
| Суглинистая | 130 | 30 | 42 | 55 |
| | 170 | 40 | 52 | 65 |
| | 210 | 50 | 62 | 75 |
| Супесчаные | 130 | 47 | 58 | 72 |
| | 170 | 57 | 68 | 82 |
| | 210 | 67 | 78 | 92 |
| Песчаные | 130 | 58 | 70 | 83 |
| | 170 | 68 | 80 | 93 |
| | 210 | 78 | 90 | 103 |
| Торфяно-болотные | 130 | В среднем | 13 | |

**Вынос кальция, магния и серы с 1 ц основной и соответствующим количеством
побочной продукции на минеральных почвах, кг**

| Культуры | Вид продукции | CaO | MgO | S |
|---------------------------------------|------------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Озимая пшеница | Зерно | 0,47 | 0,31 | 0,50 |
| Озимая рожь | Зерно | 0,41 | 0,31 | 0,60 |
| Озимый ячмень | Зерно | 0,46 | 0,31 | 0,83 |
| Озимая тритикале | Зерно | 0,42 | 0,30 | 0,86 |
| Яровая пшеница | Зерно | 0,32 | 0,24 | 0,60 |
| Яровой ячмень | Зерно | 0,48 | 0,30 | 0,90 |
| Овес | Зерно | 0,42 | 0,33 | 1,20 |
| Гречиха | Зерно | 0,81 | 0,34 | 0,80 |
| Просо | Зерно | 0,36 | 0,18 | 1,20 |
| Яровая тритикале | Зерно | 0,48 | 0,30 | 0,76 |
| Люпин | Зерно | 1,88 | 0,85 | 1,42 |
| Пелюшка | Зерно | 2,18 | 0,80 | 1,64 |
| Горох | Зерно | 2,40 | 0,48 | 1,05 |
| Фасоль | Зерно | 2,15 | 0,51 | 0,80 |
| Бобы кормовые | Зерно | 2,50 | 0,74 | 1,19 |
| Сераделла | Зерно | 2,10 | 0,87 | 1,20 |
| Вика яровая | Зерно | 2,14 | 0,66 | 1,21 |
| Лен-долгунец | Волокно | 1,50 | 0,78 | 1,60 |
| Конопля | Волокно | 1,47 | 0,80 | 2,16 |
| Сахарная свекла | Корнеплоды | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| Кормовая свекла | Корнеплоды | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| Куузику | Корнеплоды | 0,10 | 0,09 | 0,12 |
| Морковь кормовая | Корнеплоды | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| Турнепс | Корнеплоды | 0,08 | 0,07 | 0,20 |
| Куузику | Корнеплоды | 0,10 | 0,09 | 0,12 |
| Морковь кормовая | Корнеплоды | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| Турнепс | Корнеплоды | 0,08 | 0,07 | 0,20 |
| Брюква кормовая | Корни | 0,09 | 0,07 | 0,10 |
| Картофель столовый | Клубни | 0,22 | 0,11 | 0,08 |
| Картофель семенной | Клубни | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
| Картофель технический | Клубни | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | Сено | 0,46 | 0,29 | 0,40 |
| Однолетние злаковые травы | З/масса | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 0,69 | 0,28 | 0,40 |
| Однолетние бобовые травы | З /масса | 0,35 | 0,09 | 0,08 |
| Однолетние бобовые травы | Сено | 1,72 | 0,46 | 0,41 |
| Многолетние бобово- злаковые травы | Сено | 1,30 | 0,48 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------------------|------|------|------|
| Многолетние бобово-злаковые травы | З /масса | 0,24 | 0,09 | 0,07 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 0,49 | 0,20 | 0,15 |
| Многолетние злаковые травы | З /масса | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Многолетние бобовые травы | Сено | 1,53 | 0,76 | 0,26 |
| Многолетние бобовые травы | З /масса | 0,30 | 0,15 | 0,05 |
| Сенокосы | Сено | 0,95 | 0,41 | 0,20 |
| Сенокосы естественные | Сено | 0,90 | 0,10 | 0,14 |
| Пастбища | З /масса | 0,25 | 0,12 | 0,05 |
| Пастбища естественные | З /масса | 0,20 | 0,10 | 0,04 |
| Рапс яровой | З /масса | 0,30 | 0,12 | 0,06 |
| Рапс озимый | З /масса | 0,28 | 0,11 | 0,04 |
| Редька масличная | З /масса | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
| Озимая рожь | З /масса | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Озимый рапс | Семена | 0,52 | 0,19 | 1,90 |
| Яровой рапс | Семена | 0,51 | 0,20 | 2,70 |
| Многолетние бобовые травы | Семена | 1,91 | 0,90 | 3,84 |
| Многолетние злаковые травы | Семена | 0,41 | 0,35 | 4,95 |
| Кукуруза | Зерно | 0,50 | 0,31 | 0,08 |
| Плодовые деревья | Плоды | – | – | – |
| Ягодники | Ягоды | – | – | – |
| Капуста белокочанная | Кочаны | 0,58 | 0,20 | 0,20 |
| Томаты | Плоды | 0,20 | 0,17 | 0,10 |
| Огурцы | Плоды | 0,15 | 0,10 | 0,06 |
| Лук | Луковицы | 0,20 | 0,11 | 0,06 |
| Овощи (в среднем) | Товарная продукция | 0,32 | 0,15 | 0,05 |
| Зеленые овощи | Товарная продукция | – | – | – |
| Растениеводческая продукция (на 100 к. ед.) | К. ед. | 0,81 | 0,43 | 0,53 |

**Поступление кальция, магния и серы с минеральными удобрениями
и известковыми материалами**

| Удобрения, известковые материалы | CaO ₃ | MgO | S, % |
|--|------------------------------|-----|-----------|
| | кг/100 кг основного д. в. | | |
| Суперфосфат простой | 117 | — | 9,0–13,0 |
| Суперфосфат двойной | 31 | — | — |
| Молотый известняк | 56 | — | — |
| Молотый доломит | 30 | 20 | — |
| Молотый доломитизированный известняк | 50 | 5 | — |
| Мел | 56 | — | — |
| Гашеная известь | 56 | — | — |
| Доломитовая мука | 30 | 20 | — |
| Дефекат | 56 | — | — |
| Сланцевая зола | 58 | 5 | — |
| Цементная пыль | 58 | 1 | 1,0 |
| Сульфат аммония (серноокислый аммоний) | — | — | 23,0–24,2 |
| Сульфат калия (серноокислый калий) | — | — | 18,0 |
| Сульфат магния (серноокислый магний) | — | — | 18,6 |
| Сульфат натрия (серноокислый натрий) | — | — | 22,6 |
| Фосфогипс | 23 | — | 17,7–20,6 |

**Дозы известковых удобрений (CaCO_3 , т/га) при известковании кислых
минеральных почв сельскохозяйственных угодий**

| Гранулометрический состав пахотного горизонта | Содержание гумуса, % | рН солевой вытяжки | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 4,25 и менее | 4,26–4,50 | 4,51– 4,75 | 4,76– 5,00 | 5,01– 5,25 | 5,26–5,50 | 5,51– 5,75 | 5,76– 6,00 |
| Минеральные | | | | | | | | | |
| Песчаные | Менее 1,50 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | – | – |
| | 1,51–3,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | – | – |
| | более 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | – | – |
| Рыхлосупесчаные | Менее 1,50 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | – |
| | 1,51–3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | – |
| | более 3,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | – |
| Связносупесчаные | 2,0 и менее | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| | более 2,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| Легко-и среднесуглинистые | 2,0 и менее | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 |
| | более 2,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Тяжелосуглинистые и глини- стые | Любое | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
| Торфяные | | | | | | | | | |
| Торфяные | | 8,0 (12,0)* (13,0)(19,0*)** | | | | | | | |

Примечание. 3,0 – для почв с уровнем загрязнения 1–5 Ки/км² по цезию-137 или 0,15–0,30 Ки/км² по стронцию-90.

* Для почв с pH_{KCl} 4,0 и ниже; ** для почв с уровнем загрязнения 1,0–4,9 Ки/км² цезием-137 или 0,15–0,30 Ки/км² стронцием-90.

**Средние дозы известковых удобрений (т/га CaCO_3)
для известкования кислых почв сенокосов и пастбищ**

| Группы почв | pH солевой вытяжки | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 4,25 и менее | 4,26– 4,50 | 4,51– 4,75 | 4,76– 5,00 | 5,01– 5,25 | 5,26– 5,50 | 5,51– 5,75 | 5,76– 6,00 |
| Незагрязненные радионуклидами земли | | | | | | | | |
| Песчаные | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | – | – |
| Рыхлосупесчаные | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | – | – |
| Связносупесчаные | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | – | – |
| Легко- и среднесуглинистые | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Тяжелосуглинистые и глинистые | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
| Торфяные | 8,0 (12,0)* | 6,5 | 5,0 | 3,0 | – | – | – | – |
| Плотность загрязнения Cs-137 – 1,0–4,90; Sr-90 – 0,15–0,29 Ки/км² | | | | | | | | |
| Песчаные | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | – | – |
| Рыхлосупесчаные | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | – |
| Связносупесчаные | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| Суглинистые и глинистые | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Торфяные | 13,0 (19,0)* | 10,0 | 7,5 | 5,0 | – | – | – | – |
| Плотность загрязнения Cs-137 – 5,0–40,0; Sr-90 – 0,30–3,0 Ки/км² | | | | | | | | |
| Песчаные | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | – | – |
| Рыхлосупесчаные | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 4,5 | – |
| Связносупесчаные | 13,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,5 |
| Суглинистые и глинистые | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,5 | 8,0 | 7,0 |
| Торфяные | 13,0 (19,0)* | 10,0 | 7,5 | 5,0 | – | – | – | – |

* Для почв с pH 4,0 и ниже.

**Содержание энергии в 1 ц основной продукции в натуре
(по принятой условной стандартной влажности), МДж**

| Культура | Энергия |
|-----------------------------------|---------|
| Зерно | |
| Люпин | 18,04 |
| Озимая: рожь | 16,76 |
| пшеница | 16,46 |
| Яровая пшеница | 16,61 |
| Ячмень | 16,45 |
| Овес | 16,17 |
| Гречиха | 16,67 |
| Люпин | 18,04 |
| Фасоль | 16,37 |
| Горох | 17,69 |
| Вика | 16,34 |
| Кукуруза (зерно) | 15,14 |
| Кукуруза (зеленая масса) | 4,10 |
| Солома | |
| Пшеница озимая | 14,40 |
| Рожь озимая | 14,32 |
| Ячмень | 13,76 |
| Овес | 14,21 |
| Горох | 12,69 |
| Люпин | 15,84 |
| Лен-долгунец: волокно | 18,01 |
| семена | 21,27 |
| Сахарная свекла (корнеплоды) | 4,39 |
| Кормовые корнеплоды | 2,09 |
| Картофель (клубни) | 3,80 |
| Многолетние травы (зеленая масса) | 3,67 |
| Однолетние травы (зеленая масса) | 2,76 |
| Многолетние травы (сено) | 15,46 |
| Однолетние травы | 15,50 |

**Энергозатраты на производство удобрений (минеральные – на 1 кг д. в.,
органические и известковые – на 1 кг физической массы)**

| Вид и формы удобрений | Содержание д. в., % | Энергетический эквивалент, МДж | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| | | действующего вещества | физической массы |
| Азотные | | 80,0 | |
| Фосфорные | | 13,8 | |
| Калийные | | 8,8 | |
| Органические (в среднем) | | 0,42 | |
| Торфо-навозные компосты | | 1,70 | |
| Известковые удобрения (в среднем) | | 3,8 | |
| Доломитовая мука | | 3,6 | |
| Азотные | | | |
| Азот в сложных удобрениях | – | 152,7 | – |
| Сульфат аммония | 20,5 | 80 | 16,4 |
| Аммиачная селитра | 34,5 | 80 | 27,6 |
| Натриевая селитра | 16,0 | 80 | 12,8 |
| Кальциевая селитра | 17,0 | 80 | 13,6 |
| Мочевина | 46,0 | 80 | 26,8 |
| КАС | 28,0 | 80 | 22,4 |
| Аммиачная вода | 20,5 | 80 | 16,4 |
| Аммиак жидкий | 82,0 | 80 | 65,0 |
| Фосфорные | | | |
| Фосфор в сложных удобрениях | – | 27,3 | – |
| Сульфат простой гранулированный | 20,0 | 13,8 | 2,8 |
| Суперфосфат двойной | 46,0 | 13,8 | 6,3 |
| Суперфосфат аммонизированный | N ₈ P ₃₃ | 51,5 | 21,1 |
| Калийные | | | |
| Калий в сложных удобрениях | – | 29,4 | – |
| Хлористый калий | 60 | 8,8 | 5,3 |
| Калийная соль | 40 | 8,8 | 3,5 |
| Сульфат калия | 48 | 8,8 | 4,2 |
| Комплексные | | | |
| Нитрофоска | НРК по 12% | 51,5 | 18,5 |
| Нитроаммофоска | НРК по 17% | 51,5 | 26,2 |
| Азофоска | НРК по 16% | 51,5 | 24,7 |
| Аммофосфат | N ₇ P ₄₇ | 51,5 | 27,8 |
| Аммофос | N ₁₂ P ₅₀ | 51,5 | 31,9 |
| АФК | N ₁₀ P ₂₀ K ₂₀ | 51,5 | 25,8 |
| АФК | N ₅ P ₁₆ K ₃₅ | 51,5 | 28,8 |
| ЖКУ | N ₁₀ P ₃₄ | 51,5 | 22,7 |
| Кристаллин | N ₂₀ P ₁₆ K ₂₀ | 51,5 | 28,8 |
| Микроудобрения | | | |
| Борные | | 12,5 | 18,8 |
| Цинковые | | 2,5 | 6,9 |

Примерные средние энергозатраты на погрузку, транспортировку и внесение органических удобрений при разных технологиях внесения

| Прямоточная | | Перевалочная | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Доза внесения, т/га | Энергозатраты, МДж/га | Доза внесения, т/га | Энергозатраты, МДж/га |
| 20 | 4363 | 20 | 5387 |
| 40 | 8475 | 40 | 10366 |
| 60 | 12379 | 60 | 14937 |

Примерные энергозатраты на уборку, доработку и реализацию дополнительного урожая за счет удобрений

| Культура, угодья | Вид продукции | Урожайность, ц/га | Энергозатраты, МДж/ц |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Озимая рожь | Зерно | 30–40 | 328 |
| Яровой ячмень | -//- | 30–40 | 293 |
| Лен-долгунец | Льносоломка | 30–40 | 193 |
| Картофель | Клубни | 150–250 | 79 |
| Сахарная свекла | Корнеплоды | 250–350 | 67 |
| Кормовые корнеплоды | -//- | 600–800 | 40 |
| Кукуруза | Силос | 300–400 | 35 |
| Улучшенные сенокосы | Зеленая масса | 170–250 | 42 |
| Многолетние травы | Сенаж | | 84 |
| -//- | Зеленая масса | | 35 |
| -//- | Сенаж | 80–120 | 65 |
| Многолетние травы | -//- | | 84 |
| Многолетние травы | Сено прессованное | 40–60 | 93 |
| | Рассыпное | 30–50 | 105 |
| Однолетние травы | Зеленая масса | 160–200 | 39 |
| Вико-овсяная и другие травосмеси | Зеленая масса | 200–250 | 44 |

Средние энергозатраты на хранение, транспортировку и внесение 1 ц минеральных удобрений в зависимости от дальности перевозки, МДж

| Транспортировка от рельсового склада до хозяйственного, км | Транспортировка от хозяйственного склада до поля, км | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|
| | Прямоточная технология | | | | | Перегрузочная технология | | |
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 0 | 53,4 | 59,9 | 69,3 | 83,9 | 129,9 | 60,9 | 70,0 | 82,7 |
| 10 | 65,1 | 71,6 | 81,5 | 96,0 | 139,0 | 73,1 | 82,1 | 94,8 |
| 20 | 82,4 | 89,9 | 98,7 | 113,2 | 156,2 | 90,3 | 99,8 | 112,0 |
| 40 | 118,1 | 124,6 | 134,1 | 147,9 | 191,6 | 125,7 | 134,7 | 147,4 |

Коэффициенты перевода продукции растениеводства в зерновые единицы

| Культуры | Коэффициент |
|----------------------------------|-------------|
| Пшеница, рожь, ячмень | 1,00 |
| Горох, бобы | 1,40 |
| Кукуруза | 0,80 |
| Вика | 1,20 |
| Овес | 0,80 |
| Соя | 1,80 |
| Сахарная свекла (корнеплоды) | 0,26 |
| Лен-долгунец: | |
| волокно | 3,85 |
| семена | 1,65 |
| соломка | 0,41 |
| Лен-кудряш: семена | 1,65 |
| Хлопок-сырец | 1,50 |
| Конопля среднерусская: | |
| волокно | 3,85 |
| семена | 1,63 |
| соломка | 0,40 |
| Подсолнечник | 1,47 |
| Просо | 0,9 |
| Гречиха | 1,40 |
| Картофель (клубни) | 0,25 |
| Овощи | 0,16 |
| Кормовые корнеплоды | 0,13–0,20 |
| Косточковые плоды | 0,14 |
| Виноград | 0,22 |
| Семечковые плоды | 0,26 |
| Цикорий | 0,26 |
| Клещевина | 1,75 |
| Эфиромасличные | 1,27 |
| Сено: | |
| однолетних трав | 0,40 |
| многолетних трав | 0,50 |
| Кукуруза на силос и зеленый корм | 0,17 |
| Силосные культуры (без кукурузы) | 0,12 |
| Горчица | 1,56 |
| Табак | 1,65 |
| Кунжут | 1,75 |
| Махорка | 1,47 |
| Мак | 1,14 |
| Солома: | |
| озимых культур | 0,20 |
| яровых культур | 0,25 |
| Ягоды | 0,12 |

**Коэффициенты для пересчета продукции растениеводства
в кормовые единицы**

| Сельскохозяйственные культуры (основная продукция с учетом побочной) | Коэффициент пересчета |
|---|--------------------------|
| Зерновые культуры (в среднем) | 1,44 |
| Озимая пшеница | 1,36 |
| Озимая рожь | 1,45 |
| Яровая пшеница | 1,37 |
| Ячмень | 1,50 |
| Овес | 1,31 |
| Смесь колосовых | 1,39 |
| Гречиха | 2,19 |
| Просо | 0,96 |
| Горох | 1,40 |
| Кормовые бобы | 1,29 |
| Вика и виковые смеси на зерно | 1,40 |
| Люпин | 1,16 |
| Сераделла | 1,40 |
| Чечевица | 1,40 |
| Фасоль | 1,17 |
| Прочие зернобобовые | 1,39 |
| Рапс озимый и яровой | 2,04 |
| Лен-долгунец: | |
| семена | 2,04 |
| волокно | 7,00 |
| волокно с учетом семян | 8,50 |
| Сахарная свекла (корни с учетом ботвы) | 0,31 |
| Сахарная свекла (корни без ботвы) | 0,26 |
| Картофель | 0,30 |
| Овощи открытого грунта | 0,13 |
| Кормовые корнеплоды (корни с учетом ботвы) | 0,18 |
| Кукуруза на зеленую массу | 0,20 |
| Силосные культуры без кукурузы | 0,19 |
| Бахчи кормовые | 0,09 |
| Однолетние травы, сенокосы и пастбища: | |
| на сено | 0,49 |
| на зеленый корм | 0,18 |
| выпас | 0,18 |
| семена | 2,0 |
| Многолетние травы посева текущего года и прошлых лет: | |
| на сено | 0,51 |
| зеленый корм | 0,21 |
| выпас | 0,21 |
| семена | 12,0 |

**Нормативы затрат питательных элементов удобрений (кг) для формирования
1 ц урожая основной продукции сельскохозяйственных культур
(с учетом побочной) в Беларуси**

| Культура | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|--------------------------|------|-------------------------------|------------------|
| Озимая рожь | 2,8 | 2,5 | 3,3 |
| Озимая пшеница | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
| Яровая пшеница* | 3,7 | 3,5 | 2,9 |
| Ячмень | 2,6 | 2,3 | 2,9 |
| Овес | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
| Гречиха | 4,4 | 5,1 | 6,4 |
| Горох | 1,7 | 2,6 | 2,6 |
| Лен-долгунец | 4,6 | 9,9 | 13,5 |
| Кукуруза (силос) | 0,29 | 0,21 | 0,23 |
| Сахарная свекла | 0,48 | 0,37 | 0,52 |
| Кормовая свекла | 0,25 | 0,17 | 0,29 |
| Картофель | 0,40 | 0,42 | 0,55 |
| Однолетние травы (сено) | 2,2 | 1,6 | 2,1 |
| Многолетние травы (сено) | 0,7 | 1,1 | 1,5 |

* В России.

**Средние дозы удобрений под основные сельскохозяйственные культуры
на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах**

| Культура | Планир. урожай- ность, т/га | Навоз, т/га | Азотные удобре- ния, кг/га д. в. | Фосфорные удобрения, кг/га д. в. | | | | | Калийные удобрения, кг/га д. в. | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Содержание P ₂ O ₅ в почве, мг/кг | | | | | Содержание K ₂ O в почве, мг/кг | | | | |
| | | | | <100 | 101–150 | 151–200 | 201–300 | 301–400 | <80 | 81–140 | 141–200 | 201–300 | 301–400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Озимые зерновые (зерно) | 2,0–3,0 | 30 | 40–60 | 50–70 | 40–60 | 30–40 | 20–30 | – | 60–80 | 50–60 | 40–50 | 30–40 | – |
| | 3,1–4,0 | 30 | 60–80 | 70–90 | 60–70 | 40–60 | 30–40 | 15–20 | 80–100 | 60–80 | 50–70 | 40–50 | 30–35 |
| | 4,1–5,0 | 30 | 80–90 | –/– | 70–80 | 60–70 | 40–50 | 20–25 | –/– | 80–100 | 70–90 | 50–70 | 35–40 |
| | 5,1–6,0 | 30 | 90–100 | –/– | –/– | 70–80 | 50–60 | 25–30 | –/– | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 40–45 |
| | 6,1–7,0 | 30 | 100–110 | –/– | –/– | 80–90 | 60–75 | 30–35 | –/– | –/– | 110–130 | 90–110 | 45–50 |
| | 7,1–8,0 | 30 | 110–120 | –/– | –/– | –/– | 75–90 | 35–40 | –/– | –/– | –/– | 110–130 | 50–60 |
| Яровые зерновые (зерно) | 2,0–3,0 | послед. | 50–60 | 50–65 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | – | 60–80 | 50–70 | 40–50 | 30–40 | – |
| | 3,1–4,0 | 60 | 60–70 | 65–80 | 55–70 | 40–55 | 30–40 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 50–70 | 40–60 | 30–35 |
| | 4,1–5,0 | послед. | 70–80 | –/– | 70–80 | 55–70 | 40–50 | 20–25 | –/– | 90–110 | 70–90 | 60–80 | 35–40 |
| | 5,1–6,0 | 60 | 80–90 | –/– | –/– | 70–80 | 50–60 | 25–30 | –/– | 110–130 | 90–110 | 80–100 | 40–45 |
| | 6,1–7,0 | послед. | 90–100 | –/– | –/– | 80–90 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 120–140 | 100–120 | 45–50 |
| | 7,1–8,0 | 60 | 100–110 | –/– | –/– | –/– | 70–80 | 35–40 | –/– | –/– | –/– | 120–140 | 50–60 |
| Зерно- бобовые (зерно) | 1,5–2,0 | – | – | 50–70 | 40–60 | 30–45 | 20–30 | – | 80–100 | 70–90 | 60–70 | 40–60 | – |
| | 2,1–2,5 | – | – | 70–90 | 60–80 | 45–60 | 30–40 | 10–15 | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 60–80 | 20–30 |
| | 2,6–3,5 | – | – | –/– | 80–100 | 60–75 | 40–50 | 10–15 | –/– | 110–130 | 90–110 | 80–100 | 30–40 |
| | 3,6–4,5 | – | – | –/– | –/– | 75–90 | 50–60 | 15–20 | –/– | –/– | 110–130 | 10–120 | 40–50 |
| Картофель (клубни) | 15,0–0,0 | 60 | 50–60 | 60–70 | 40–50 | 30–40 | 20–25 | – | 70–80 | 50–60 | 40–50 | 30–40 | – |
| | 20,1–25,0 | 60 | 60–70 | 70–80 | 50–60 | 40–50 | 25–30 | 1520 | 80–100 | 60–80 | 50–60 | 40–50 | 30–35 |
| | 25,1–30,0 | 60 | 70–85 | –/– | 60–70 | 50–60 | 30–40 | 20–25 | –/– | 80–100 | 60–80 | 50–60 | 35–40 |
| | 30,1–35,0 | 60 | 85–100 | –/– | –/– | 60–70 | 40–50 | 25–30 | –/– | –/– | 80–100 | 60–80 | 40–50 |
| | 35,1–40,0 | 60 | 100–120 | –/– | –/– | 70–80 | 50–60 | 30–40 | –/– | –/– | 100–120 | 80–100 | 50–60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------|-----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Лен- долгунец (волокно) | 0,5–0,7 | – | 20–25 | 70–90 | 60–75 | 50–60 | 40–50 | 10–15 | 90–110 | 80–100 | 70–90 | 50–70 | 30–40 |
| | 0,7–0,9 | – | 25–30 | –/– | 75–90 | 60–75 | 50–60 | 15–20 | –/– | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 40–45 |
| | 0,9–1,1 | – | 30–35 | –/– | –/– | 75–90 | 60–75 | 20–25 | –/– | –/– | 110–130 | 90–110 | 45–50 |
| Сахарная свекла (корни) | 20,0–30,0 | 60 | 60–90 | 70–90 | 60–80 | 50–60 | 30–40 | – | 80–100 | 70–90 | 50–70 | 40–60 | – |
| | 30,1–40,0 | 60 | 90–110 | 90–110 | 80–100 | 60–80 | 40–50 | 15–20 | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 60–80 | 25–35 |
| | 40,1–45,0 | 60 | 110–120 | 110–120 | 100–110 | 80–90 | 50–55 | 20–25 | 120–140 | 110–130 | 90–100 | 80–90 | 35–40 |
| | 45,1–50,0 | 60 | 120–130 | –/– | 110–120 | 90–10 | 55–60 | 25–30 | –/– | 130–150 | 100–120 | 90–100 | 40–45 |
| | 50,1–55,0 | 60 | 130–140 | –/– | –/– | 100–110 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 120–140 | 100–110 | 45–50 |
| | 55,1–60,0 | 60 | 140–150 | –/– | –/– | 110–120 | 70–80 | 35–40 | –/– | –/– | 140–150 | 110–120 | 50–60 |
| Гречиха (зерно) | 1,0–1,5 | – | 35–45 | 40–60 | 30–40 | 25–35 | 20–30 | – | 60–80 | 50–70 | 40–60 | 25–35 | – |
| | 1,6–2,0 | – | 45–55 | 60–80 | 40–60 | 35–50 | 30–40 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 60–80 | 35–45 | 20–25 |
| | 2,1–2,5 | – | 55–70 | –/– | 60–80 | 50–70 | 40–50 | 20–25 | –/– | 90–110 | 80–90 | 45–55 | 25–30 |
| | 2,6–3,0 | – | 70–90 | –/– | –/– | 70–90 | 50–60 | 25–30 | –/– | –/– | 90–100 | 55–65 | 30–40 |
| Озимый рапс (семена) | 1,5–2,0 | – | 60–80 | 60–75 | 50–65 | 40–50 | 30–40 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 60–80 | 40–50 | 10–20 |
| | 2,1–2,5 | – | 80–100 | 75–90 | 65–80 | 50–65 | 40–50 | 20–25 | 100–120 | 90–110 | 80–90 | 50–60 | 20–30 |
| | 2,6–3,0 | – | 100–120 | –/– | 80–95 | 65–80 | 50–60 | 25–30 | –/– | 110–120 | 90–100 | 60–70 | 30–40 |
| | 3,1–3,5 | – | 120–140 | –/– | –/– | 80–95 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 100–110 | 70–80 | 40–45 |
| | 3,6–4,0 | – | 140–160 | –/– | –/– | 95–110 | 70–80 | 35–40 | –/– | –/– | 110–120 | 80–90 | 45–50 |
| Яровой рапс (семена) | 1,5–2,0 | – | 50–70 | 60–70 | 50–60 | 40–50 | 30–35 | 10–15 | 70–90 | 60–80 | 50–70 | 30–40 | 10–20 |
| | 2,1–2,5 | – | 70–90 | 70–85 | 60–70 | 50–60 | 35–40 | 15–20 | 90–110 | 80–90 | 70–80 | 40–50 | 20–25 |
| | 2,6–3,0 | – | 90–110 | –/– | 70–80 | 60–70 | 40–50 | 20–25 | –/– | 90–100 | 80–90 | 50–60 | 25–30 |
| | 3,1–3,5 | – | 110–130 | –/– | –/– | 70–80 | 50–60 | 25–30 | –/– | –/– | 90–100 | 60–70 | 30–35 |
| | 3,6–4,0 | – | 130–150 | –/– | –/– | 80–95 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 100–110 | 70–75 | 35–40 |
| Кукуруза (силос) | 20,0–30,0 | 80 | 60–80 | 60–80 | 50–60 | 40–50 | 20–30 | – | 80–100 | 70–90 | 50–70 | 40–60 | – |
| | 30,1–35,0 | 80 | 80–90 | 80–90 | 60–70 | 50–55 | 30–35 | 15–20 | 100–120 | 90–100 | 70–90 | 60–70 | 30–35 |
| | 35,1–40,0 | 80 | 90–100 | 90–100 | 70–80 | 55–60 | 35–40 | 20–25 | 120–140 | 100–110 | 90–10 | 70–80 | 35–40 |
| | 40,1–45,0 | 80 | 100–110 | –/– | 80–90 | 60–70 | 40–45 | 25–30 | –/– | 110–120 | 100–110 | 80–90 | 40–45 |
| | 45,1–50,0 | 80 | 110–120 | –/– | –/– | 70–80 | 45–50 | 30–35 | –/– | –/– | 110–120 | 90–100 | 45–50 |
| | 50,1–55,0 | 80 | 120–130 | –/– | –/– | 80–90 | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | 120–130 | 100–110 | 50–55 |
| | 55,1–60,0 | 80 | 130–150 | –/– | –/– | 90–100 | 60–70 | 40–45 | –/– | –/– | 130–140 | 110–120 | 55–60 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|---------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Кормовая свекла (корни) | 20,0–30,0 | 80 | 40–60 | 50–70 | 30–50 | 20–40 | 15–30 | – | 60–100 | 40–80 | 30–60 | 20–40 | – |
| | 30,1–50,0 | 80 | 60–100 | 70–110 | 50–80 | 40–70 | 30–50 | 10–20 | 100–180 | 80–150 | 60–110 | 40–60 | 20–30 |
| | 50,1–70,1 | 80 | 100–140 | –/– | –/– | 70–100 | 50–70 | 20–30 | –/– | –/– | 110–160 | 60–80 | 30–40 |
| | 70,1–90,0 | 80 | 140–180 | –/– | –/– | –/– | 70–80 | 30–40 | –/– | –/– | –/– | 80–110 | 40–60 |
| Однолетние бобовые травы (з/м) | 10,0–20,0 | – | – | 30–50 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | – | 70–100 | 50–80 | 40–70 | 30–50 | – |
| | 20,1–30,0 | – | – | 50–70 | 40–60 | 30–50 | 20–30 | – | 100–130 | 80–110 | 70–100 | 50–70 | 20–30 |
| | 30,1–40,0 | – | – | –/– | –/– | 50–70 | 30–40 | 10–20 | –/– | –/– | 100–120 | 70–90 | 30–40 |
| | 40,1–50,0 | – | – | –/– | –/– | –/– | 40–50 | 10–20 | –/– | –/– | –/– | 90–110 | 40–50 |
| Однолетние злаковые травы (з/м) | 10,0–20,0 | – | 50–70 | 30–50 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | – | 80–110 | 60–90 | 50–80 | 40–60 | – |
| | 20,1–30,0 | – | 70–90 | 50–70 | 40–60 | 30–50 | 20–30 | – | 110–140 | 90–120 | 80–110 | 60–80 | 30–35 |
| | 30,1–40,0 | – | 90–110 | –/– | –/– | 50–70 | 30–40 | 10–20 | –/– | –/– | 110–130 | 80–100 | 35–45 |
| | 40,1–50,0 | – | 110–120 | –/– | –/– | –/– | 40–50 | 10–20 | –/– | –/– | –/– | 100–120 | 45–55 |
| Однолетние бобово-злаковые травы (з/м) | 10,0–20,0 | – | 30–40 | 30–50 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | – | 70–100 | 50–80 | 40–70 | 30–50 | – |
| | 20,1–30,0 | – | 40–55 | 50–70 | 40–60 | 30–50 | 20–30 | – | 100–130 | 80–110 | 70–100 | 50–70 | 20–30 |
| | 30,1–40,0 | – | 55–70 | –/– | –/– | 50–70 | 30–40 | 10–20 | –/– | –/– | 100–120 | 70–90 | 30–40 |
| | 40,1–50,0 | – | 70–90 | –/– | –/– | –/– | 40–50 | 10–20 | –/– | –/– | –/– | 90–110 | 40–50 |
| Однолетние крестоцветные (з/м) | 10,0–20,0 | – | 40–60 | 30–50 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | – | 70–100 | 50–80 | 40–70 | 30–50 | – |
| | 20,1–30,0 | – | 60–80 | 50–70 | 40–60 | 30–50 | 20–30 | – | 100–130 | 80–110 | 70–100 | 50–70 | 20–30 |
| | 30,1–40,0 | – | 80–100 | –/– | –/– | 50–70 | 30–40 | 10–20 | –/– | –/– | 100–120 | 70–90 | 30–40 |
| | 40,1–50,0 | – | 100–110 | –/– | –/– | –/– | 40–50 | 10–20 | –/– | –/– | –/– | 90–110 | 40–50 |
| Многолетние бобовые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | – | 50–70 | 45–60 | 40–50 | 30–40 | – | 100–120 | 90–110 | 80–100 | 50–70 | – |
| | 4,1–6,0 | – | – | 70–100 | 60–80 | 50–70 | 40–50 | – | 120–150 | 110–140 | 100–120 | 70–100 | 30–40 |
| | 6,1–8,0 | – | – | –/– | –/– | 70–90 | 50–60 | 20–30 | –/– | –/– | 120–140 | 100–120 | 40–50 |
| | 8,1–10,0 | – | – | –/– | –/– | –/– | 60–70 | 30–40 | –/– | –/– | –/– | 120–140 | 50–60 |
| Многолетние злаковые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | 60–80 | 50–70 | 45–60 | 40–50 | 30–40 | – | 100–120 | 90–110 | 80–100 | 50–70 | – |
| | 4,1–6,0 | – | 80–110 | 70–100 | 60–80 | 50–70 | 40–50 | – | 120–150 | 110–140 | 100–120 | 70–100 | 30–40 |
| | 6,1–8,0 | – | 110–130 | –/– | –/– | 70–90 | 50–60 | 20–30 | –/– | –/– | 120–140 | 100–120 | 40–50 |
| | 8,1–10,0 | – | 130–150 | –/– | –/– | –/– | 60–70 | 30–40 | –/– | –/– | –/– | 120–140 | 50–60 |
| Многолетние бобово-злаковые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | 40–50 | 50–70 | 45–60 | 40–50 | 30–40 | – | 100–120 | 90–110 | 80–100 | 50–70 | – |
| | 4,1–6,0 | – | 50–60 | 70–100 | 60–80 | 50–70 | 40–50 | – | 120–150 | 110–140 | 100–120 | 70–100 | 30–40 |
| | 6,1–8,0 | – | 60–70 | –/– | –/– | 70–90 | 50–60 | 20–30 | –/– | –/– | 120–140 | 100–120 | 40–50 |
| | 8,1–10,0 | – | 70–90 | –/– | –/– | –/– | 60–70 | 30–40 | –/– | –/– | –/– | 120–140 | 50–60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Сенокосы (сено) | 2,0–4,0 | – | 40–70 | 30–50 | 25–45 | 20–35 | 15–25 | – | 70–100 | 60–90 | 50–75 | 30–50 | – |
| | 4,1–6,0 | – | 70–100 | 50–70 | 45–65 | 35–50 | 25–35 | – | 100–130 | 90–120 | 75–100 | 50–70 | 20–30 |
| | 6,1–8,0 | – | 100–130 | 70–90 | 65–85 | 50–65 | 35–45 | 20–25 | 130–160 | 120–150 | 100–125 | 70–90 | 30–40 |
| | 8,1–10,0 | – | 130–160 | –//– | –//– | 65–80 | 45–55 | 25–30 | –//– | –//– | 125–150 | 90–115 | 40–50 |
| | 10,1–12,0 | – | 160–180 | –//– | –//– | –//– | 55–70 | 30–40 | –//– | –//– | –//– | 115–140 | 50–60 |
| Пастбища (з/м) | 10,0–20,0 | – | 50–75 | 30–50 | 25–45 | 20–35 | 15–25 | – | 70–100 | 60–90 | 50–75 | 30–50 | – |
| | 20,1–30,0 | – | 75–100 | 50–70 | 45–65 | 35–50 | 25–35 | – | 100–130 | 90–120 | 75–100 | 50–70 | 20–30 |
| | 30,1–40,0 | – | 100–125 | 70–90 | 65–85 | 50–65 | 35–45 | 20–25 | 130–160 | 120–150 | 100–125 | 70–90 | 30–40 |
| | 40,1–50,0 | – | 125–150 | –//– | –//– | 65–80 | 45–55 | 25–30 | –//– | –//– | 125–150 | 90–115 | 40–50 |
| | 50,1–60,0 | – | 150–180 | –//– | –//– | –//– | 55–70 | 30–40 | –//– | –//– | –//– | 115–140 | 50–60 |

**Средние дозы удобрений под основные сельскохозяйственные культуры
на дерново-подзолистых песчаных и супесчаных на песках почвах**

| Культура | Планир. урожай- ность, т/га | Навоз, т/га | Азотные удобрения, кг/га д. в. | Фосфорные удобрения, кг/га д. в. | | | | Калийные удобрения, кг/га д. в. | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|--|--------|---------|---------|
| | | | | Содержание P ₂ O ₅ в почве, мг/кг | | | | Содержание K ₂ O в почве, мг/кг | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | <100 | 101–150 | 151–200 | 201–300 | <80 | 81–140 | 141–200 | 201–300 |
| Озимые зерно- вые (зерно) | 1,5–2,0 | 30 | 35–45 | 40–50 | 35–40 | 25–30 | 15–20 | 60–70 | 40–50 | 30–40 | 20–25 |
| | 2,1–2,5 | 30 | 45–55 | 50–60 | 40–50 | 30–35 | 20–25 | 70–80 | 50–60 | 40–50 | 25–30 |
| | 2,6–3,0 | 30 | 55–65 | –//– | 50–60 | 35–40 | 25–30 | –//– | 60–70 | 50–60 | 35–40 |
| | 3,1–3,5 | 30 | 65–75 | –//– | –//– | 40–45 | 30–35 | –//– | –//– | 60–70 | 45–50 |
| | 3,6–4,0 | 30 | 75–90 | –//– | –//– | 45–50 | 35–40 | –//– | –//– | 70–75 | 50–60 |
| Яровые зерно- вые (зерно) | 1,5–2,0 | Послед. 50–60 | 40–45 | 40–45 | 35–40 | 25–30 | 15–20 | 60–70 | 40–50 | 30–40 | 20–30 |
| | 2,1–2,5 | | 45–55 | 45–50 | 40–45 | 30–35 | 15–20 | 70–80 | 50–60 | 40–50 | 30–40 |
| | 2,6–3,0 | Послед. 50–60 | 55–65 | –//– | 45–50 | 35–40 | 20–25 | –//– | 60–70 | 50–60 | 40–50 |
| | 3,1–3,5 | | 65–75 | –//– | –//– | 40–45 | 20–25 | –//– | –//– | 60–70 | 50–60 |
| Зернобобовые (зерно) | 3,6–4,0 | | 75–85 | –//– | –//– | 45–50 | 25–30 | –//– | –//– | 70–80 | 60–65 |
| | 1,0–1,5 | – | – | 40–50 | 35–45 | 30–35 | 20–25 | 65–80 | 55–70 | 45–60 | 30–45 |
| | 1,6–2,0 | – | – | 50–60 | 45–55 | 35–40 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–80 | 45–60 |
| | 2,1–2,5 | – | – | –//– | 55–65 | 40–45 | 25–30 | –//– | 90–110 | 80–100 | 60–75 |
| Гречиха (зерно) | 2,6–3,0 | – | – | –//– | –//– | 45–55 | 30–35 | –//– | –//– | 100–120 | 75–90 |
| | 0,5–1,0 | – | 30–50 | 35–55 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | 55–85 | 45–70 | 35–55 | 20–30 |
| | 1,1–1,5 | – | 50–70 | 55–75 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | 85–115 | 70–95 | 55–70 | 30–45 |
| | 1,6–2,0 | – | 70–90 | –//– | –//– | 40–55 | 30–35 | –//– | –//– | 70–90 | 45–60 |
| Картофель (клубни) | 15,0–20,0 | 60 | 55–75 | 55–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 75–95 | 55–70 | 45–60 | 30–40 |
| | 20,1–25,0 | 60 | 75–90 | 65–75 | 45–55 | 40–45 | 30–35 | 95–110 | 70–85 | 60–75 | 40–55 |
| | 25,1–30,0 | 60 | 90–100 | –//– | 55–65 | 45–50 | 35–40 | –//– | 85–100 | 75–90 | 55–70 |
| | 30,1–35,0 | 60 | 100–110 | –//– | –//– | 50–60 | 40–45 | –//– | –//– | 90–100 | 70–80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-----------|----|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Кормовая свекла (корни) | 20,0–30,0 | 80 | 45–65 | 45–65 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | 70–110 | 50–80 | 35–65 | 25–40 |
| | 30,1–45,0 | 80 | 65–95 | –/– | 40–60 | 30–45 | 20–30 | –/– | 80–130 | 65–100 | 40–60 |
| | 45,1–60,0 | 80 | 100–130 | –/– | –/– | 45–60 | 30–40 | –/– | –/– | 100–140 | 60–80 |
| Озимый рапс (семена) | 1,0–1,5 | – | 45–65 | 45–60 | 35–50 | 25–35 | 20–25 | 65–80 | 45–60 | 35–50 | 20–30 |
| | 1,6–2,0 | – | 65–85 | 60–75 | 50–65 | 35–45 | 25–30 | 80–100 | 60–80 | 50–65 | 30–45 |
| | 2,1–2,5 | – | 85–105 | –/– | –/– | 45–55 | 30–35 | –/– | –/– | 65–80 | 45–60 |
| Яровой рапс (семена) | 1,0–1,5 | – | 45–60 | 45–55 | 30–40 | 20–30 | 15–20 | 65–85 | 45–65 | 35–55 | 20–30 |
| | 1,6–2,0 | – | 60–80 | 55–70 | 40–50 | 30–40 | 20–25 | 85–105 | 65–85 | 55–75 | 30–45 |
| | 2,1–2,5 | – | 80–95 | –/– | –/– | 40–50 | 25–30 | –/– | –/– | 75–90 | 45–60 |
| Кукуруза (силос) | 15,0–20,0 | 80 | 45–60 | 45–55 | 30–40 | 20–25 | 15–20 | 50–60 | 40–55 | 30–40 | 20–25 |
| | 20,1–25,0 | 80 | 60–75 | 55–65 | 40–50 | 25–30 | 15–20 | 60–80 | 55–70 | 40–50 | 25–30 |
| | 25,1–30,0 | 80 | 75–90 | 65–75 | 50–60 | 30–40 | 20–25 | 80–100 | 70–85 | 50–60 | 30–35 |
| | 30,1–35,0 | 80 | 90–105 | –/– | 60–65 | 40–50 | 25–30 | –/– | 85–100 | 60–70 | 35–40 |
| | 35,1–40,0 | 80 | 105–120 | –/– | –/– | 50–60 | 25–30 | –/– | –/– | 70–80 | 40–50 |
| Однолетние бобовые травы (з/м) | 10,0–15,0 | – | – | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 75–90 | 55–70 | 45–55 | 35–45 |
| | 15,1–20,0 | – | – | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 90–110 | 70–85 | 55–70 | 45–55 |
| | 20,1–25,0 | – | – | –/– | 45–50 | 30–40 | 20–25 | –/– | 85–100 | 70–85 | 55–65 |
| | 25,1–30,0 | – | – | –/– | –/– | 40–45 | 25–30 | –/– | –/– | 85–100 | 65–75 |
| Однолетние злаковые травы (з/м) | 10,0–15,0 | – | 40–45 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 80–95 | 65–80 | 45–55 | 35–45 |
| | 15,1–20,0 | – | 55–70 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 95–115 | 80–95 | 55–70 | 45–55 |
| | 20,1–25,0 | – | 70–80 | –/– | 45–50 | 30–40 | 20–25 | –/– | 95–110 | 70–85 | 55–65 |
| | 25,1–30,0 | – | 80–90 | –/– | –/– | 40–45 | 25–30 | –/– | –/– | 85–100 | 65–75 |
| Однолетние бобово-злаковые травы (з/м) | 10,0–15,0 | – | 35–45 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 75–90 | 55–70 | 45–55 | 35–45 |
| | 15,1–20,0 | – | 35–55 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 90–110 | 70–85 | 55–70 | 45–55 |
| | 20,1–25,0 | – | 55–70 | –/– | 45–50 | 30–40 | 20–25 | –/– | 85–100 | 70–85 | 55–65 |
| | 25,1–30,0 | – | 70–80 | –/– | –/– | 40–45 | 25–30 | –/– | –/– | 85–100 | 65–75 |
| Однолетние крестоцветные (з/м) | 10,0–15,0 | – | 45–55 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 75–90 | 55–70 | 45–55 | 35–45 |
| | 15,1–20,0 | – | 55–65 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 90–110 | 70–85 | 55–70 | 45–55 |
| | 20,1–25,0 | – | 65–75 | –/– | 45–50 | 30–40 | 20–25 | –/– | 85–100 | 70–85 | 55–65 |
| | 25,1–30,0 | – | 75–85 | –/– | –/– | 40–45 | 25–30 | –/– | –/– | 85–100 | 65–75 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| Многолетние бобовые травы (сено) | 2,0–3,0 | – | – | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–75 | 40–55 |
| | 3,1–4,0 | – | – | 45–55 | 40–50 | 30–40 | 25–30 | 100–120 | 90–110 | 75–90 | 55–70 |
| | 4,1–5,0 | – | – | –/– | 50–60 | 40–50 | 30–35 | –/– | 110–130 | 90–110 | 70–90 |
| | 5,1–6,0 | – | – | –/– | –/– | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | 110–130 | 90–110 |
| Многолетние злаковые травы (сено) | 2,0–3,0 | – | 45–60 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–75 | 40–55 |
| | 3,1–4,0 | – | 60–75 | 45–55 | 40–50 | 30–40 | 25–30 | 100–120 | 90–110 | 75–90 | 55–70 |
| | 4,1–5,0 | – | 75–90 | –/– | 50–60 | 40–50 | 30–35 | –/– | 110–130 | 90–110 | 70–90 |
| | 5,1–6,0 | – | 90–100 | –/– | –/– | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | 110–130 | 90–110 |
| Многолетние бобово- злаковые травы (сено) | 2,0–3,0 | – | 30–40 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–75 | 40–55 |
| | 3,1–4,0 | – | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 30–40 | 25–30 | 100–120 | 90–110 | 75–90 | 55–70 |
| | 4,1–5,0 | – | 50–65 | –/– | 50–60 | 40–50 | 30–35 | –/– | 110–130 | 90–110 | 70–90 |
| | 5,1–6,0 | – | 65–75 | –/– | –/– | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | 110–130 | 90–110 |
| Сенокосы (сено) | 2,0–3,0 | – | 45–60 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 55–70 | 35–50 |
| | 3,1–4,0 | – | 60–75 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 50–65 |
| | 4,1–5,0 | – | 75–90 | –/– | 45–55 | 30–40 | 20–25 | –/– | 110–130 | 90–110 | 65–80 |
| | 5,1–6,0 | – | 90–110 | –/– | –/– | 40–45 | 25–30 | –/– | –/– | 110–130 | 80–100 |
| Пастбища (з/м) | 10,0–15,0 | – | 50–65 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 55–70 | 35–50 |
| | 15,1–20,0 | – | 65–80 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 50–65 |
| | 20,1–25,0 | – | 80–95 | –/– | 45–55 | 30–40 | 20–25 | –/– | 110–130 | 90–110 | 65–80 |
| | 25,1–30,0 | – | 95–110 | –/– | –/– | 40–45 | 25–30 | –/– | –/– | 110–130 | 80–100 |

Рекомендуемые дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры на торфяно-болотных почвах

| Культура | Планир. урожай- ность, т/га | Навоз, т/га | Азотные удобре- ния, кг/га д. в. | Фосфорные удобрения, кг/га д. в. | | | | | Калийные удобрения, кг/га д. в. | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Содержание P ₂ O ₅ в почве, мг/кг | | | | | Содержание K ₂ O в почве, мг/кг | | | | |
| | | | | <200 | 201– 400 | 401– 600 | 601– 800 | 801– 1000 | <200 | 201– 400 | 401– 600 | 601– 1000 | 801– 1300 |
| Озимые зер- новые (зерно) | 3,0–4,0 | – | 20–25 | 80–95 | 65–80 | 50–65 | 35–50 | 20–25 | 90–110 | 65–85 | 55–75 | 35–55 | 25–35 |
| | 4,1–5,0 | – | 25–30 | 95–100 | 80–95 | 65–80 | 50–60 | 25–30 | 110–130 | 85–105 | 75–95 | 55–75 | 35–40 |
| | 5,1–6,0 | – | 30–40 | –/– | –/– | 80–90 | 60–70 | 30–40 | –/– | –/– | 95–110 | 75–90 | 50–60 |
| Яровые зерно- вые (зерно) | 3,0–4,0 | – | 20–25 | 65–85 | 50–60 | 40–55 | 30–40 | 20–25 | 90–110 | 75–85 | 65–80 | 35–55 | 25–35 |
| | 4,1–5,0 | – | 25–30 | 85–100 | 60–80 | 55–70 | 40–50 | 25–30 | 110–130 | 95–110 | 80–95 | 55–75 | 35–45 |
| | 5,1–6,0 | – | 30–40 | –/– | –/– | 70–80 | 50–60 | 30–40 | –/– | –/– | 95–110 | 75–90 | 45–55 |
| Зерно- бобовые (зерно) | 1,5–2,5 | – | – | 55–85 | 45–75 | 35–55 | 25–40 | 15–20 | 90–110 | 80–100 | 65–90 | 45–70 | 20–35 |
| | 2,6–3,5 | – | – | 85–1105 | 75–105 | 55–75 | 40–55 | 20–30 | 110–135 | 100–125 | 90–115 | 70–100 | 35–50 |
| | 3,6–4,5 | – | – | –/– | –/– | 75–100 | 55–70 | 30–40 | –/– | –/– | 115–140 | 100–130 | 50–60 |
| Картофель (клубни) | 15,0–20,0 | – | 20–25 | 65–75 | 45–55 | 40–50 | 30–35 | 20–25 | 75–95 | 55–75 | 45–60 | 30–45 | 20–30 |
| | 21,0–25,0 | – | 25–30 | 75–90 | 55–70 | 50–60 | 35–45 | 25–30 | 95–115 | 75–95 | 60–80 | 45–60 | 30–40 |
| | 25,1–30,0 | – | 30–35 | –/– | 70–85 | 60–70 | 45–55 | 30–35 | –/– | 95–115 | 80–100 | 60–75 | 40–50 |
| | 30,1–35,0 | – | 35–40 | –/– | –/– | 70–80 | 55–65 | 35–40 | –/– | –/– | 100–115 | 75–90 | 50–55 |
| | 35,1–40,0 | – | 40–45 | –/– | –/– | 80–95 | 65–75 | 40–45 | –/– | –/– | 115–130 | 90–100 | 55–60 |
| Кормовая свекла (корни) | 20,0–30,0 | – | 20–30 | 55–80 | 35–60 | 25–50 | 20–30 | 15–20 | 70–120 | 50–100 | 35–80 | 25–45 | 20–30 |
| | 30,1–50,0 | – | 30–40 | –/– | 60–90 | 50–75 | 30–45 | 20–25 | –/– | 100–170 | 80–125 | 45–70 | 30–45 |
| | 50,1–70,0 | – | 40–50 | –/– | –/– | 75–100 | 45–65 | 25–35 | –/– | –/– | 125–170 | 70–95 | 45–60 |
| | 70,1–90,0 | – | 50–70 | –/– | –/– | – | 65–85 | 35–45 | –/– | –/– | х | 95–120 | 60–70 |
| Однолетние злаковые травы (з/м) | 15,0–20,0 | – | 30–35 | 50–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 15–20 | 100–130 | 90–110 | 75–100 | 55–70 | 30–35 |
| | 20,1–30,0 | – | 35–40 | –/– | 45–60 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | –/– | 110–140 | 100–130 | 70–90 | 35–45 |
| | 30,1–40,0 | – | 40–45 | –/– | –/– | 55–70 | 40–50 | 30–35 | –/– | –/– | 130–135 | 90–110 | 45–60 |
| | 40,1–50,0 | – | 45–50 | –/– | –/– | –/– | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | –/– | 110–130 | 60–70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Однолетние бобово- злаковые травы (з/м) | 15,0–20,0 | – | 15–20 | 50–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 15–20 | 90–120 | 80–100 | 65–90 | 50–65 | 25–30 |
| | 20,1–30,0 | – | 20–25 | –/– | 45–60 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | –/– | 100–130 | 90–120 | 65–85 | 30–40 |
| | 30,1–40,0 | – | 25–30 | –/– | –/– | 55–70 | 40–50 | 30–35 | –/– | –/– | 120–150 | 85–105 | 40–50 |
| | 40,1–50,0 | – | 30–35 | –/– | –/– | –/– | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | –/– | 105–120 | 50–60 |
| Однолетние крестоцветные (з/м) | 15,0–20,0 | – | 25–30 | 50–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 15–20 | 90–120 | 80–100 | 65–90 | 50–65 | 25–30 |
| | 20,1–30,0 | – | 30–35 | –/– | 45–60 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | –/– | 100–130 | 90–120 | 65–85 | 30–40 |
| | 30,1–40,0 | – | 35–40 | –/– | –/– | 55–70 | 40–50 | 30–35 | –/– | –/– | 120–150 | 85–105 | 40–50 |
| | 40,1–50,0 | – | 40–45 | –/– | –/– | –/– | 50–60 | 35–40 | –/– | –/– | –/– | 105–120 | 50–60 |
| Многолетние бобовые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | – | 55–70 | 50–65 | 40–50 | 25–35 | 10–15 | 110–130 | 100–120 | 90–110 | 55–75 | 30–40 |
| | 4,1–6,0 | – | – | 70–90 | 65–85 | 50–70 | 35–50 | 15–25 | 130 | 120–150 | 110–135 | 75–100 | 40–55 |
| | 6,1–8,0 | – | – | –/– | –/– | 70–85 | 50–60 | 25–30 | –/– | –/– | 135–160 | 100–125 | 55–70 |
| | 8,1–10,0 | – | – | –/– | –/– | 85–100 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 160–180 | 125–150 | 70–80 |
| Многолетние злаковые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | 30–40 | 55–70 | 50–65 | 40–50 | 25–35 | 10–15 | 110–130 | 100–120 | 90–110 | 55–75 | 30–40 |
| | 4,1–6,0 | – | 40–50 | 70–90 | 65–85 | 50–70 | 35–50 | 15–25 | 130–165 | 120–150 | 110–135 | 75–100 | 40–55 |
| | 6,1–8,0 | – | 50–60 | –/– | –/– | 70–85 | 50–60 | 25–30 | –/– | –/– | 135–160 | 100–125 | 55–70 |
| | 8,1–10,0 | – | 60–70 | –/– | –/– | 85–100 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 160–180 | 125–150 | 70–80 |
| Многолетние бобо-злаковые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | 20–25 | 55–70 | 50–65 | 40–50 | 25–35 | 10–15 | 110–130 | 100–120 | 90–110 | 55–75 | 30–40 |
| | 4,1–6,0 | – | 25–30 | 70–90 | 65–85 | 50–70 | 35–50 | 15–25 | 130–165 | 120–150 | 110–135 | 75–100 | 40–55 |
| | 6,1–8,0 | – | 30–35 | –/– | –/– | 70–85 | 50–60 | 25–30 | –/– | –/– | 135–160 | 100–125 | 55–70 |
| | 8,1–10,0 | – | 35–40 | –/– | –/– | 85–100 | 60–70 | 30–35 | –/– | –/– | 160–180 | 125–150 | 70–80 |
| Сенокосы (сено) | 2,0–4,0 | – | 30–35 | 30–50 | 25–45 | 20–35 | 15–25 | 10–25 | 80–110 | 70–100 | 55–80 | 35–55 | 25–35 |
| | 4,1–6,0 | – | 35–40 | 50–70 | 45–65 | 35–50 | 25–35 | 15–20 | 110–140 | 100–130 | 80–110 | 55–80 | 35–45 |
| | 6,1–8,0 | – | 40–50 | 70–90 | 65–85 | 50–65 | 35–45 | 20–25 | 140–170 | 130–160 | 110–140 | 80–105 | 45–55 |
| | 8,1–10,0 | – | 50–60 | –/– | –/– | 65–80 | 45–55 | 25–30 | –/– | –/– | 140–165 | 105–130 | 55–65 |
| | 10,1–12,0 | – | 60–70 | –/– | –/– | 80–90 | 55–60 | 30–35 | –/– | –/– | 165–190 | 130–150 | 65–80 |
| Пастбища (з/м) | 10,0–20,0 | – | 30–35 | 30–50 | 25–45 | 20–35 | 15–25 | 10–25 | 80–110 | 70–100 | 55–80 | 35–55 | 25–35 |
| | 20,1–30,0 | – | 35–40 | 50–70 | 45–65 | 35–50 | 25–35 | 15–20 | 110–140 | 100–130 | 80–110 | 55–80 | 35–45 |
| | 30,1–40,0 | – | 40–50 | 70–90 | 65–85 | 50–65 | 35–45 | 20–25 | 140–170 | 130–160 | 110–140 | 80–105 | 45–55 |
| | 40,1–50,0 | – | 50–60 | –/– | –/– | 65–80 | 45–55 | 25–30 | –/– | –/– | 140–165 | 105–130 | 55–65 |
| | 50,1–60,0 | – | 60–70 | –/– | –/– | 8090 | 55–60 | 30–35 | –/– | –/– | 165–190 | 130–150 | 65–80 |

**Вынос азота, фосфора, калия, кальция, магния и серы с 1 ц основной и соответствующим количеством побочной
продукции на минеральных почвах, кг**

| Культуры | Вид продукции | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | CaO | MgO | S |
|------------------|------------------|------|-------------------------------|------------------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Озимая пшеница | Зерно | 2,82 | 1,08 | 1,92 | 0,47 | 0,31 | 0,50 |
| Озимая рожь | Зерно | 2,80 | 1,21 | 2,33 | 0,41 | 0,31 | 0,60 |
| Озимый ячмень | Зерно | 2,50 | 1,11 | 2,50 | 0,46 | 0,31 | 0,83 |
| Озимая тритикале | Зерно | 2,60 | 1,15 | 2,10 | 0,42 | 0,30 | 0,86 |
| Яровая пшеница | Зерно | 3,04 | 1,16 | 2,47 | 0,32 | 0,24 | 0,60 |
| Яровой ячмень | Зерно | 2,90 | 1,19 | 2,74 | 0,48 | 0,30 | 0,90 |
| Овес | Зерно | 2,59 | 1,24 | 2,86 | 0,42 | 0,33 | 1,20 |
| Гречиха | Зерно | 3,75 | 1,98 | 4,82 | 0,81 | 0,34 | 0,80 |
| Просо | Зерно | 3,00 | 1,20 | 3,00 | 0,36 | 0,18 | 1,20 |
| Яровая тритикале | Зерно | 2,60 | 1,15 | 2,10 | 0,48 | 0,30 | 0,76 |
| Люпин | Зерно | 8,43 | 1,99 | 4,40 | 1,88 | 0,85 | 1,42 |
| Пелюшка | Зерно | 6,36 | 2,49 | 3,56 | 2,18 | 0,80 | 1,64 |
| Горох | Зерно | 5,89 | 1,40 | 2,90 | 2,40 | 0,48 | 1,05 |
| Фасоль | Зерно | 4,50 | 1,07 | 3,79 | 2,15 | 0,51 | 0,80 |
| Бобы кормовые | Зерно | 5,30 | 1,81 | 3,21 | 2,50 | 0,74 | 1,19 |
| Сераделла | Зерно | 6,00 | 1,80 | 3,80 | 2,10 | 0,87 | 1,20 |
| Вика яровая | Зерно | 6,00 | 1,80 | 3,80 | 2,14 | 0,66 | 1,21 |
| Лен-долгунец | Волокно | 5,81 | 2,29 | 7,30 | 1,50 | 0,78 | 1,60 |
| Конопля | Волокно | 6,02 | 3,28 | 5,09 | 1,47 | 0,80 | 2,16 |
| Сахарная свекла | Корни | 0,40 | 0,16 | 0,65 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| Кормовая свекла | Корни | 0,35 | 0,11 | 0,78 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| Куузику | Корни | 0,34 | 0,13 | 0,75 | 0,10 | 0,09 | 0,12 |
| Морковь кормовая | Корни | 0,26 | 0,10 | 0,50 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| Турнепс | Корни | 0,27 | 0,10 | 0,37 | 0,08 | 0,07 | 0,20 |
| Брюква кормовая | Корни | 0,30 | 0,10 | 0,43 | 0,09 | 0,07 | 0,10 |
| Картофель столовый | Клубни | 0,54 | 0,16 | 1,07 | 0,22 | 0,11 | 0,08 |
| Картофель семенной | Клубни | 0,54 | 0,22 | 0,98 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
| Картофель технический | Клубни | 0,54 | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Кукуруза на силос | З/масса | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,06 | 0,05 | 0,09 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | З/масса | 0,45 | 0,13 | 0,43 | 0,09 | 0,06 | 0,10 |
| Однолетние бобово-злаковые травы | Сено | 1,74 | 0,54 | 2,59 | 0,46 | 0,29 | 0,40 |
| Однолетние злаковые травы | З/масса | 0,28 | 0,11 | 0,51 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| Однолетние злаковые травы | Сено | 1,39 | 0,55 | 2,54 | 0,69 | 0,28 | 0,40 |
| Однолетние бобовые травы | З/масса | 0,46 | 0,12 | 0,40 | 0,35 | 0,09 | 0,08 |
| Однолетние бобовые травы | Сено | 2,28 | 0,56 | 1,80 | 1,72 | 0,46 | 0,41 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | Сено | 1,73 | 0,54 | 2,57 | 1,30 | 0,48 | 0,40 |
| Многолетние бобово-злаковые травы | З/масса | 0,35 | 0,11 | 0,51 | 0,24 | 0,09 | 0,07 |
| Многолетние злаковые травы | Сено | 1,49 | 0,45 | 2,41 | 0,49 | 0,20 | 0,15 |
| Многолетние злаковые травы | З/масса | 0,30 | 0,09 | 0,48 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Многолетние бобовые травы | Сено | 2,34 | 0,51 | 2,72 | 1,53 | 0,76 | 0,26 |
| Многолетние бобовые травы | З/масса | 0,43 | 0,10 | 0,44 | 0,30 | 0,15 | 0,05 |
| Сенокосы | Сено | 1,61 | 0,49 | 2,20 | 0,95 | 0,41 | 0,20 |
| Сенокосы естественные | Сено | 1,68 | 0,26 | 2,07 | 0,90 | 0,10 | 0,14 |
| Пастбища | З/масса | 0,53 | 0,08 | 0,49 | 0,25 | 0,12 | 0,05 |
| Пастбища естественные | З/масса | 0,43 | 0,06 | 0,62 | 0,20 | 0,10 | 0,04 |
| Рапс яровой | З/масса | 0,50 | 0,10 | 0,49 | 0,30 | 0,12 | 0,06 |
| Рапс озимый | З/масса | 0,50 | 0,07 | 0,47 | 0,28 | 0,11 | 0,04 |
| Редька масличная | З/масса | 0,43 | 0,13 | 0,55 | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
| Озимая рожь | З/масса | 0,48 | 0,12 | 0,40 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Озимый рапс | Семена | 5,8 | 2,9 | 8,6 | 0,52 | 0,19 | 1,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Яровой рапс | Семена | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 0,51 | 0,20 | 2,70 |
| Многолетние бобовые травы | Семена | 26,0 | 6,5 | 20,0 | 1,91 | 0,90 | 3,84 |
| Многолетние злаковые травы | Семена | 19,5 | 7,5 | 18,5 | 0,41 | 0,35 | 4,95 |
| Кукуруза | Зерно | 3,0 | 1,2 | 3,3 | 0,50 | 0,31 | 0,08 |
| Плодовые деревья | Плоды | 0,5 | 0,16 | 0,6 | – | – | – |
| Ягодники | Ягоды | 0,91 | 0,3 | 0,96 | – | – | – |
| Капуста белокочанная | Кочаны | 0,40 | 0,10 | 0,45 | 0,58 | 0,2 | 0,20 |
| Томаты | Плоды | 0,16 | 0,05 | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,10 |
| Огурцы | Плоды | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,06 |
| Лук | Луковицы | 0,30 | 0,12 | 0,40 | 0,20 | 0,11 | 0,06 |
| Овощи (в среднем) | Товарная продукция | 0,25 | 0,08 | 0,35 | 0,32 | 0,15 | 0,05 |
| Зеленные овощи | Товарная продукция | 0,3 | 0,1 | 0,45 | – | – | – |
| Растениеводческая продукция (на 100 к. ед.) | К. ед. | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,81 | 0,43 | 0,53 |

**Возврат азота на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных
на морене почвах, % к выносу**

| Культура | Группы урожайности | | | | |
|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| | I | II | III | IV | V |
| 1. Озимые зерновые, кукуруза (зерно), картофель столовый и технический, кормовая свекла, кукуруза, турнепс, горчица (з. м.), редька масличная (з. м.), сурепица (з. м.), морковь столовая | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 2. Яровые зерновые (зерно), картофель (семена), просо (зерно), озимый и яровой рапс (з. м.), многолетние злаковые травы (семена), однолетние злаковые травы (сем.), озимые (з. м.), озимые (з. м.) + травы, яровые (з. м.), яровые (з. м.) + травы, свекла столовая, многолетние боб.-злак. травы (сено), кормовая капуста, райграс однолетний + травы, ягодники | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 3. Сахарная свекла, кормовая брюква, сенокосы и пастбища естественные | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| 4. Кукуруза (з. м.), яровой рапс (семена), озимый рапс (сем.), горчица (сем.), сурепица (сем.), редька масличная (сем.), конопля, райграс пастбищный (сено), однолетние травы (сено) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
| 5. Лен, однолетние боб.-злак. смеси (зерно), сераделла (семена), | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 6. Гречиха (зерно), капуста белокочанная, морковь кормовая, амарант (з. м.), пастбища культурные | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
| 7. Горох, вика, пелюшка (зерно), горох (з. м.), многолетние бобовые травы (сено) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 8. Вика (з. м.), кормовые бобы (з. м.), фасоль (зерно) | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 9. Кормовые бобы (зерно), однолетние боб.-злак. травы (з. м.), райграс однолетний (сем.), однолетние боб.-злак. травы (з. м.) + травы | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 10. Многолетние бобовые травы (сем.), люпин (зерно), люпин (з. м.) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11. Огурцы | 400 | 380 | 350 | 310 | 320 |
| 12. Зеленные овощи, лук-репка, томаты, плодовые деревья, многолетние злаковые травы (сено) | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |

**Возврат фосфора на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных
на морене почвах, % к выносу**

| Культура | Уровень урожайности | Коэффициенты возврата при содержании P_2O_5 в почвах, мг/кг | | | | |
|--|------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | <100 | 101–150 | 151–200 | 201–300 | 301–400 |
| 1. Озимая пшеница, озимые зерновые (з. м.) + травы, озимый ячмень, кукуруза (зерно), многолетние злак. травы (семена), яровые на зерно + травы, яровые (з. м.), горчица (з. м.), яровой рапс (з. м.), смеси однолетних боб.-злак. трав (зерно), пелюшка (з. м.), свекла столовая | 1 | 260 | 220 | 200 | 130 | — |
| | 2 | 250 | 210 | 190 | 125 | 55 |
| | 3 | 240 | 200 | 180 | 120 | 50 |
| | 4 | 220 | 180 | 160 | 110 | 45 |
| | 5 | 200 | 170 | 150 | 100 | 40 |
| 2. Озимая рожь, озимая тритикале, кормовые бобы, вика, сераделла (з. м.), райграс однолетний (сено), кузукику, сенокосы улучшенные | 1 | 240 | 200 | 180 | 120 | — |
| | 2 | 230 | 190 | 170 | 110 | 50 |
| | 3 | 220 | 180 | 160 | 105 | 45 |
| | 4 | 190 | 160 | 140 | 100 | 40 |
| | 5 | 180 | 150 | 130 | 90 | 35 |
| 3. Ячмень, яровая пшеница, овес, просо, яровая тритикале (зерно), озимый и яровой рапс (семена), люпин, вика, корм. бобы (зерно), горох (з. м.), редька масличная (з. м.), однолетние боб.-злак. травы (з. м.) | 1 | 220 | 180 | 160 | 110 | — |
| | 2 | 200 | 170 | 150 | 100 | 45 |
| | 3 | 190 | 160 | 140 | 95 | 40 |
| | 4 | 180 | 150 | 130 | 90 | 35 |
| | 5 | 170 | 140 | 120 | 80 | 30 |
| 4. Картофель, морковь столовая и кормовая, озимый рапс (з. м.), сурепица (з. м.), клевер красный (сено), райграс однолетний (з. м.) + травы, многолетние боб.-злак. травы (сено), фасоль (зерно), яровые (з. м.) + травы, капуста белокочанная | 1 | 370 | 310 | 280 | 190 | 75 |
| | 2 | 340 | 280 | 250 | 170 | 70 |
| | 3 | 310 | 260 | 230 | 160 | 65 |
| | 4 | 280 | 230 | 210 | 140 | 60 |
| | 5 | 250 | 210 | 190 | 130 | 55 |
| 5. Лен, сераделла (семена), томаты, огурцы, пастбища естественные | 1 | 650 | 540 | 490 | 320 | 140 |
| | 2 | 600 | 500 | 450 | 300 | 130 |
| | 3 | 550 | 460 | 410 | 280 | 120 |
| | 4 | 500 | 420 | 380 | 250 | 110 |
| | 5 | 470 | 390 | 350 | 230 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6. Сахарная и кормовая свекла, редька, горчица, сурепица (зерно), гречиха, горох (зерно), однолетние боб.-злаковые травы (з. м.) + травы, кукуруза (з. м.), озимые (з. м.), озимая рожь + + травы, озимая и яровая тритикале + травы, пастбища культурные | 1 | 300 | 250 | 220 | 150 | 65 |
| | 2 | 270 | 230 | 210 | 140 | 60 |
| | 3 | 250 | 210 | 190 | 130 | 55 |
| | 4 | 230 | 190 | 170 | 120 | 50 |
| | 5 | 220 | 180 | 160 | 110 | 45 |
| 7. Озимая пшеница + травы, озимый ячмень + травы, кормовая брюква, люцерна (сено), ягондники | 1 | 320 | 270 | 240 | 160 | 70 |
| | 2 | 300 | 250 | 220 | 150 | 65 |
| | 3 | 280 | 230 | 200 | 140 | 60 |
| | 4 | 250 | 210 | 190 | 130 | 55 |
| | 5 | 240 | 200 | 180 | 120 | 50 |
| 8. Многолетние бобовые травы (семена и сено) | 1 | 400 | 330 | 300 | 200 | 80 |
| | 2 | 360 | 300 | 270 | 180 | 75 |
| | 3 | 330 | 280 | 250 | 170 | 70 |
| | 4 | 310 | 260 | 230 | 160 | 65 |
| | 5 | 280 | 230 | 210 | 140 | 60 |
| 9. Райграс однолетний (семена), кормовая капуста, люпин, пелюшка (зерно), амарант (з. м.), семенники (свеклы, моркови, капусты, крестоцветных) | 1 | 180 | 150 | 140 | 90 | 45 |
| | 2 | 170 | 140 | 130 | 90 | 40 |
| | 3 | 160 | 130 | 120 | 75 | 35 |
| | 4 | 140 | 120 | 110 | 70 | 30 |
| | 5 | 130 | 110 | 100 | 60 | 25 |
| 10. Конопля, галега | 1 | 510 | 430 | 380 | 260 | 110 |
| | 2 | 440 | 370 | 330 | 220 | 100 |
| | 3 | 400 | 330 | 300 | 200 | 90 |
| | 4 | 360 | 300 | 270 | 180 | 80 |
| | 5 | 340 | 280 | 250 | 170 | 70 |
| 11. Зеленные овощи, лук-репка, плодовые деревья, сенокосы естественные, многолетние злаковые травы | 1 | 550 | 460 | 410 | 280 | 120 |
| | 2 | 500 | 420 | 380 | 250 | 110 |
| | 3 | 460 | 380 | 340 | 230 | 100 |
| | 4 | 430 | 360 | 320 | 220 | 90 |
| | 5 | 410 | 340 | 310 | 200 | 80 |

Классификатор минеральных удобрений

| Удобрение | Формула | Код | Действующее вещество, % | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------|----|-----|----|----|----|----|
| | | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | Na ₂ O | S | Mn | Cu | B | Zn | Mo | Co |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Селитра аммиачная (нитрат аммония) | NH ₄ NO ₃ | 11 | 34,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сульфат аммония (серно-кислый аммоний) | (NH ₄) ₂ SO ₄ | 12 | 20,5 | – | – | – | 24,0 | – | – | – | – | – | – |
| Сульфат аммония медленнодействующий | (NH ₄) ₂ SO ₄ | 13 | 20,5 | – | – | – | 24,0 | – | – | – | – | – | – |
| Карбамид (мочевина) | CO(NH ₂) ₂ | 14 | 46,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Карбамид (мочевина) медленнодействующий | CO(NH ₂) ₂ | 15 | 46,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| КАС (раствор мочевины и аммиачной селитры) | NH ₄ NO ₃ + CO(NH ₂) ₂ | 16 | 28,0 30,0 32,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| КАС с медью | NH ₄ NO ₃ + CO(NH ₂) ₂ + Cu | 17 | 28,0 30,0 32,0 | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – |
| КАС с фосфором | | 18 | 18,0 | 6,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Аммиачная вода | NH ₄ OH +NO ₃ | 19 | 20,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Безводный аммиак (жидкий аммиак) | NH ₃ | 20 | 82,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Известково-аммиачная селитра | NH ₄ NO ₃ + CaCO ₃ | 21 | 21,0- 28,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сульфат-нитрат аммония (кальциево-аммиачная селитра) | (NH ₄) ₂ SO ₄ · NH ₄ NO ₃ | 22 | 26,0 | – | – | – | 15,0 | – | – | – | – | – | – |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|---------|-----------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Суперфосфат простой порошковидный | $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | 31 | – | 20,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | – | – | – |
| Суперфосфат простой гранулированный | $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | 32 | – | 20,0 | – | – | 12,0 | – | – | – | – | – | – |
| Суперфосфат двойной гранулированный | $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ | 33 | – | 43,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Суперфос | | 34 | – | 43,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Калий хлористый (хлорид калия) | KCl | 51 | – | – | 60,0 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Калий сернокислый (сульфат калия) | K_2SO_4 | 52 | – | – | 46,0 | – | 18,0 | – | – | – | – | – | – |
| Калимагнезия | $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | 53 | – | – | 30,0 | – | 18,0 | – | – | – | – | – | – |
| Калийная соль, 40 % | $\text{KCl} + \text{NaCl}$ | 54 | – | – | 40,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Аммофос | $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ | 61 | 11,0 | 46,0-52,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Аммофосфат | | 62 | 6,0 | 45,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Аммонизированный суперфосфат | $\text{Ca} (\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ | 63 | 3,0-8,0 | 22,0-33,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Диаммонийфосфат (диаммофос) | $(\text{NH}_4)\text{HPO}_4$ | 64 | 18,0 | 46,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ЖКУ | | 65 | 10,0 | 34,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Селитра калиевая (нитрат калия) | KNO_3 | 66 | 13,0 | – | 46,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сложное NPK-удобрение (16:11:20) | | 67 | 16,0 | 11,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|----------------------------------|----|------|------|------|---|---|------|------|------|------|------|----|
| Сложное NPK-удобрение (5:16:35) | | 68 | 5,0 | 16,0 | 35,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сложное NPK-удобрение (17:17:17) | | 69 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сложное NPK-удобрение (10:20:20) | | 70 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кристаллин | | 71 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кислота борная | H_3BO_3 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | 17,0 | — | — | — |
| Медь сернокислая (сульфат меди) | $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ | 92 | — | — | — | — | — | — | 25,0 | — | — | — | — |
| Цинк сернокислый (сульфат цинка) | $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,0 | — | — |
| Молибдат аммония (аммоний молибдено-вокислый) | $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$ | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,0 | — |
| Бормедное удобрение | | 95 | — | — | — | — | — | — | 17,0 | 5,0 | — | — | — |
| Марганец сернокислый (сульфат марганца) | $MnSO_4 \cdot H_2O$ | 96 | — | — | — | — | — | 22,7 | — | — | — | — | — |
| Кобальт сернокислый (сульфат кобальта) | $CoSO_4 \cdot 7H_2O$ | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Кобальт хлористый (хлорид кобальта) | $CoCl_2$ | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 |

Справочник приоритетов минеральных удобрений

| Культуры | Коды культур | Азот | | | Фосфор | Калий |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Основное внесение | Первая подкормка | Вторая подкормка | Основное внесение (подкормка трав) | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Озимые зерновые (зерно) Озимые + травы | 111–114 116–119 | 68, 61–64 | 16 | 17 | 68, 61–64 | 51 |
| Озимые (зеленая масса) | 633 | 68, 61–64 | 16 | – | 68, 61–64 | 51 |
| Яровые зерновые (зерно) Яровые + травы | 121–127 131–135 | 12–16 61–64 | 17,16 | – | 61–64 | 51 |
| Кукуруза (зеленая масса) | 581 | 12–16 61–64 | 16 | – | 61–64 | 51 |
| Яровые (зеленая масса) | 635 | 12–16 61–64 | – | – | 61–64 | 51 |
| Рапс (семена) | 431–432 | 12,13, 61–64 | – | – | 61–64 | 52, 53, 51 |
| Лен | 411 | 68, 12–16 | – | – | 68, 61–64 | 68, 51 |
| Конопля | 412 | 68, 12–16 | – | – | 68, 61–64 | 68, 51 |
| Зернобобовые (зерно) | 211–218 | 61–64 | – | – | 61–64 | 51 |
| Картофель | 511–513 | 12, 13 61–64 | – | – | 61–64 | 51–53 |
| Сахарная свекла | 413 | 12–16, 61–64 | 12, 13, 15 | – | 61–64 | 54, 51 |
| Кормовые корнеплоды | 561–566 | 12–16, 61–64 | 12,13,15 | – | 61–64 | 54, 51 |
| Гречиха | 127 | 12–16, 61–64 | – | – | 61–64 | 52, 53, 51 |
| Бобово-злаковые смеси | 620–621, 651 687–688 | 12–16, 61–64 | – | – | 61–64 | 51, 54 |
| Крестоцветные (семена) | 433–436 | 12, 13 61–64 | – | – | 61–64 | 51, 52, 53 |
| Крестоцветные (зеленая масса) | 641–646 | 12, 13 61–64 | – | – | 61–64 | 51, 52, 53 |
| Злаковые травы | 651–658 681–686, 696 | 16, 16 61–64 | 17, 16 | 17, 16 | 61–64 | 54, 51 |
| Бобовые травы | 611–618, 691–695, 698 | 61–64 | – | – | 61–64 | 54, 51 |

Окончание прил. 70

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|---------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Сенокосы | 711–713 | 12–16, <i>61–64</i> | 16, 17 | 16, 17 | 61–64 | 54, 51 |
| Пастбища | 721–723 | 12–16, 61–64 | 16, 17 | 16, 17 | 61–64 | 54, 51 |
| Овощи | 521–528 | 70 | – | – | 61–64 | 52, 53 |
| Сады, ягодники | 813–814 | 70 | – | – | 61–64 | 52, 53 |

Курсив – сопутствующие элементы питания.

Система удобрения сельскохозяйственных культур

| Доза органических удобрений, т/га | | Основное + припосевное внесение минеральных удобрений, кг/га | | | | | | | | | Подкормки азотом (первая, вторая), кг/га | | | Некорневая подкормка микроэлементами, г/га | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|-------|----------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|---|-------|----------|--|---|----|----|
| | | Азот | | | Фосфор | | | Калий | | | | | | | | | |
| год внесения | послед-ей-ствие | форма | д. в. | физ. вес | форма | д. в. | физ. вес | форма | д. в. | физ. вес | форма | д. в. | физ. вес | Мо | В | Cu | Zn |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Хозяйство, бригада, поле, рабочий участок, элементарный участок, площадь (га), культура, гранулометрический состав, pH_{KCl} , P_2O_5 (мг/кг), K_2O (мг/кг), гумус (%), магний (мг/кг), марганец (мг/кг), бор (мг/кг), медь (мг/кг), цинк (мг/кг), цезий и стронций (Кл/м²).

251

Требуется

Вносится

с органическими удобрениями

Потребность

в минеральных удобрениях

Выделено минеральных удобрений

Формы удобрений

Потребность в минеральных удобрениях под сельскохозяйственные культуры на 20 __ год

| Наименование культур | Плановая посевная площадь, га | Плановая урожайность, ц/га | Верхняя строка – требуется, нижняя – выделяется | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|------------------|----------|---|----|----|
| | | | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O | Mo | B | Cu | Zn |
| | | | тонн | | | кг/га | | | кг д. в. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Всего по хозяйству

В т. ч.:

пашня

сенокосы

пастбища

**Энергетические затраты на погрузку, транспортировку и внесение
твердых органических удобрений (МДж/т)**

| Расстояние, км | Доза внесения, т/га | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|
| | Прямоточная технология | | | Перевалочная технология | | |
| | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 0,5 | 93 | 86 | 80 | — | — | — |
| 1,0 | 109 | 102 | 96 | — | — | — |
| 1,5 | 125 | 118 | 112 | — | — | — |
| 2,0 | 140 | 134 | 128 | 220 | 209 | 198 |
| 2,5 | 157 | 151 | 144 | 233 | 222 | 210 |
| 3,0 | 172 | 165 | 159 | 246 | 234 | 223 |
| 3,5 | 188 | 180 | 174 | 259 | 245 | 236 |
| 4,0 | 204 | 195 | 190 | 272 | 258 | 249 |
| 4,5 | 220 | 211 | 204 | 285 | 272 | 261 |
| 5,0 | 235 | 227 | 221 | 298 | 285 | 274 |
| 5,5 | 250 | 243 | 237 | 310 | 298 | 287 |
| 6,0 | 266 | 260 | 253 | 323 | 312 | 300 |
| 6,5 | 283 | 270 | 269 | 337 | 326 | 314 |
| 7,0 | 298 | 292 | 284 | 350 | 338 | 326 |
| 7,5 | 313 | 307 | 300 | 361 | 351 | 339 |
| 8,0 | 328 | 324 | 315 | 374 | 364 | 351 |
| 8,5 | 343 | 340 | 329 | 387 | 378 | 364 |
| 9,0 | 359 | 355 | 346 | 400 | 390 | 377 |
| 9,5 | 374 | 370 | 362 | 412 | 403 | 390 |
| 10,0 | 394 | 385 | 379 | 425 | 417 | 402 |
| 11,0 | 425 | 416 | 411 | 449 | 440 | 425 |

Формула расчета прогнозируемого урожая

$$Y_{\text{п}} = [(B \cdot Ц_6) + (D_{\text{НРК}} \cdot O_{\text{НРК}}) + (D_{\text{ОУ}} \cdot O_{\text{ОУ}})] : 100,$$

где $Y_{\text{п}}$ – прогнозируемый урожай, ц/га;

B – балл пашни;

$Ц_6$ – цена балла пашни, кг (к. ед.);

$(B \cdot Ц_6)$ – урожай, обусловленный потенциальным плодородием почв, кг/га;

$D_{\text{НРК}}$ – доза минеральных удобрений в действующем веществе, кг/га;

$O_{\text{НРК}}$ – нормативная оплата минеральных удобрений кг (к.ед.) на 1 кг НРК;

$(D_{\text{НРК}} \cdot O_{\text{НРК}})$ – прибавка урожая за счет действий минеральных удобрений, кг/га;

$D_{\text{ОУ}}$ – доза органических удобрений, т/га;

$O_{\text{ОУ}}$ – нормативная оплата органических удобрений урожаем, кг (к. ед.) на 1 тонну;

$(D_{\text{ОУ}} \cdot O_{\text{ОУ}})$ – прибавка урожая за счет органических удобрений, кг/га;

100 – коэффициент перевода килограммов в центнеры.

Пример расчета: балл пашни – 31,4, внесено под озимую рожь – 200 кг/га НРК, 30 т/га органических удобрений. Фактический урожай – 34,5 ц/га.

Прогнозируемый урожай составит:

$$[(31,4 \cdot 52) + (200 \cdot 6,1) + (30 \cdot 25)] : 100 = 36,0 \text{ ц/га.}$$

Уровень использования плодородия почв и удобрений составит: 34,5 : 36,0 = 0,96.

Фактическая окупаемость составит:

$$6,1 \cdot 0,96 = 5,9 \text{ зерна на 1 кг НРК.}$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (VIII тур) / под. ред. И. М. Богdevича. – Минск: Ин-т почвоведения и агрохимии, 2012. – 276 с.
2. Рациональное применение удобрений: учеб. пособие для слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров / И. Р. Вильдфлуш [и др.] – Горки, 2002. – 374 с.
3. Инструкция определения потребности материально-технических ресурсов для сельского хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения. – Минск, 1999. – 26 с.
4. Инструкция о порядке известкования кислых почв сельскохозяйственных земель / В. В. Лапа [и др.]. – Минск: РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2008. – 30 с.
5. Справочник агрохимика / В. В. Лапа [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2007. – 390 с.
6. Кукреш, С. П. Основы энергосбережения в системе применения удобрений: учеб. пособие для студ. агроном. спец. с.-х. вузов / С. П. Кукреш [и др.]. – Горки, 2001. – 58 с.
7. Лапа, В. В. Минеральные удобрения и пути повышения их эффективности / В. В. Лапа, В. Н. Босак. – Минск, 2002. – 184 с.
8. Лапа, В. В. Методические указания по разработке программ расчетов по системе удобрения сельскохозяйственных культур на РС / В. В. Лапа [и др.]. – Минск: БелНИИ-ПА, 2003. – 47 с.
9. Лапа, В. В. Агрохимические регламенты повышения плодородия почв и эффективного использования удобрений: учеб. пособие для слушателей ФПК, студ. агроном. и агроэк. факультетов / В. В. Лапа [и др.]. – Горки, 2002. – 48 с.
10. Методика определения агрономической и экономической эффективности минеральных и органических удобрений / И. М. Богdevич [и др.]; Минск: РУП «Ин-т почвоведения и агрохимии». – Минск, 2010. – 24 с.
11. Методика определения энергетической эффективности применения минеральных, органических и известковых удобрений / Г. В. Василук [и др.]; Белорус. науч.-исслед. ин-т почвоведения и агрохимии. – Минск: ИПП Минэкономики Республики Беларусь, 1996. – 50 с.
12. Ионас, В. А. Система удобрения сельскохозяйственных культур / В. А. Ионас, И. Р. Вильдфлуш, С. П. Кукреш. – Минск: Ураджай, 1989. – 287 с.
13. Методика расчета баланса элементов питания в земледелии Республики Беларусь / В. В. Лапа [и др.]; Минск: РУП «Ин-т почвоведения и агрохимии». – Минск, 2007. – 26 с.
14. Правила ведения агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь / И. М. Богdevич [и др.]. – Минск, 2002. – 74 с.
15. Система применения удобрений: учеб. пособие / В. В. Лапа [и др.]; под науч. ред. В. В. Лапа. – Гродно: ГГАА, 2011. – 416 с.
16. Минеральные удобрения и их применение при современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: пособие / О. И. Мишура, И. Р. Вильдфлуш, В. В. Лапа. – Горки: БГСХА, 2011. – 176 с.
17. Агрохимия: учебник / И. Р. Вильдфлуш [и др.]; под ред. И. Р. Вильдфлуша. – Минск: ИВЦ Минфина, 2013. – 704 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| 1. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)..... | 4 |
| 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО СИСТЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ..... | 6 |
| 2.1. Действие различных доз удобрений на урожайность и качество сельскохозяй- ственных культур..... | 7 |
| 2.2. Действие различных форм удобрений на урожайность и качество сельскохо- зяйственных культур..... | 7 |
| 2.3. Оценка различных видов органических удобрений..... | 8 |
| 2.4. Исследования эффективности диасотрофных, фосфат- и калиймобилизующих биопрепаратов..... | 9 |
| 2.5. Комплексное применение удобрений и средств защиты растений..... | 9 |
| 2.6. Исследование различных систем применения удобрений в севооборотах..... | 9 |
| 2.7. Разработка системы удобрения в хозяйстве..... | 10 |
| 2.8. Система применения удобрений при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур..... | 12 |
| 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЯХ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА..... | 18 |
| 4. РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ НАВОЗА В ХОЗЯЙСТВЕ..... | 20 |
| 5. РАЗРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ПЛАНОВ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТАХ НА ПАШНЕ И ДРУГИХ УГОДЬЯХ..... | 22 |
| 5.1. Расчет оптимальных доз минеральных удобрений с использованием рекомен- даций и компьютерных программ..... | 25 |
| 5.1.1. Биологические особенности сельскохозяйственных культур..... | 28 |
| 5.1.2. Почвенные условия..... | 29 |
| 5.1.3. Вариант разработки системы удобрения сельскохозяйственных культур.... | 34 |
| 5.1.4. Распределение минеральных удобрений под сельскохозяйственные куль- туры по ассортименту..... | 36 |
| 5.1.5. Расчет потребности в микроудобрениях..... | 36 |
| 5.1.6. Выходная документация..... | 41 |
| 6. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР..... | 42 |
| 6.1. Озимые зерновые культуры..... | 42 |
| 6.2. Яровые зерновые культуры..... | 55 |
| 6.3. Зернобобовые культуры..... | 68 |
| 6.4. Просо..... | 76 |
| 6.5. Гречиха..... | 80 |
| 6.6. Лен-долгунец..... | 83 |
| 6.7. Сахарная свекла..... | 87 |
| 6.8. Кормовая свекла..... | 92 |
| 6.9. Кукуруза..... | 94 |
| 6.10. Картофель..... | 98 |
| 6.11. Озимый и яровой рапс..... | 101 |
| 6.12. Однолетние травы и многолетние травы..... | 107 |
| 6.13. Овощные культуры..... | 114 |
| 6.14. Плодовые и ягодные культуры..... | 124 |

| | |
|--|-----|
| 6.14.1. Подготовка почвы и внесение удобрений при посадке сада и ягодников.... | 124 |
| 6.14.2. Удобрение молодого и плодоносящего сада..... | 127 |
| 6.14.3. Удобрение ягодных культур..... | 131 |
| 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ НА СЕНОКОСАХ И ПАСТБИЩАХ..... | 133 |
| 8. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ..... | 135 |
| 9. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР..... | 138 |
| 10. БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ГУМУСА В ПОЧВЕ..... | 140 |
| 11. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО (ОБЩЕГО) БАЛАНСА ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ..... | 141 |
| 12. СОСТАВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ..... | 152 |
| 12.1. Известкование почв в севооборотах, угодьях и на отдельных площадях..... | 155 |
| 12.2. Особенности применения удобрений и известкования почв при загрязнении их радионуклидами..... | 156 |
| 13. РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ..... | 161 |
| 13.1. Расчет энергетической эффективности удобрений..... | 161 |
| 13.2. Расчет экономической эффективности удобрений..... | 165 |
| 14. ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ..... | 171 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 179 |
| ЛИТЕРАТУРА..... | 255 |

Учебное издание

Шекунова София Федоровна
Вильдфлуш Игорь Робертович
Лапа Виталий Витальевич и др.

АГРОХИМИЯ И СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Редактор *Т. П. Рябцева*
Технический редактор *Н. Л. Якубовская*
Корректор *Л. С. Разинкевич*

Подписано в печать 01.02.2016. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 15,11. Уч.-изд. л. 11,65.
Тираж 75 экз. Заказ .

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/52 от 09.10.2013.
Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.